

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pouvez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autre question, si vous avez un doute, demandez plus de information SVP à votre médecin ou pharmacien.
- Cette médicament vous a été personnellement prescrite. Ne le donnez jamais à quelque un d'autres, même en cas de symptômes identiques cela pourrait lui être nocif.

VOV SPRAY

Diclofénac Diéthylamine, Huile de Lin Vierge, Salicylate de Méthyle et Menthol Spray

1. QU'EST-CE QUE VOV SPRAY, en flacon pressurisé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Anti-inflammatoire non stéroïdien à usage topique.
Ce médicament est un anti-inflammatoire et un antalgique (il calme la douleur), sous forme de pulvérisation sur la peau, uniquement au niveau de la région douloureuse.

Ce médicament est prescrit chez l'adulte dans les tendinites des membres supérieurs et inférieurs (inflammation des tendons des muscles), dans les œdèmes après une opération ou après un traumatisme (entorse, contusion) et dans le soulagement de la douleur de l'arthrose des doigts et des genoux.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT D'UTILISER VOV SPRAY, EN FLACON PRESSURISÉ ?

N'utilisez jamais VOV SPRAY :

- À partir de la 25^{ème} semaine d'aménorrhée (début du 6^{ème} mois de grossesse).
- En cas d'allergie à ce médicament ou à un médicament apparenté, notamment aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aspirine.
- En cas d'allergie à l'un des excipients contenus dans la composition.
- Sur peau lésée, quel que soit la lésion: lésions suintantes, eczéma, lésion infectée, brûlure ou plaie.
- En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Avertissements et précautions : Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmière avant d'utiliser VOV SPRAY en flacon pressurisé.

Mises en garde spéciales : Ne pas appliquer sur les muqueuses, ni sur les yeux.

L'apparition d'une éruption cutanée après application impose l'arrêt immédiat du traitement.

Précautions d'emploi : VOV SPRAY est réservée aux adultes.

Le port de gants par le masseur kinésithérapeute, en cas d'utilisation intensive, est recommandé.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants et adolescents : Sans objet.

Autres médicaments et VOV SPRAY en flacon pressurisé

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, ou avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

VOV SPRAY en flacon pressurisé avec des aliments, boissons : Sans objet.

Grossesse, allaitement et fertilité : Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse : Jusqu'à la 24^{ème} semaine d'aménorrhée (5 mois de grossesse révolus), votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament de façon ponctuelle.

À partir de la 25^{ème} semaine d'aménorrhée (début du 6^{ème} mois de grossesse), vous ne devez en aucun cas prendre de vous-même ce médicament, car ses effets sur votre fœtus peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un plan cardio-pulmonaire et rénal, et cela même avec une seule prise.

Allaitement : Ce médicament passe dans le lait maternel. Par mesure de précaution, il convient d'éviter de l'utiliser pendant l'allaitement.

Sportifs : Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : Sans objet.

VOV SPRAY en flacon pressurisé contient du propylène glycol.

Ce médicament contient du propylène glycol et peut induire des irritations de la peau.

3. COMMENT UTILISER VOV SPRAY, EN FLACON PRESSURISÉ ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie : La posologie est fonction de l'indication, variant de 2 à 4 pulvérisations par jour. Inflammation du pourtour des articulations (tendinites), traumatisme articulaires bénins de type œdème, entorse :

• la dose administrée à chaque pulvérisation est généralement de l'ordre de 2,5 g. Ceci correspond à un ruban de 6 cm.

Arthrose douloureuse des doigts et des genoux :

• la dose administrée à chaque application est de l'ordre de 4 g de. Ceci correspond à un ruban de 10 cm environ.

Durée de traitement : En l'absence de prescription médicale, le traitement est limité à 5 jours.

Mode d'administration : Voie locale

Faire pénétrer par un massage doux et prolongé sur la région douloureuse ou inflammatoire. Bien se laver les mains après chaque utilisation (sauf en cas d'auto-application pour arthrose digitale douloureuse).

Si vous avez utilisé plus de VOV SPRAY en flacon pressurisé que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

Si vous oubliez d'utiliser VOV SPRAY : Sans objet.

Si vous arrêtez d'utiliser VOV SPRAY : Sans objet.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Comme tous les produits, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Exceptionnellement peuvent survenir des réactions pouvant être sévères :

- Réactions allergiques cutanées : éruption (boutons), urticaire, bulles.
- Problèmes respiratoires de type crise d'asthme (souffle bruyant et court, impression de capacité respiratoire diminuée).

• Manifestations générales de type anaphylaxie (gonflement de la face, des lèvres, de la langue, de la gorge). Il faut immédiatement interrompre le traitement et avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Plus fréquemment, peuvent survenir des effets indésirables, généralement légers et passagers :

• Des effets locaux cutanés de type rougeur, démangeaisons, irritation cutanée, érosion ou ulcérations locales.

• Très exceptionnellement, une augmentation de la sensibilité au soleil.

• D'autres effets généraux des anti-inflammatoires non stéroïdiens, fonction de la quantité de : appliquée, de la surface traitée et de son état, de la durée du traitement et de l'utilisation ou non d'un pansement fermé.

Il faut en avertir votre médecin ou votre pharmacien.

Déclaration des effets secondaires : Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmière.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. CONSERVATION ?

Inflammable, récipient pressurisé. Tenir à l'écart de la chaleur, du soleil. Ne pas pulvériser sur la flamme ni sur un objet incandescent. Ne pas vaporiser près des yeux ou sur le visage. Eviter l'inhalation directe.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Chaque contient VOV SPRAY en flacon pressurisé

• La substance active est pour 55 g :

Diclofénac Diéthylamine BP	1.16% p/p
Eq. à Diclofénac Sodium	1% p/p
Huile de lin Vierge BP	3% p/p
Salicylate de Méthyle BP	10% p/p
Menthol BP	5% p/p
Solvants & Propulseur q.s.p.	100%

Qu'est-ce que VOV SPRAY en flacon pressurisé et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de flacon pressurisé (PE/Aluminium) de 75 ml. Boîte de 1.

MEDNEXT BIOTECH LIMITED

Araji No.1845-46-47, Near Jain Temple,

Isval, Udaipur-313 011 (INDIA)

w w w . m e d n e x t p h a r m a . c o m



Manufactured in India/Fabrique en Inde.