



UPSA

ASPIRINE UPSA®

TAMPONNÉE EFFERVESCENTE / BUFFERED EFFERVESCENT
ACIDE ACÉTYLSALICYLIQUE / ACETYLSALICYLIC ACID

1000 mg

comprimé effervescent / effervescent tablet

ATTENTION

ASPIRINE UPSA TAMPONNEE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent QUI EST UN ANTI-INFLAMMATOIRE NON STEROIDIEN (AINS) PEUT ENTRAINER UNE MORT FETALE S'IL EST PRIS A PARTIR DU 6^{ME} MOIS DE GROSSESSE (24 semaines d'aménorrhée) MEME APRES UNE SEULE PRISE.
N'utilisez pas ce médicament si vous êtes enceinte de 6 mois et plus (24 semaines d'aménorrhée et plus).
Avant le 6^{ème} mois ou si vous envisagez une grossesse, vous ne devez pas prendre ce médicament, sauf en cas d'absolue nécessité déterminée par votre médecin.

Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.
- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien au-delà de 3 jours en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent ?
3. Comment prendre ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique : AUTRES ANALGÉSQUES ET ANTIPYRÉTIQUES-ANILIDES - code ATC : N02BA01. Ce médicament contient de l'aspirine. Ce médicament est un antalgique (il calme la douleur) et un antipyrétique (il fait baisser la fièvre). Il est indiqué en cas de douleur et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures et dans le traitement de certaines affections rhumatismales chez l'adulte et l'enfant de plus de 50 kg (à partir d'environ 15 ans). Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien après 3 jours, en cas de fièvre ou 5 jours en cas de douleur.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent ?

Ne prenez jamais ASPIRINE UPSA TAMPONNEE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent si vous êtes enceinte de 24 semaines d'aménorrhée et plus (6 mois et plus de grossesse) (voir ci-dessous « Grossesse, allaitement et fertilité »).
Au cours des 5 premiers mois de grossesse, vous ne devez pas prendre ASPIRINE UPSA TAMPONNEE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent, sauf en cas d'absolue nécessité qui est déterminée par votre médecin.
Si vous envisagez une grossesse et que vous prenez un AINS, parlez-en à un professionnel de la santé.

Ne prenez jamais ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent :

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.
- Si vous êtes enceinte, à partir du début du 6ème mois de grossesse (au-delà de 24 semaines d'aménorrhée),
- En cas d'antécédents d'asthme provoqué par l'administration d'aspirine ou d'un médicament apparenté (notamment anti-inflammatoires non stéroïdiens),
- En cas d'antécédents de saignement ou de perforation au niveau digestif lors d'un précédent traitement par un anti-inflammatoire non stéroïdien,
 - En cas d'ulcère ou d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum en évolution,
 - Si vous avez une maladie hémorragique ou risque de saignement,
 - Si vous avez une maladie grave du foie,
 - Si vous avez une maladie grave des reins,
 - Si vous avez une maladie grave du cœur,
- Si vous prenez un traitement par le méthotrexate en cours à des doses supérieures à 20 mg/semaine et lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement des affections rhumatismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) (voir rubrique "Autres médicaments et ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent").
- Si vous prenez un traitement avec des anticoagulants oraux et en cas d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum et lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses, comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement des affections rhumatismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) (voir rubrique "Autres médicaments et ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent").

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent.
- En cas de maux de tête survenant lors d'une utilisation prolongée et à fortes doses d'aspirine, vous ne devez pas augmenter les doses, mais prendre l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.
- L'utilisation régulière d'antalgiques, en particulier plusieurs antalgiques en association, peut conduire à des lésions des reins.

L'aspirine ne doit être utilisée qu'après avis de votre médecin :

- en cas de traitement d'une maladie rhumatismale,
- en cas de déficit en G6PD (maladie héréditaire des globules rouges), car des doses élevées d'aspirine ont pu provoquer des hémolyses (destruction des globules rouges),
- en cas d'antécédents d'ulcère de l'estomac ou du duodénum, d'hémorragie digestive ou de gastrite,
- en cas de maladie des reins, du foie, du cœur ou d'hypertension,
- en cas d'asthme : la survenue de crise d'asthme, chez certains sujets, peut être liée à une allergie aux anti-inflammatoires non stéroïdiens ou à l'aspirine. Dans ce cas, ce médicament est contre-indiqué,
- en cas de règles abondantes ou de contraception par stérilet,
- en cas de traitement concomitant avec d'autres médicaments qui augmentent le risque d'ulcère gastroduodénal ou hémorragie, par exemple des corticoïdes oraux, des antidépresseurs (ceux de type ISRS, c'est-à-dire Inhibiteurs Sélectifs de la Recapture de la Sérotonine), des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des médicaments prévenant la formation de caillots sanguins tels que le clopidogrel, le ticagrelor et la ticlopidine ou des anticoagulants tels que la warfarine, des médicaments tels que l'anagrelide, le cobimétinib, le déférasirox, le défibrotide, les héparines, l'ibrutinib, le nicorandil, les thrombolytiques et les médicaments mixtes adrénergiques-sérotinergiques. Si vous êtes dans un de ces cas, consultez votre médecin avant de prendre ASPIRINE UPSA TAMPONNEE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent (voir rubrique « Autres médicaments et ASPIRINE UPSA TAMPONNEE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent »).
- en cas de traitement concomitant avec du méthotrexate ou avec du pemetrexed chez les sujets ayant une fonction rénale faible à modérée (voir rubrique « Autres médicaments et ASPIRINE UPSA TAMPONNEE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent »).
- Au cours du traitement : en cas d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles, coloration des selles en noir), ARRÊTEZ LE TRAITEMENT ET CONTACTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN OU UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE.

- Les sujets âgés présentent un risque plus élevé d'effets indésirables, en particulier pour les hémorragies gastro-intestinales, ulcères et perforations. Les fonctions rénales, hépatiques et cardiaques doivent être étroitement surveillées. La posologie doit être la plus faible possible pendant la durée la plus courte nécessaire au soulagement des symptômes.

Ce médicament contient de l'aspirine. D'autres médicaments en contiennent. Vérifiez que vous ou votre enfant ne prenez pas d'autres médicaments contenant de l'aspirine et/ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens, y compris si ce sont des médicaments obtenus sans prescription. Ne les associez pas, afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée. (voir rubrique 3 « Comment prendre ASPIRINE UPSA TAMPONNEE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent ? »).

- Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne continuez pas le traitement et consultez votre médecin.
- L'aspirine augmente les risques hémorragiques dès les très faibles doses et ce même lorsque la prise date de plusieurs jours. PRÉVENIR VOTRE MÉDECIN TRAITANT, LE CHIRURGIEN, L'ANESTHÉSISTE OU VOTRE DENTISTE, dans le cas où un geste chirurgical, même mineur, est envisagé.
- Aux fortes doses utilisées en rhumatologie, il est recommandé de surveiller l'apparition des signes de surdosage : bourdonnements d'oreilles, baisse de l'audition ou vertiges. Si l'un de ces symptômes apparaît : **CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.**
- L'aspirine modifie l'uricémie (quantité de l'acide urique dans le sang).

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Enfants et adolescents

Ce dosage est réservé à l'adulte et à l'enfant de plus de 50 kg (à partir d'environ 15 ans). Pour les enfants (moins de 15 ans), prendre un dosage plus adapté. Demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

Autres médicaments et ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement des affections rhumatismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour), ce médicament ne doit pas être utilisé en association :
- avec le méthotrexate utilisé à des doses supérieures à 20 mg/semaine,
- avec des anticoagulants oraux et en cas d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum.

Ce médicament DOIT ÊTRE EVITÉ en association avec :

- l'acétazolamide, l'anagrelide,
- des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour) et en l'absence d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,
- des anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à faibles doses comme antiagrégant plaquettaire (50 à 375 mg par jour) et en cas d'antécédent d'ulcère de l'estomac ou du duodénum,
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement des affections rhumatismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),
- le clopidogrel, le défibrotide,
- les glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone), lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement des affections rhumatismales,
- les héparines utilisées à doses curatives et/ou chez le sujet âgé de plus de 65 ans, lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement des affections rhumatismales, ou dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),
- les médicaments utilisés dans le traitement de la goutte (probenécide),
- le nicorandil,
- le pemetrexed chez les sujets ayant une fonction rénale faible à modérée,
- le ticagrelor,
- la ticlopidine (voir rubrique « Avertissements et précautions »).

L'association de ASPIRINE UPSA TAMPONNEE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent avec les médicaments suivants doit être prise en compte ou faire l'objet de précautions d'emploi :

- angiotensinistes des récepteurs de l'angiotensine II, inhibiteurs de l'enzyme de conversion lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses comme anti-inflammatoire (≥ 1 g par prise et/ou ≥ 3 g par jour) notamment dans le traitement des affections rhumatismales ou dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),
- anticoagulants oraux, lorsque l'aspirine est utilisée à faibles doses comme antiagrégant plaquettaire (50 à 375 mg par jour),
- anti-inflammatoires non stéroïdiens, lorsque l'aspirine est utilisée à faibles doses comme antiagrégant plaquettaire (50 à 375 mg par jour),
- certains antidépresseurs (inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, médicaments mixtes adrénergiques-sérotinergiques),
- clopidogrel, cobimétinib, déférasirox, diurétiques,
- glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone), lorsque l'aspirine est utilisée à fortes doses dans le traitement de la fièvre ou des douleurs (≥ 500 mg par prise et/ou < 3 g par jour),
- héparines utilisées à doses curatives et/ou chez le sujet âgé de plus de 65 ans, lorsque l'aspirine est utilisée à faibles doses comme antiagrégant plaquettaire (50 à 375 mg par jour), héparines à doses préventives,
- ibrutinib, méthotrexate, pemetrexed, thrombolytiques, ticagrelor,
- topiques gastro-intestinaux, antiacides, adsorbants

WARNING

ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet WHICH IS A NON-STEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY (NSAID) CAN CAUSE FETAL DEATH IF TAKEN FROM THE 6TH MONTH OF PREGNANCY (24 weeks of amenorrhea) EVEN AFTER A SINGLE DOSE.
Do not use this medicine if you are 6 months or more pregnant (24 weeks of amenorrhea and more).
Before the 6th month or if you are planning to become pregnant, you should not take this medicine, unless absolutely necessary as determined by your doctor.

Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.
Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor, pharmacist or nurse has told you.
- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.
- You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 3 days in the case of fever, or 5 days in the case of pain.

What is in this leaflet ?

1. What ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet is and what it is used for ?
2. What you need to know before you take ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet ?
3. How to take ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet ?
4. Possible side effects
5. How to store ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet ?
6. Contents of the pack and other information.

1. WHAT ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet IS AND WHAT IT IS USED FOR ?

Pharmacotherapeutic group : OTHER ANALGESICS AND ANTIPYRETICS-ANILIDES - ATC code : N02BA01.

This medicinal product contains aspirin. This medicinal product is an analgesic (it relieves pain) and an antipyretic (it lowers fever). It is indicated in the case of pain and/or fever such as headaches, flu-like conditions, dental pain, muscle aches and for the treatment of certain rheumatic disorders in adults and children weighing more than 50 kg (from around 15 years of age). You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 3 days in the case of fever, or 5 days in the case of pain.

2. WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU TAKE ASPIRIN UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet ?

Do not take ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet if you are pregnant at 24 weeks of amenorrhea and more (6 months or more pregnant) (see below "Pregnancy, breast-feeding and fertility").
During the first 5 months of pregnancy, you should not take ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet, unless absolutely necessary as determined by your doctor.
If you are planning to become pregnant and are taking an NSAID, talk to a healthcare professional.

Do not take ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet :

- If you are allergic to the active substance or any of the other ingredients of this medicine listed in section 6,
- If you are pregnant, from the 6th month of pregnancy (beyond 24 weeks of amenorrhea),
- If you have a history of asthma triggered by the administration of aspirin or a related medicine (notably, non-steroidal anti-inflammatory drugs),
- If you have a history of bleeding or perforation of the digestive tract during previous treatment with a non-steroidal anti-inflammatory drug,
- In the event of ulcer or history of ulcer of the stomach or duodenum in progression.
- If you have a haemorrhagic disease or risk of bleeding,
- If you have serious liver disease,
- If you have serious kidney disease,
- If you have serious heart disease,
- If you are taking a treatment with methotrexate used at doses greater than 20 mg/week and when aspirin is used at high doses as an anti-inflammatory (≥ 1 g per dose and/or ≥ 3 g per day), notably in the treatment of rheumatismal diseases, or in the treatment of fever or pain (≥ 500 mg per dose and/or < 3 g per day) (see section "Other medicines and ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet").
- If you are taking a treatment with oral anticoagulants, and in the event of a history of stomach or duodenal ulcers, and when aspirin is used at high doses as an anti-inflammatory (≥ 1 g per dose and/or ≥ 3 g per day), notably in the treatment of rheumatismal diseases, or in the treatment of fever or pain (≥ 500 mg per dose and/or < 3 g per day) (see section "Other medicines and ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet").

Warnings and precautions

Talk to your doctor or pharmacist before taking ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet.

- In the event of headaches that occur during prolonged use and at high doses of aspirin, you should not increase doses, but ask for the opinion of your doctor or pharmacist.
- The regular use of analgesics, in particular several analgesics in combination, may lead to kidney damage.

Aspirin should only be used according to your doctor's advice :

- in the event of treatment of rheumatismal diseases,
- in the event of a G6PD deficiency (a hereditary disease affecting red blood cells), since elevated doses of aspirin could lead to hemolysis (destruction of red blood cells),
- in the event of a history of stomach or duodenal ulcers, gastrointestinal bleeding or gastritis,
- in the event of kidney, liver disease, heart disease or high blood pressure,
- in case of asthma : the occurrence of an asthma attack, in some patients, may be related to an allergy to non-steroidal anti-inflammatory medicinal products or aspirin. In this case, this medicinal product is contraindicated,
- in the event of heavy periods or contraception with an IUD,
- In case of concomitant treatment with other medicines that increase the risk of peptic ulcer or bleeding, for example oral corticosteroids, antidepressants (those classed as SSRIs, i.e. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors), non-steroidal anti-inflammatory drugs, medicines preventing blood clotting such as clopidogrel, ticagrelor and ticlopidine or anticoagulants such as warfarin, medicines such as anagrelide, cobimetinib, deferasirox, defibrotide, heparins, ibrutinib, nicorandil, thrombolytics, and mixed adrenergic-serotonergic medicines.
- If any of these cases is applicable to you, consult your doctor before taking ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet (see section "Other medicines and ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet").
- In case of concomitant treatment with methotrexate or with pemetrexed in patients with mild to moderate renal function (see section "Other medicines and ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet").
- During treatment : in the event of gastrointestinal haemorrhage (bleeding in the mouth, presence of blood in the stools, black-coloured stools), STOP TREATMENT, AND CONTACT A DOCTOR OR AN EMERGENCY MEDICAL SERVICE IMMEDIATELY.
- Elderly subjects are at higher risk of undesirable effects, in particular for gastrointestinal bleeding, ulcers and perforations. Renal, hepatic and cardiac functions should be closely monitored. The posology should be as low as possible for the shortest time necessary for the relief of symptoms.

This medicine contains aspirin. Other medicines contain it. Check that you or your child are not taking other medications containing aspirin and/or non-steroidal anti-inflammatories, including if they are medicines obtained without a prescription. Do not combine them so as not to exceed the daily recommended dose. (see section 3 "How to take ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet".)

- If pain persists for more than 5 days or fever for more than 3 days, or in the event of insufficient efficacy or the onset of any other signs, do not continue treatment, and consult your doctor.
- Aspirin increases the risk of haemorrhage even in very low doses and even if taken several days earlier. TELL YOUR PRIMARY DOCTOR, SURGEON, ANAESTHETIST OR DENTIST in the event surgery, even minor, is envisaged.
- At high doses used in rheumatology, it is recommended to monitor the onset of overdose : tinnitus, hearing loss or dizziness. If one of these symptoms appears : **CONTACT A DOCTOR IMMEDIATELY.**
- Aspirin modifies uricemia (quantity of uric acid in the blood).

Children and adolescents

This dosage is restricted for adults and children weighing more than 50 kg (from around 15 years of age). For children (under 15 years of age), take a more suitable dosage. If you have further questions, ask your doctor or pharmacist for advice.

Other medicines and ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken, or might take any other medicines. When aspirin is used at high doses as an anti-inflammatory (≥ 1 g per dose and/or ≥ 3 g per day), notably to treat rheumatism, or to treat fever or pain (≥ 500 mg per dose and/or < 3 g per day), this medicinal product must not be used in combination :

- with methotrexate used at doses greater than 20 mg/week,
- with oral anticoagulants and in the event of a history of stomach or duodenal ulcers.

This medicinal product IS TO BE AVOIDED in combination with :

- acetazolamide, anagrelide,
- oral anticoagulants, when aspirin is used at high doses in the treatment of fever or pain (≥500 mg per dose and/or < 3 g per day), and with no history of stomach or duodenal ulcers,
- oral anticoagulants, when aspirin is used at low doses as an anti-platelet aggregation agent (50 to 375 mg per day), and with a history of stomach or duodenal ulcers,
- non-steroidal anti-inflammatory drugs, when aspirin is used at high doses as an anti-inflammatory (≥1 g per dose and/or ≥3 g per day), in particular in the treatment of rheumatic disorders, or in the treatment of fever or pain (≥500 mg per dose and/or <3 g per day),
- clopidogrel, defibrotide,
- glucocorticoids (except hydrocortisone), when aspirin is used at high doses as an anti-inflammatory (≥1 g per dose and/or ≥3 g per day), in particular in the treatment of rheumatic disorders,
- heparins used at curative doses and/or in elderly subjects over 65 years, when aspirin is used at high doses as an anti-inflammatory (≥1 g per dose and/or ≥3 g per day), in particular in the treatment of rheumatic disorders, or in the treatment of fever or pain (≥500 mg per dose and/or <3 g per day),
- medicines used to treat gout, (probenecid),
- nicorandil,
- pemetrexed in subjects with weak to moderate renal function,
- ticagrelor,
- ticlopidine (see section "Warnings and precautions").

ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet in combination with the following medicines should be taken into account or require precautions for use:

- angiotensin II receptor antagonists, angiotensin-converting enzyme inhibitors when aspirin is used at high doses as anti-inflammatory (≥1 g per dose and/or ≥3 g per day), in particular in the treatment of rheumatic disorders, or in the treatment of fever or pain (≥500 mg per dose and/or <3 g per day),
- oral anticoagulants, when aspirin is used at low doses as a platelet antiaggregant (50 to 375 mg per day),
- non-steroidal anti-inflammatory drugs, when aspirin is used at low doses as a platelet antiaggregant (50 to 375 mg per day),
- some antidepressants (selective serotonin reuptake inhibitors, mixed adrenergic-serotonergic medicines),
- clopidogrel, cobimetinib, deferasirox, diuretics,
- glucocorticoids (except for hydrocortisone), when aspirin is used at high doses in the treatment of fever or pain (≥500 mg per dose and/or <3 g per day),
- heparins used at curative doses and/or in elderly subjects over 65 years old, when aspirin is used at low doses as a platelet antiaggregant (50 to 375 mg per day), heparins at preventative doses,
- ibrutinib, methotrexate, pemetrexed, thrombolytics, ticagrelor,
- gastrointestinal topicals, antacids and adsorbents.

WARNING : Proof color may not reflect true Pantone Color. Artworks may not be altered, in any way, without Exclusive Permission from BMS Package Design Dept.



ITEM CODE : 1504222

1
PANTONE
Black

UPSA

RECTO

	Country :	Font size :
	AFRIQUE	7 à 71%
Dimension :	160X500	
Folding :	160X(2X250)	
Plan :	NT AG 79 cab 23 mm	
Paper weight :	40g	

Version	Date	Operator	Version	Date	Operator
1	26/03/2025	PCo.	6		
2	31/03/2025	PCo.	7		
3	15/05/2025	PCo.	8		
4	15/05/2025	PCo.	9		
5			10		

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre tout médicament.

Grossesse

Ce médicament contient de l'aspirine (acide acétylsalicylique). Ne prendre AUCUN AUTRE médicament contenant de l'aspirine (y compris les médicaments sans ordonnance).

- **jusqu'à 100 mg par jour** : Pendant toute la grossesse, si nécessaire, votre médecin spécialiste peut être amené à vous prescrire de l'aspirine à faibles doses (inférieures ou égales à 100 mg par jour), dans des circonstances exceptionnelles nécessitant une surveillance spécialisée. Si tel est le cas, il est très important de respecter scrupuleusement l'ordonnance de votre médecin, sans dépasser les doses prescrites.

- **entre 100 et 500 mg par jour** : Par mesure de précaution, les recommandations ci-dessous s'appliquent, sauf prescription contraire de votre médecin spécialiste.

- **à partir de 500 mg par jour** :

A partir du début du 6^{ème} mois (24^{ème} semaine d'aménorrhée) jusqu'à la fin de la grossesse, ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent est **contre-indiqué**. Au cours de cette période, vous ne devez **EN AUCUN CAS** prendre ce médicament, car ses effets sur votre enfant à naître peuvent avoir des conséquences graves voire fatales. Notamment, il a été observé une toxicité pour le cœur, les poumons et/ou les reins, et cela **même avec une seule prise**. Cela peut également avoir des répercussions sur vous et votre bébé en favorisant les saignements et entrainer un accouchement plus tardif ou plus long que prévu.

Avant le début du 6^{ème} mois (jusqu'à la 24^{ème} semaine d'aménorrhée) ou si vous envisagez une grossesse, vous ne devez pas prendre ce médicament, sauf en cas d'absolue nécessité. Celle-ci sera déterminée par votre médecin. Le cas échéant, la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible. En effet, les AINS, dont fait partie ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent, peuvent causer des fausses couches et pour certains, des malformations après une exposition en début de grossesse.

À partir de 2 mois et demi de grossesse (12 semaines d'aménorrhée), ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent peut provoquer des problèmes rénaux chez votre bébé, s'il est pris pendant plusieurs jours, ce qui peut entrainer un faible niveau du liquide amniotique dans lequel il se trouve (oligamnios).

Dès le début du 5^{ème} mois de grossesse (20 semaines d'aménorrhée), un rétrécissement des vaisseaux sanguins au niveau du cœur de votre bébé (constriction du canal artériel) peut s'observer. Si un traitement de plusieurs jours est nécessaire pendant le 5ème mois de grossesse (entre 20 et 24 semaines d'aménorrhée), votre médecin peut recommander une surveillance supplémentaire.

Si vous avez pris ce médicament alors que vous étiez enceinte, parlez-en immédiatement à votre médecin, afin qu'une surveillance adaptée vous soit proposée si nécessaire.

Allaitement

L'aspirine passant dans le lait maternel, ce médicament est **déconseillé** pendant l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Fertilité

L'aspirine, comme tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), peut altérer la fertilité des femmes et entrainer des difficultés pour devenir enceinte, de façon réversible à l'arrêt du traitement. Informez votre médecin si vous planifiez une grossesse ou si vous avez des difficultés à concevoir.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent contient du lactose, de l'aspartam (source de phénylalanine) (E951), du sodium, du benzoate de potassium (E212) et dans l'arôme, des traces d'alcool benzylique et d'anhydride sulfureux (E220) dans l'arôme.

Ce médicament contient 1,6 g de lactose par comprimé effervescent. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Ce médicament contient 460 mg de sodium (composant principal du sel de table) par comprimé effervescent. Cela équivaut à 23 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé de sodium pour un adulte. Parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien si vous avez besoin d'un ou plus de comprimés effervescents quotidiennement pendant une période prolongée, surtout si vous devez suivre un régime à faible teneur en sel (sodium).

Ce médicament contient 20 mg d'aspartam (E951) par comprimé effervescent. L'aspartam contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les personnes atteintes de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare caractérisée par l'accumulation de phénylalanine ne pouvant être éliminée correctement.

Ce médicament contient 20 mg de benzoate de potassium (E212) par comprimé effervescent.

Ce médicament contient 0.00075 mg d'alcool benzylique par comprimé effervescent. L'alcool benzylique peut provoquer des réactions allergiques. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien si vous souffrez d'une maladie du foie ou du rein ou si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. De grandes quantités d'alcool benzylique peuvent s'accumuler dans votre corps et entrainer des effets secondaires (appelés « acidose métabolique »).

Ce médicament contient des traces d'anhydride sulfureux (E220) par comprimé effervescent. Peut, dans de rares cas, provoquer des réactions d'hypersensibilité sévères et des bronchospasmes.

3. COMMENT PRENDRE ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère. Vérifiez auprès de votre médecin, pharmacien ou infirmier/ère en cas de doute.

Posologie

Cette présentation est réservée à l'adulte et à l'enfant de plus de 50 kg (à partir d'environ 15 ans).

En cas de douleur, en cas de fièvre :

- Pour les **adultes et les enfants dont le poids est supérieur à 50 kg** (à partir d'environ 15 ans) : La posologie quotidienne maximale recommandée est de 3 g d'aspirine, soit 3 comprimés effervescents par jour.

La posologie usuelle est de 1 comprimé effervescent à 1000 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum, **sans dépasser 3 comprimés effervescents par jour**.

- Pour les **sujets âgés** :

La posologie quotidienne maximale recommandée est de 2 g d'aspirine, soit 2 comprimés effervescents par jour.

La posologie usuelle est de 1 comprimé effervescent à 1000 mg, à renouveler en cas de besoin au bout de 4 heures minimum, **sans dépasser 2 comprimés effervescents par jour**.

En cas d'affections rhumatismales :

Il est nécessaire de suivre les recommandations de votre médecin.

EN CAS DE DOUTE, DEMANDEZ CONSEIL À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

Mode et voie d'administration

Voie orale. Boire immédiatement après dissolution complète du contenu du comprimé effervescent dans un grand verre d'eau.

Fréquence d'administration

En cas de douleurs, en cas de fièvre :

Les prises systématiques permettent d'éviter les oscillations de douleur ou de fièvre. Elles doivent être régulièrement espacées d'au moins 4 heures.

En cas d'affections rhumatismales :

L'espacement entre les prises doit être de 4 heures au minimum.

Durée du traitement

En cas de douleurs, en cas de fièvre :

La durée du traitement est limitée : à 5 jours en cas de douleur, à 3 jours en cas de fièvre.
--

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours ou si elle s'aggrave, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin ou votre pharmacien.

En cas d'affections rhumatismales :

Se conformer à l'avis de votre médecin.

Si vous avez pris plus de ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent que vous n'auriez dû : Au cours du traitement, il est possible que surviennent des bourdonnements d'oreille, une sensation de baisse de l'audition, des maux de tête, des vertiges : ils traduisent habituellement un surdosage de l'aspirine.

IL FAUT INTERROMPRE VOTRE TRAITEMENT ET PRÉVENIR UN MÉDECIN.

En cas d'intoxication accidentelle (notamment fréquente chez les jeunes enfants), CONSULTER IMMÉDIATEMENT UN MÉDECIN.

Si vous oubliez de prendre ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent : Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les médicaments tels que l'ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent pourraient augmenter le risque d'hémorragie, d'hypertension, d'œdème, d'insuffisance cardiaque, d'hémorragie cérébrale et hémorragie intra-cranienne.

Il faut immédiatement arrêter votre traitement et avertir votre médecin dans les cas suivants :

- hémorragies digestives, perforation gastro-intestinale ou un ulcère digestif (douleur abdominale, douleur abdominale haute, rejet de sang par la bouche (« hématemèse ») ou dans les selles, coloration des selles en noir (« melaena »), gastrite, exacerbation d'une inflammation de l'intestin (« colite ») ou d'une maladie de Crohn (voir rubrique "Avertissements et précautions"). Celles-ci sont d'autant plus fréquentes que la posologie utilisée est élevée,

- réactions allergiques de type éruption cutanée, crise d'asthme, œdème de Quincke (urticaire du visage avec gêne respiratoire),

- bourdonnements d'oreille, sensation de baisse de l'audition, maux de tête, vertiges : ces signes traduisent habituellement un surdosage de l'aspirine.

- Très exceptionnellement peuvent survenir des manifestations bulleuses de la peau ou des muqueuses (sensation de brûlure accompagnée de rougeur avec bulles, cloques, ulcérations).

Avertir votre médecin en cas de douleurs abdominales, saignements de nez ou des gencives.

Des troubles digestifs (maux d'estomac, vomissements, nausées, diarrhée, constipation, flatulence, digestion difficile (« dyspepsie »), distension abdominale) ont été rapportés.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

A conserver à une température inférieure à 25°C et à l'abri de l'humidité. Bien reboucher le tube immédiatement après usage.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS.

Ce que contient ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent

- La substance active est : Acide acétylsalicylique 1000 mg. Pour un comprimé effervescent.

- Les autres composants sont : Bicarbonate de sodium*, acide citrique anhydre, benzoate de potassium (E212)*, lactose anhydre*, aspartam (E951)*, povidone, crospovidone, arôme orange (dont des traces d'alcool benzylique* et d'anhydride sulfureux (E220)*).

*Voir rubrique 2.

Qu'est-ce que ASPIRINE UPSA TAMPONNÉE EFFERVESCENTE 1000 mg, comprimé effervescent et contenu de l'emballage extérieur

Ce médicament se présente sous forme de comprimé effervescent. Boîte de 20.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Septembre 2024

Conseil d'éducation sanitaire

QUE FAIRE EN CAS DE FIEVRE :

La température normale du corps est variable d'une personne à l'autre et comprise entre 36,5°C et 37,5°C. Une élévation de température au-delà de 38°C peut être considérée comme une fièvre.

Ce médicament est destiné à l'adulte et à l'enfant de plus de 50 kg (à partir d'environ 15 ans).

Si les troubles que la fièvre entraîne sont trop gênants, vous pouvez prendre ce médicament qui contient de l'aspirine en respectant les posologies indiquées.

Pour éviter tout risque de déshydratation, pensez à boire fréquemment.

Avec ce médicament, la fièvre doit baisser rapidement. Néanmoins :

- Si d'autres signes inhabituels apparaissent.

- Si la fièvre persiste plus de 3 jours ou si elle s'aggrave,

- Si les maux de tête deviennent violents, ou en cas de vomissements.

CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.

QUE FAIRE EN CAS DE DOULEUR

L'intensité de la perception de la douleur et la capacité à lui résister varient d'une personne à l'autre.

- S'il n'y a pas d'amélioration au bout de 5 jours de traitement,

- Si la douleur est violente, inattendue et survient de façon brutale (notamment une douleur forte dans la poitrine) et/ou au contraire revient régulièrement,

- Si elle s'accompagne d'autres signes comme un état de malaise général, de la fièvre, un gonflement inhabituel de la zone douloureuse, une diminution de la force dans un membre,

- Si elle vous réveille la nuit.

CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE MÉDECIN.

Titulaire : UPSA SAS
3, RUE JOSEPH MONIER - 92500 RUEIL-MALMAISON - FRANCE
Information médicale et pharmacovigilance : Tél. : (+33) 3 21 18 22 70

Fabricant : UPSA SAS
979, AVENUE DES PYRÉNÉES - 47520 LE PASSAGE - FRANCE

Pregnancy, breast-feeding and fertility

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine.

Pregnancy

This medicine contains aspirin (acetylsalicylic acid). DO NOT TAKE ANY OTHER aspirin-containing medication (including over-the-counter medications).

- **up to 100 mg per day**: During pregnancy, your specialist doctor may prescribe aspirin at low doses (less than or equal to 100 mg per day) if necessary, in exceptional circumstances requiring specialized monitoring. If this is the case, it is very important to follow your doctor's prescription carefully and not exceed the prescribed doses.

- **100 to 500 mg per day**: As a precaution, the recommendations below apply unless your medical specialist prescribes otherwise.

- **Starting at 500 mg per day**:

From the start of the 6th month (24th week of amenorrhea) until the end of the pregnancy, ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet is **contraindicated**. During this period, you should under **NO CIRCUMSTANCES** take this medicine, because its effects on your unborn child can have serious or even fatal consequences. In particular, toxicity to the heart, lungs and/or kidneys has been observed, **even with a single dose**. This can also have repercussions on you and your baby by promoting bleeding and leading to a later or longer delivery than expected.

Before the start of the 6th month (until the 24th week of amenorrhea), or if you are planning a pregnancy, you should not take this medicine unless your doctor deems it absolutely necessary. This will be determined by your doctor. If applicable, the dose should be as low as possible and the treatment duration as short as possible.

Indeed, NSAIDs, including ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet, can cause miscarriages and, for some, malformations after exposure in early pregnancy.

From 2 and a half months of pregnancy (12 weeks of amenorrhea), ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet can cause kidney problems in your unborn baby, if taken for more than a few days, which may lead to low levels of amniotic fluid that surrounds the baby (oligohydramnios).

From the beginning of the 5th month of pregnancy (20 weeks of amenorrhea), a narrowing of the blood vessels in your baby's heart (constriction of the ductus arteriosus) may be observed. If treatment for several days is necessary during the 5th month of pregnancy (between 20 and 24 weeks of amenorrhea), your doctor may recommend additional monitoring.

If you have taken this medicine while pregnant, inform your doctor immediately so that suitable monitoring can be implemented if necessary.

Breast-feeding

As aspirin is excreted in human milk, it should not be used while breast-feeding. Ask your doctor or pharmacist for advice before taking any medicine

Fertility

Aspirin, like all nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), may alter female fertility and lead to difficulty becoming pregnant, which is reversible upon treatment discontinuation. Inform your doctor if you are planning to become pregnant or if you have difficulty conceiving.

Driving and using machines

ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet has no influence on the ability to drive and use machines.

ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet contains lactose, aspartame (source of phenylalanine) (E951), sodium, potassium benzoate (E212) and in the flavouring, traces of benzyl alcohol and sulphur dioxide (E220).

This medicine contains 1,6 g lactose in each effervescent tablet. If you have been told by your doctor that you have an intolerance to some sugars, contact your doctor before taking this medicine.

This medicine contains 460 mg sodium (main component of table salt) in each effervescent tablet.

This is equivalent to 23% of the recommended maximum daily dietary intake of sodium for an adult. Talk to your doctor or pharmacist if you need one or more effervescent tablets daily for a prolonged period, especially if you have been advised to follow a low salt (sodium) diet.

This medicine contains 20 mg aspartame (E951) in each effervescent tablet. Aspartame is a source of phenylalanine. It may be harmful if you have phenylketonuria (PKU), a rare genetic disorder in which phenylalanine builds up because the body cannot remove it properly.

This medicine contains 20 mg potassium benzoate (E212) in each effervescent tablet.

This medicine contains 0.00075 mg benzyl alcohol in each effervescent tablet. Benzyl alcohol may cause allergic reactions. Ask your doctor or pharmacist for advice if you are pregnant or breast-feeding or in case of liver or kidney disease. This is because large amounts of benzyl alcohol can build-up in your body and may cause side effects (called "metabolic acidosis").

This medicine contains traces of sulphur dioxide (E220) in each effervescent tablet. It may rarely cause severe hypersensitivity reactions and bronchospasm.

3. HOW TO TAKE ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet ?

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor, pharmacist or nurse has told you. Check with your doctor, pharmacist or nurse if you are not sure.

Posology

This presentation is reserved for adults and children weighing over 50 kg (from around 15 years of age).

In the event of pain, in the event of fever :

- For **adults and children weighing over 50 kg** (starting at around 15 years old) : The maximum recommended daily posology is 3 g of aspirin, or 3 effervescent tablets per day.

The usual posology is one 1000 mg effervescent tablet, to be renewed if necessary after 4 hours minimum, **without exceeding 3 effervescent tablets per day**.

- For **elderly subjects** :

The maximum recommended daily posology is 2 g of aspirin, or 2 effervescent tablets per day. The usual posology is one 1000 mg effervescent tablet, to be renewed if necessary after 4 hours minimum, **without exceeding 2 effervescent tablets per day**.

In the event of rheumatismal diseases :

It is necessary to follow your doctor's recommendations.

IF YOU HAVE ANY FURTHER QUESTIONS, ASK YOUR DOCTOR OR PHARMACIST FOR ADVICE.

Method and route of administration

Oral use. Drink immediately after the complete dissolution of the effervescent tablet in a large glass of water.

Frequency of administration

In the event of pain, in the event of fever :

Systematic administration helps to prevent oscillations in pain or fever.

The administrations should be spaced out at regular intervals at least 4 hours apart.

In the event of rheumatismal diseases :

The interval between administrations should be a minimum of 4 hours.

Duration of treatment

In the event of pain, in the event of fever :

The duration of treatment is limited : to 5 days, in the event of pain, to 3 days, in the event of fever.
--

If the pain persists for more than 5 days or fever for more than 3 days, or worsens, do not continue treatment without the advice of your doctor or pharmacist.

In the event of rheumatismal diseases :

Ask for your doctor's opinion.

If you take more ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet than you should : During treatment, it is possible that tinnitus, sensation of hearing loss, headaches and dizziness may occur : these are the usual signs of an aspirin overdose.

YOU ARE TO STOP TREATMENT, AND INFORM A DOCTOR.

In the event of accidental poisoning (notably, frequent in young children), CONTACT A DOCTOR IMMEDIATELY.

If you forget to take ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet

Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

If you have any further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them. Medicines such as ASPIRIN UPSA BUFFERED EFFERVESCENT 1000 mg, effervescent tablet may increase the risk of bleeding, hypertension, oedema, heart failure, brain haemorrhage and intracranial haemorrhage.

You must immediately stop your treatment, and inform your doctor in the following cases :

- gastrointestinal bleeding, gastrointestinal perforation or peptic ulcer (abdominal pain, upper abdominal pain, vomiting blood ("haematemesis") or blood in the stools, black stools colouring ("melaena"), gastritis, exacerbation of bowel inflammation ("colitis") or of Crohn's disease (see "Warnings and precautions" section). These occur more frequently when taking high doses,

- allergic reactions such as a cutaneous eruptions, asthma attacks or angioedema (facial urticaria accompanied with difficulty breathing),

- tinnitus, sensation of hearing loss, headaches, vertigo : these are the usual signs of an aspirin overdose.

- Very rarely bullous manifestations of the skin or mucosa (burning sensation accompanied with redness with bubbles, blistering and ulcerations) may occur.

Inform your doctor if you experience abdominal pain, nose bleeds or bleeding gums.

Digestive disorders (stomach ache, vomiting, nausea, diarrhoea, constipation, flatulence, difficult digestion ("dyspepsia"), abdominal distension) have been reported.

Reporting of side effects

If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. By reporting side effects you can help provide more information on the safety of this medicine.

5. HOW TO STORE ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet ?

Keep this medicine out of the sight and reach of children.

Do not use this medicine after the expiry date which is stated on the carton. The expiry date refers to the last day of that month.

Store below 25°C, and keep away from humidity. Close well the tube immediately after use.

Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.

6. CONTENTS OF THE PACK AND OTHER INFORMATION

What ASPIRINE UPSA EFFERVESCENT BUFFERED 1000 mg, effervescent tablet contains

- The active substance is : Acetylsalicylic acid 1000 mg. For one effervescent tablet.

- The other ingredients are : Sodium bicarbonate*, anhydrous citric acid, potassium benzoate (E212)*, anhydrous lactose, aspartame (E951)*, povidone, crospovidone, orange flavouring (including traces of benzyl alcohol and sulphur dioxide (E220)*).

*See section 2.