

Pharmacopée de référence : USP courante

Métronidazole..... 250 mg

Excipients (amidon de maïs, cellulose microcristalline, croscarmellose sodium, lactose monohydrate, polyvinylpyrrolidone, silice colloïdale, stéarate de magnésium) ... qsp un comprimé

Antibiotique de la famille des nitro-5 imidazolés - Antiparasitaire

INDICATIONS

Traitement des infections dues aux germes définis comme sensibles :

Traitement des infections dues aux germes définis comme sensibles :

- Amibiases (*Entamoeba histolytica*) - Trichomonases urogenitales (*Trichomonas vaginalis*)
- Vaginites non spécifiques - Lambiases (*Giardia intestinalis*).

- Traitement curatif des infections médicochirurgicales à germes anaérobies sensibles

- Relais des traitements curatifs par voie injectable des infections des germes anaérobies sensibles

- Hypersensibilité aux imidazoles ou à d'autres constituants de ce médicament.

- Disulfirame ou Alcool

- En cas d'antécédents de troubles hématologiques, de traitement à forte dose et/ou de traitement

prolongé, il est recommandé de pratiquer régulièrement des examens sanguins, particulièrement le contrôle de la formule leucocytaire.

- En cas de traitement prolongé, surveiller l'apparition de signes évocateurs d'effets indésirables à type de neuropathie

- Eviter les boissons alcoolisées.

- Interrompre le traitement en cas d'ataxie, de vertiges, de confusion mentale

- En raison de la présence de lactose, ce médicament est contre-indiqué en cas de galactosemie congénitale, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose, ou de déficit en lactase.

- Troubles digestifs bénins (douleurs épigastriques, nausées, vomissements, diarrhée)

- Glossite avec sensation de sécheresse de la bouche, goût métallique, anorexie

- Bouffées congestives, prurit, éruption cutanée parfois fébrile

- Urticaire, œdème de Quincke, exceptionnellement choc anaphylactique

- Céphalées

- Convulsions, vertiges, ataxie, confusion, hallucinations

- Apparition d'une coloration brun-rougeâtre des urines due à la présence de pigments hydrosolubles provenant du métabolisme du métronidazole.

- Alcool : effet antabuse (chaleur, rougeurs, vomissements, tachycardie)

- Busulfan : avec le busulfan a fortes doses : doublement des concentrations de busulfan par le métronidazole

- Disulfurame : bouffées délirantes, état confusionnel

Amibiases : pendant 7 jours consécutifs

Adultes : 1,5 g/jour en 3 prises.

Enfants : 30 à 40 mg/kg/jour en 3 prises

Trichomonases:

Chez la femme : 500 mg par jour en deux prises pendant 10 jours ou traitement à dose unique de 2 g en une seule prise. Un traitement local doit être associé au traitement oral (un ovule de métronidazole par jour pendant 10 jours).

Traiter concurremment le partenaire (500 mg par jour en 2 prises pendant 10 jours)

Lamblases : pendant 5 jours consécutifs

- Adultes : 750 mg à 1 g par jour

- Enfants (10 à 15 ans) : 500 mg par jour

500 mg 2 fois par jour pendant 7 jours. Le partenaire aussi doit être traité simultanément

Traitement des infections dues aux germes anaérobies sensibles (en première intention ou en traitement de relais) : pendant 7 à 10 jours.

- Adultes : 1 à 1,5 g/jour

- Enfant : 20 à 30 mg/kg/jour

TENIR HORS DE LA PORTEE DES ENFANTS

PHARMAQUICK by ABT SA

Zone Industrielle d'AKPAKPA 06 BP 713 COTONOU

Tel. (229) 21 33 07 58 - e-mail : info@pharmaquickbyabta.com

(Dernière révision : avril 2022)

Page 34 sur 40