Dans Bisoprolol

Atenolol Denk 50

Comprimé pelliculé – voie orale
Bisoprolol
Substance active: atenolol

Notice : Information du patient

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.
- Gardez cette notice. Vous pourrez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nuisible, même si les signes de leur maladie ne sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne figurerait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce qu'Atenolol Denk et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Atenolol Denk
3. Comment prendre Atenolol Denk
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Atenolol Denk
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Atenolol Denk et dans quel cas est-il utilisé

Atenolol Denk est un médicament qui réduit l'excitabilité du cœur et bloquent ses récepteurs bêta.

Atenolol Denk 50 est utilisé en cas de :
- troubles de la fonction cardiovasculaire susceptibles de se manifester par une tendance à une élévation persistante de la fréquence cardiaque, une douleur thoracique ou une dilatation temporaire de certaines artères.
- Douleurs thoraciques (ou cardiaques lancinantes) survenant régulièrement après un effort physique ou stressant, qui apparaissent uniquement après un effort physique ou stressant, qui persistent au repos et sont soulagées à une fréquence cardiaque rapide et une hypertension.
- Troubles du rythme cardiaque, si votre médecin vous diagnostique l'une des affections suivantes:

Troubles du rythme cardiaque provenant des oreillettes du cœur
- en cas de traitement complémentaire si une thyroïde hyperactive accélère votre rythme cardiaque
- en suites des battements cardiaques en provenance des oreillettes du cœur sont ressentis comme gênants.
- en cas de fibrillation et de flutter auriculaires, si les traitements à haute dose par des médicaments pour le cœur (digoxine) ne sont pas efficaces dans votre cas.

Troubles du rythme cardiaque provenant des ventricules du cœur
- si des battements cardiaques sont générés dans les ventricules du cœur en dehors du rythme cardiaque normal en raison d'une activité accrue de certaines voies nerveuses (lors d'une activité physique, ou début d'une anesthésie, comportement à certains sentiments (anesthésie à l'halothane) et d'autres médicaments (sympathomimétiques excepté).
- si votre rythme cardiaque du rythme cardiaque rapide provenant des ventricules du cœur en fibrillation ventriculaire (par mesure de prévention, en particulier si les troubles du rythme cardiaque provenant des ventricules du cœur sont due à une activité accrue de certaines voies nerveuses)
- Tension artérielle élevée (hypertension)

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Atenolol Denk

Ne prenez jamais Atenolol Denk
- si vous êtes allergique à l'atenolol, à d'autres bêta-bloquants ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6);
- si vous souffrez d'insuffisance cardiaque;
- si vous souffrez d'une défaillance circulatoire générale;
- si vous souffrez de troubles mineurs de la vitesse de conduction des stimulations nerveuses et les ventricules du cœur;
- si vous avez un diabète et que votre glycémie fluctue considérablement. Si vous présentez des pathologies accompagnées d'une glycémie très basse, la fréquence cardiaque rapide n'est plus détectée comme un avertissement;
- si vous avez pratiqué un jeûne strict ou une activité physique intense pendant une durée prolongée, car vous risquez ensuite de développer des pathologies accompagnées d'une glycémie gravement réduite;
- si vous présentez une tumeur de la médulle surrénale, cardio-dépressifs mieux appliable par des médicaments appropriés;
- si vous souffrez d'insuffisance rénale (voir également la rubrique 3, « Comment prendre Atenolol Denk »).

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Atenolol Denk.

Vous devez faire l'objet d'une attention particulière lorsque vous prenez Atenolol Denk:
- si vous souffrez de troubles mineurs de la vitesse de conduction des stimulations nerveuses et les ventricules du cœur;
- si vous avez un diabète et que votre glycémie fluctue considérablement. Si vous présentez des pathologies accompagnées d'une glycémie très basse, la fréquence cardiaque rapide n'est plus détectée comme un avertissement;
- si vous avez pratiqué un jeûne strict ou une activité physique intense pendant une durée prolongée, car vous risquez ensuite de développer des pathologies accompagnées d'une glycémie gravement réduite;
- si vous présentez une tumeur de la médulle surrénale, cardio-dépressifs mieux appliable par des médicaments appropriés;
- si vous souffrez d'insuffisance rénale (voir également la rubrique 3, « Comment prendre Atenolol Denk »);
- si vous ou un membre de votre famille avez ou avez eu un psoriasis;
- si vous souffrez d'un angor de Prinzmetal (douleurs thoraciques ou cardiaques dues à une circulation réduite dans le muscle cardiaque), car la fréquence et l'intensité des douleurs thoraciques ou cardiaques sont susceptibles d'augmenter;
- si vous avez déjà eu une réaction d'hypersensibilité sévère (allergie) et que avez été traité(e) pour une hypersensibilité exécutoire, car une augmentation de l'hypersensibilité est possible;
- si vous souffrez de légères troubles de la circulation dans les bras ou les jambes, car ils pourraient être exacerbés.

Les médicaments de la même classe de substances que Atenolol Denk peuvent masquer les signes d'une thyroïde hyperactive.

Si votre fréquence cardiaque chute trop, votre médecin est susceptible de réduire la posologie.

Si votre circulation est réduite dans la muscle cardiaque, vous ne devez pas cesser brusquement du jeûne les médicaments du groupe de substances de l'Atenolol Denk.

Si vous souffrez d'une affection cutanée, prévenir votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Vous devez faire l'objet d'une attention particulière lorsque vous prenez Atenolol Denk:
- si vous souffrez de troubles mineurs de la vitesse de conduction des stimulations nerveuses et les ventricules du cœur;
- si vous avez un diabète et que votre glycémie fluctue considérablement. Si vous présentez des pathologies accompagnées d'une glycémie très basse, la fréquence cardiaque rapide n'est plus détectée comme un avertissement;
- si vous avez pratiqué un jeûne strict ou une activité physique intense pendant une durée prolongée, car vous risquez ensuite de développer des pathologies accompagnées d'une glycémie gravement réduite;
- si vous présentez une tumeur de la médulle surrénale, cardio-dépressifs mieux appliable par des médicaments appropriés;
- si vous souffrez d'insuffisance rénale (voir également la rubrique 3, « Comment prendre Atenolol Denk »);
- si vous ou un membre de votre famille avez ou avez eu un psoriasis;
- si vous souffrez d'un angor de Prinzmetal (douleurs thoraciques ou cardiaques dues à une circulation réduite dans le muscle cardiaque), car la fréquence et l'intensité des douleurs thoraciques ou cardiaques sont susceptibles d'augmenter;
- si vous avez déjà eu une réaction d'hypersensibilité sévère (allergie) et que avez été traité(e) pour une hypersensibilité exécutoire, car une augmentation de l'hypersensibilité est possible;
- si vous souffrez de légères troubles de la circulation dans les bras ou les jambes, car ils pourraient être exacerbés.

Les médicaments de la même classe de substances que Atenolol Denk peuvent masquer les signes d'une thyroïde hyperactive.

Si votre fréquence cardiaque chute trop, votre médecin est susceptible de réduire la posologie.

Si votre circulation est réduite dans la muscle cardiaque, vous ne devez pas cesser brusquement du jeûne les médicaments du groupe de substances de l'Atenolol Denk.

Si vous commencez à avoir des difficultés à respirer ou à rester allongé(e) à cause d'un essoufflement, vous devez consulter un médecin de première. Atenolol Denk et de manière à votre médecin de vous administrer un traitement permettant de dilater les voies aériennes.

Surveillez l'apparition de vertiges ou de pertes de sang sur votre peau et vos muqueuses et informez votre médecin si vous en trouvez.

Population pédiatrique

Ce médicament n'est pas destiné à être utilisé chez l'enfant, car il n'existe aucune expérience concernant le traitement des enfants par Atenolol Denk.

Patients âgés

Votre médecin est susceptible de réduire la posologie, en particulier si vous souffrez d'insuffisance rénale.

Autres médicaments et Atenolol Denk

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez/utilisez, avez récemment pris/utilisé ou pouvez prendre/utiliser tout autre médicament.

L'effet des substances ou des groupes de produits repertoriés ci-dessous peut être affecté pendant le traitement simultané par Atenolol Denk:

- **Médicaments réduisant la glycémie à prendre par voie orale, insuline** : l'atenolol est susceptible d'amoindrir l'effet d'abaissement de la glycémie. Les signes avertisseurs d'une hypoglycémie, en particulier une forte fréquence cardiaque et des troubles du rythme, sont masqués ou atténués. Contrôlez régulièrement votre glycémie.
- **Médicaments relaxant les muscles pendant une intervention chirurgicale (par ex., halogénure de suxamethonium, tubocurarine)** : vasoaxation et abaissement du rythme relaxant sur les muscles. Si vous devez subir une intervention chirurgicale, indiquez à l'anesthésiste que vous prenez Atenolol Denk.

Atenolol Denk est affecté comme suit :

Amplification de son effet dans une mesure susceptible d'augmenter le risque d'effets indésirables :
- **Médicaments traitant l'hypertension, diurétiques, médicaments dilatant les vaisseaux sanguins, certains médicaments traitant la dépression (antidépresseurs tricycliques), somnifères et sédatifs (barbituriques et phénothiazines)** : augmentation de l'effet réducteur de la tension artérielle.
- **Médicaments traitant les troubles du rythme cardiaque (inhibiteurs calciques de type vérapamil ou diltiazem)** : augmentation de l'effet réducteur de la tension artérielle, bradycardie et trouble de la conduction auriculo-ventriculaire.
- **Médicaments traitant les troubles du rythme cardiaque (inhibiteurs calciques de type vérapamil ou diltiazem)** : augmentation de l'effet réducteur de la tension artérielle, bradycardie et trouble de la conduction auriculo-ventriculaire.
- **Médicaments traitant l'angor (nitrates, dérivés de la nitroglycérine, mononitrate d'isosorbide, dinitrate d'isosorbide