

Front

Read this leaflet carefully before you start taking this medicine.
Keep this leaflet. You may need may need to read this again.

- If you have any further questions, please ask your doctor or pharmacist.
- This medicine is prescribed for you personally and you should not pass it on others. It may harm them, even if their symptoms are the same as yours.

CIPROZEDTM 750

(Ciprofloxacin tablets 750 mg)

Composition
CIPROZED Tablets 750mg
Each film coated tablet contains:
Ciprofloxacin Hydrochloride USP eq. to Ciprofloxacin.....750 mg
Excipients: Maize starch, Microcrystalline cellulose, Croscarmellose Sodium
Magnesium Stearate, Purified talc, Colloidal Anhydrous Silica, Hydroxy propyl methyl cellulose, Isopropyl alcohol, Methylene chloride, Ethyl cellulose, Polyethylene glycol 6000, Titanium Dioxide, Propylene glycol.

Présentation:
CIPROZED 750 mg Tablet B/10

Thérapeutique - class:
Antibiotic from the family of quinolones (J : Anti-infective agent)

Indications:
CIPROZED is indicated in the treatment of, gonococcal urethritis in men, complicated or non complicated lower and upper tract urinary infections (including prostatitis) or not, intestinal infections, alternate treatment for osteoarticular infections, chronic sinusitis, cross infection of chronic otitis (of whatever kind), and of the lateral cavities, pre-operative, preparations and chronic otitis media or cholesteatoma, relay treatment for external malignant otitis, severe Gram negative bacillus infections and sensitive staphylococcus in the following infection manifestations, (respiratory, ENT, renal and urogenital, including prostate pelvic and gynaecological, bone and articulations, intestinal and hepatobiliary skin).

Dosage and directions for use:
- The tablets must be taken after meals and swallowed whole.
Complicated or non complicated upper and lower tract urinary infections (including prostatitis), malignant external otitis (maximum course of treatment 1 to 2 month); severe Gram negative infections and sensitive staphylococcus infections in renal and urogenital locations including prostate, pelvic, gynaecological, intestinal, hepatobiliary.
1 tablet 1000mg per day or according to the doctor.
- Skin, ENT and respiratory local infections: 1000 to 1500 mg per day during 4 to 5 weeks.

Contraindications
- Allergy to Ciprofloxacin or to any product in the family of quinolones.
- Previous medical history of fluoroquinolones.

Side effects
- Digestive problems abdominal pain, discomfort and cramps, anorexia, nausea, vomiting, diarrhoea, meteorism (bloating).
- Neurosensory symptoms, headaches, dizziness.
Exceptionally fatigue visual disturbances, insomnia, drunken feelings, hallucinations, convulsion, parasthesia.
- Pain in the muscles and/or joints, tendonitis, rupture of the Achilles' tendon, may occur in the first 48 hours of treatment and bit both sides.
- Allergy reactions skin rash: very rarely: Steven-Johnson or Lyell syndrome, hepatitis.
- Rarely: leucocytopenia, thrombocytopenia, eosinophilia and increase in transaminases alkaline phosphatase, in bilirubin in the serum blood urea and creatine, microscopy haematuria.
- A few very rare cases of kidney disorders, which are reversed once the treatment is stopped, and of increased intracranial pressure or haemolytic anaemia have been reported.

Precautions:
- Stop the therapy if a photo toxicity occurs.
- Administer the Ciprofloxacin with caution in patients with epilepsy or a history of CNS disorders
- Reduce the dose in case of renal impaired

Drug Interactions
Precautions and required with the following associations.
Oral anticoagulant therapy (described for warfarine): the oral anticoagulant effect is intensified and the risk of haemorrhage increases: Didanosine: hinders the absorption of fluoroquinolones because of the increase in the gastric pH level. Take the Didanosine at a different time from the fluoroquinolones (more than two hours apart if possible).
Sucralfate, or zinc (salts): hinders the absorption of ciprofloxacin during digestion. Iron (salts), orally, reduction of the bioavailability of the fluoroquinolones through chelation and a non specific effect on the digestive tube's capacity for absorption. Cytoprotectives (salts, magnesium, aluminium and calcium oxides and hydroxides): reduction in the absorption of ciprofloxacin during digestion. Theophylline (bise and salts), Aminophylline increase in Theophylline with a risk of Theophylline overdose (reduced catabolism of Theophylline).

Pregnancy and lactation
Pregnancy:
The risk to the articulations following postnatal administration means that the use of fluoroquinolones during pregnancy is not advisable. However, the discovery of a Pregnancy that has been exposed to this class of antibiotics does not justify termination.
Lactation: If this drug is administered, lactation is not advisable since fluoroquinolones can pass into the maternal milk and thus transfer the articulatory risk.



Manufactured in India/Fabriqué en Inde
ALICE PHARMA PVT. LTD.
201, Navneet Darshan, 16/2, Old Palasia, INDORE - 452 001 (M.P.)
Works at : 275, Sector 'F', Sanwer Road, Indore, India-452015

Back

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pouvez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autre question, si vous avez un doute, demandez plus de information SVP à votre médecin ou pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques. Cela pourrait lui être nocif.

CIPROZEDTM 750

(Comprimés de 750 mg)

Composition
CIPROZED comprimés de 750 mg
Chaque comprimé pelliculé contient :
Ciprofloxacin.....750 mg

Excipients: Amidon de maïs, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, sodium de Croscarmellose, talc purifié, silice anhydre colloïdale, cellulose méthylglycolique hydroxy, alcool de isopropyle, chlorure de méthylène, cellulose éthylglycol, polyéthylène glycol - 6000, bioxyde titanique, glycol de propylène.

Présentation:
CIPROZED 750 mg comprimé, B/10

Classe thérapeutique:
Antibiotique de la famille des quinolones (J : Anti-infectieux)

Indications thérapeutiques:
CIPROZED est indiqué dans le traitement : de l'urétrite gonococcique chez l'homme, des infections urinaires basses et hautes compliquées (y compris prostatites) ou non, des infections intestinales, de relais des infections ostéoarticulaires, des sinusites chroniques, des poussées de surinfections des otites chroniques (quelle que soit la nature), et des cavités des préparations préopératoires, d'otites chroniques, ostéiques ou cholestéatomateuses, des traitements de relais des otites malignes externes, des infections sévères à bacille Gram- et à staphylocoques sensibles dans les manifestations suivantes, (respiratoires, ORL, rénales et urogénitales, y compris prostatiques, pelvienne et gynécologiques, osseuses et articulaires, intestinales et hépatobiliaires, cutanées).

Posologie et mode d'administration:
- Les comprimés doivent être avalés en entier après les repas.
- Infections urinaires basses et hautes, compliquées ou non (y compris prostatiques), otite maligne externe (durée maximale du traitement 1 à 2 mois); localisations rénale et urogénitales, y compris prostatique, pelvienne, gynécologique, intestinale, hépatobiliaire: 1 comprimé à 1000mg par jour ou selon le médecin.
- Infections ostéoarticulaires, cutanée, ORL et respiratoire: 1000 à 1500 mg/jour.

Contre-indications
- Hypersensibilité à la Ciprofloxacin ou à un produit de la famille des quinolones.
- Antécédents de tendinopathies avec des fluoroquinolones.

Effets indésirables
Troubles digestifs, céphalées, étourdissements, douleurs musculaires et/ou articulaires, tendinites, rupture du tendon d'Achille qui peuvent survenir dès les premières 48 heures de traitement et se bilatéraliser. Manifestations allergiques : type urticaire, quelques cas très rares de néphropathie, réversibles à l'arrêt du traitement, d'hypertension intracrânienne ou d'anémie hémolytique, ont été rapportés.

Précautions:
- Interrompre la thérapie si une photo toxicité se produit,
- Administrer la Ciprofloxacin avec précaution chez les patients souffrant d'épilepsie ou présentant des antécédents des troubles du système nerveux central,
- Réduire la dose en cas d'insuffisance rénale

Interactions médicamenteuses
Associations nécessitant des précautions d'emploi
- Anticoagulants oraux (décrit pour la warfarine): augmentation de l'effet de l'anticoagulant oral et du risque hémorragique.
Didanosine: diminution de l'absorption des fluoroquinolones en raison de l'augmentation du pH gastrique. Sucralfate, ou zinc (sels) diminution de l'absorption digestive de la Ciprofloxacin. Theophylline (base et sels), aminophylline augmentation de la théophylline avec un risque de surdosage en théophylline (diminution du catabolisme de la théophylline).
Grossesse et allaitement
Grossesse: Le risque articulaire consécutif aux administrations postnatales fait déconseiller l'utilisation des fluoroquinolones pendant la grossesse. Toutefois, la découverte d'une grossesse exposée à cette classe antibiotique n'en justifie pas l'interruption.
Allaitement: L'administration de ce médicament est contre indiquée au cours de l'allaitement, en raison du passage des fluoroquinolones dans le lait maternel et du risque articulaire.



Manufactured in India/Fabriqué en Inde
ALICE PHARMA PVT. LTD.
201, Navneet Darshan, 16/2, Old Palasia, INDORE - 452 001 (M.P.)
Works at : 275, Sector 'F', Sanwer Road, Indore, India-452015