

DOXYCYCLINE 100 mg et 200 mg, comprimé pelliculé

COMPOSITION POUR UN COMPRIMÉ :

	Comprimé de 100 mg	Comprimé de 200 mg
Doxycycline (sous forme d'hydrate de doxycycline).....	100 mg	200 mg
Excipients : Copovidone, Laurylsulfate de Sodium, Silice colloïdale anhydre, Silice colloïdale hydratée, Stéarate de magnésium végétal, Crospovidone, Cellulose microcristalline, Opadry.		

QU'EST-CE QUE DOXYCYCLINE, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

La doxycycline est un antibiotique de la famille des tétracyclines.

Il est indiqué dans le traitement des infections à germes sensibles à la doxycycline dans leurs manifestations respiratoires, génitales, urinaires, cutanées, oculaires ou générales.

Votre médecin peut aussi vous le prescrire dans le traitement de certaines formes d'acné ainsi que dans la rosacée dans ses manifestations cutanées ou oculaires.

QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE DOXYCYCLINE, comprimé pelliculé ?

Contre-indications

Ne pas prendre ce médicament dans les cas suivants :

- si vous êtes hypersensible (allergique) aux tétracyclines,
- en association avec les rétinoïdes par voie générale (médicaments utilisés pour l'acné) (voir Interaction avec d'autres médicaments),
- pendant les deuxième et troisième trimestres de la grossesse ainsi que chez les femmes allaitant (voir Grossesse et allaitement),
- chez l'enfant de moins de huit ans (en raison du risque de coloration permanente des dents et du développement insuffisant de l'émail dentaire).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Précautions d'emploi : Mises en garde spéciales

Eviter de vous exposer directement au soleil et aux U.V. en raison des risques de sensibilisation à la lumière. Le traitement doit être interrompu en cas d'apparition de rougeurs sur la peau.

Respecter les conditions de prise du médicament (voir Mode et voie d'administration).

Interactions avec d'autres médicaments

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, notamment les rétinoïdes par voie générale, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

L'utilisation de ce médicament est contre-indiquée pendant les deuxième et troisième trimestres de votre grossesse.

Allaitement

En cas de traitement par ce médicament, l'allaitement est contre-indiqué.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

COMMENT PRENDRE DOXYCYCLINE, comprimé pelliculé ?

Posologie

DANS TOUS LES CAS, SE CONFORMER STRICTEMENT A L'ORDONNANCE DE VOTRE MEDECIN.

La posologie usuelle est de :

- Adulte : 100 à 300 mg par jour,
- Enfant : 4 mg/kg/jour.

En prévention du paludisme :

Le traitement sera débuté la veille du départ, il sera poursuivi pendant toute la durée du risque d'impaludation et pendant les 4 semaines suivant le retour de la zone d'endémie.

- Adulte : 100 mg par jour.
- Enfant de plus de 8 ans : Poids > 40 kg : 100 mg par jour en une prise.

Mode d'administration

VOIE ORALE

Prendre les comprimés :

- soit avalés tels quels avec une quantité suffisante d'eau ;
- soit délayés dans un demi-verre d'eau. Dans ce cas, et afin d'avalier tout ce médicament, il est recommandé de bien agiter après dispersion des comprimés dans l'eau. La couleur jaune est normale.

Durée de traitement

Pour être efficace, cet antibiotique doit être utilisé régulièrement aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

- En cas d'administration chez l'enfant de moins de 8 ans, coloration anormale et permanente des dents et développement insuffisant de l'émail dentaire.
- Possibilités de troubles digestifs : ulcérations de l'œsophage, nausées, douleurs de l'estomac, diarrhée, perte d'appétit, inflammation de la langue, inflammation de l'intestin, candidoses anogénitales (infections dues à un champignon microscopique).
- Réactions allergiques : urticaire, éruptions, démangeaisons, œdème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou), réaction allergique généralisée grave, trouble cardiaque, aggravation d'un lupus érythémateux pré-existant.
- Photosensibilisation (réaction cutanée lors d'une exposition au soleil ou aux U.V.), très rares cas d'érythrodermie (maladie sévère de la peau).
- Possibilité de modifications du bilan sanguin (anémie, baisse des plaquettes ou des globules blancs).

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Ne pas utiliser après la date de péremption.

Médicaments à conserver à une température ne dépassant pas 25° C.

LABORATOIRE BAILLY – CREAT
BP 50017 - 28500 Vernouillet (France)