

Réserve à l'usage médical IMOX Amoxicilline Gélules/Sirop COMPOSITION IMOX-250 GÉLULES Chaque gélule contient: Amoxicilline trihydrate (Pharm. Brit.) équivalent à 250 mg d'amoxicilline IMOX-500 GÉLULES Chaque gélule contient: Amoxicilline trihydrate (Pharm. Brit.) équivalent à 500 mg d'amoxicilline IMOX SUSP. BUV. Chaque 5 ml contient après reconstitution de l'amoxicilline trihydrate USP équivalent à 125 mg d'amoxicilline IMOX-250 SUSP. BUV. Chaque 5 ml contient après reconstitution de l'amoxicilline trihydrate USP équivalent à 250 mg d'amoxicilline Désignation: Amoxicilline est une pénicilline semi-synthétique dérivée du noyau de pénicilline 6-APA (6 amino pénicillanique acide). MODE DE ACTION: L'amoxicilline exerce une action bactéricide en agissant sur la synthèse de la paroi cellulaire de la bactérie.	des tissus mous, ostéomyélite, abcès dentaire (comme un auxiliaire en post chirurgie. PROPHYLAXIE DE l'ENDOCARDITE: L'amoxicilline peut être utilisée pour prévenir les bactériemies associées aux procédures tel que l'extraction dentaire chez les malades susceptibles de développer une endocardite bactérienne. POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION: Traitement de l'infection <i>Adulte:</i> La posologie usuelle est de 250 mg trois fois par jour, et peut être augmentée à 500 mg trois fois par jour pour les infections sévères <i>Doses élevées:</i> (la posologie maximum conseillée par voie orale est de 6 grammes quotidiennement en prises fractionnées) Une prise de 3 grammes, deux fois par jour est conseillée dans les cas appropriés pour le traitement de l'infection sévère ou pour l'infection purulente des voies respiratoires survenant souvent. <i>Fièvre Typhoïde:</i> 100 mg/kg/jour en trois prises en traitement d'attaque suivie de 50 mg/kg/jour pendant 5 jours. <i>Traitement à court terme:</i> Pour les infections simples et aiguës de la voie urinaire deux prises de 3 grammes séparées de 10-12 heures. Abscès dentaire deux prises de 3 grammes séparées de 8 heures. <i>Gonorrhée:</i> une prise unique de 3 grammes. <i>Enfant:</i> La posologie usuelle est de 125 mg trois fois par jour, et peut être augmentée à 250 mg trois fois par jour pour les infections graves. L'administration de l'amoxicilline poudre pour suspension buvable sur la base du poids corporel doit être administrée comme suit: Infection modérée: 20mg/kg/jour en trois prises administrées toutes les 8 heures. Infection modérée à sévère: 40mg/kg/jour en trois prises administrées toutes les 8 heures. USAGE PROPHYLACTIQUE: <i>Chirurgie dentaire:</i> 3 grammes oralement une heure avant l'intervention. La deuxième dose peut être donnée 6 heures	après, si nécessaire. Pour les enfants de moins de 10 ans, la moitié de la dose ci-dessus et pour les enfants de moins de 5 ans, un quart de la dose ci-dessus est conseillé. L'amoxicilline peut être utilisée en prophylaxie antibactérienne pendant les interventions urogénitales ou gynécologiques. EFFETS SECONDAIRES - CONTRE INDICATIONS ET PRECAUTIONS: Comme d'autres pénicillines, les effets secondaires sont rares et principalement de nature modérée et transitoire; ils comprennent diarrhée, manifestations digestives ou rarement manifestations allergiques, soit urticaire soit érythème. Une allergie de type urticaire suppose une hypersensibilité à la pénicilline et le traitement doit être interrompu. EMPLOI PENDANT LA GROSSESSE: Si un agent antimicrobien doit être utilisé pendant la grossesse, amoxicilline est conseillée pour le traitement de bactériuria asymptomatique ou cystite simple, bronchite ou pour la prophylaxie d'endocardite. LIST OF EXCIPENTS IMOX CAPSULES: Sodium lauryl sulfate BP, Stéarate de magnésium BP, Talc purifié BP. IMOX DRY SYRUP: Disodium Edétate BP, Banana sec Saver DC104 IHT, Vanilline poudre sèche USP, Colloidal Silicon dioxyde (Aerosil 200) NF, Stéarate de magnésium BP, Couleur Carmoisine HD Supra IHT, Couleur jaune orange IHT, saccharose BP, Carmellose sodium BP, Citrate de sodium BP, Anhydride Acide citrique BP, Saccharine sodique BP, Benzotate de sodium BP. CONSERVATION: Conserver en dessous de 30°C dans un endroit sec, à l'abri de la lumière TENIR TOUS LES MÉDICAMENTS HORS DE PORTEE DES ENFANTS PRESENTATION: IMOX-250 GÉLULES: Sous blister de 10, boîte de 20, 50 et 100 gélules IMOX-500 GÉLULES: Sous blister de 10, boîte de 50 et 100 gélules IMOX SUSP. BUV.: (125 mg/5ml) 60 ml et 100 ml flacons IMOX-250 SUSP. BUV.: (250 mg/5ml) 60 ml et 100 ml flacons Fabrique en Inde par / Made in India by ipca ipca Laboratories Ltd. Siege Social/Regd. Off.: 48, Kandivli Ind. Estate, Mumbai 400 067
--	---	--