

R-LUME 80/480 Comprimés

(Artéméthér 80 mg & Luméfantrine 480 mg Comprimés)

Composition

Chaque comprimé non pelliculé contient:

Artéméthér 80 mg

Luméfantrine 480 mg

Excipients Q.S.

Action Pharmacologique

La R-LUME contient un rapport fixe de 1/6 d'artéméthér et de luméfantrine, respectivement. Le site d'action antiparasitaire des deux composants est la vacuole alimentaire du parasite de la malaria, où ils sont censés interférer avec la conversion de l'hème, un intermédiaire toxique produit lors de la destruction de l'hémoglobine, en hémocoïne non toxique. La luméfantrine est censée interférer avec le processus de polymérisation, tandis que l'artéméthér génère des métabolites réactifs par l'interaction entre le pont peroxyde et le fer héminique. L'artéméthér et la luméfantrine ont une seconde action impliquant l'inhibition de la synthèse d'acide nucléique et des protéines à l'intérieur du parasite de la malaria.

Indications thérapeutiques

Traitement du paludisme à Plasmodium falciparum non compliqué chez les adultes, les enfants et les nourrissons pesant 5 kg et plus.

Contre-Indications

Chez ceux présentant une hypersensibilité aux substances actives ou à l'un des excipients. Dans les cas de paludisme grave, Durant le premier trimestre de la grossesse. Les patients ayant des antécédents familiaux d'allongement congénital de l'intervalle QT ou de mort subite ou de tout autre état clinique connu pour allonger l'intervalle QT tels que les patients ayant des antécédents de symptômes d'arythmies cardiaques, les patients présentant une bradycardie cliniquement significative ou une maladie cardiaque grave. Troubles de l'équilibre électrolytique, par exemple, hypokaliémie ou une hypomagnésémie.

Effets secondaires

Maux de tête.

Vertiges.

Perte d'appétit.

Troubles digestifs tels que des nausées, des vomissements, de la diarrhée ou des douleurs abdominales.

Fatigue.

Faiblesse ou perte de force (asthénie).

Toux.

Douleurs dans les muscles et les articulations.
fourmillements ou engourdissement des sensations

Avertissements & Précautions:

Certains antipaludéens (comme l'halofantrine, la quinine, la quinidine), y compris R-Lume comprimés ont été associés à un allongement de l'intervalle QT sur l'électrocardiogramme.

La R-Lume comprimés doit être évitée chez les patients:

Avec un allongement congénital de l'intervalle QT (Syndrome du QT long) ou toute autre condition clinique connue pour allonger l'intervalle QT tel que les patients ayant des antécédents d'arythmies cardiaques symptomatiques, une bradycardie cliniquement significative ou d'une maladie cardiaque grave.

Posologie & Mode d'administration

Comprimés pour administration orale

Pour augmenter l'absorption, la R - Lume doit être prise avec de la nourriture ou une boisson lactée. Si les patients sont incapables de tolérer la nourriture, R - Lume doit être administré, mais la concentration sanguine peut être réduite. Les patients qui vomissent dans l'heure suivant la prise du médicament doivent répéter la dose. Pour l'administration pour les petits enfants et les nourrissons, les comprimés peuvent être écrasés.

Les adultes et les enfants pesant 35 kg et plus.

Pour les patients de 12 ans et plus et de 35 kg de poids corporel et plus, un traitement complet comprend six prises de un comprimé, soit un total de 06 comprimés, administrées sur une période de 60 heures comme suit:

La première dose d'un comprimé, donnée au moment du diagnostic initial, devra être suivie par cinq autres prises d'un comprimé donné à 8, 24, 36, 48 et 60 heures.

Les enfants et les nourrissons pesant 5 kg à moins de 35 kg.

Surdosage et traitement

En cas de suspicion de surdosage, un traitement symptomatique doit être considéré comme approprié. Ainsi que la surveillance de l'ECG et du niveau du potassium sanguin.

Identification

Comprimés jaunes, biconvexe non enrobés, avec une ligne de sécatibilité sur une face.

Condition de conservation

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Présentation

Chaque plaquette contient 6 comprimés. Cette plaquette est conditionnée dans une boîte avec une notice.

Fabriqué en Inde par

Impact Health Care Pvt. Ltd.

At: 81-B, EPIP, Phase I, Jharmajri, Baddi,

Distt. Solan (H.P.)



IMPACT HEALTHCARE PVT. LTD.

Regd.: 210, Maharaja Aggarwain Shopping Complex, LSC-7, Sector-63 Rohini, Delhi-110 085 (INDIA)