## *1.3.1* La Notice

PACKAGE LEAFLET: INFORMATION FOR THE USER

BRUSTAN TABLETS

(Ibuprofen and Paracetamol Tablets)

**Read all of this leaflet carefully because it contains important information for you.**
This medicine is available without prescription. However, you still need to take BRUSTAN TABLET carefully to get the best results from it.
- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- You must contact a doctor if your symptoms worsen or do not improve after 5 days.
- Many of the side effects get serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please tell your doctor or pharmacist.

In this leaflet:
1. What BRUSTAN Tablet are and what are they used for
2. Before you take BRUSTAN Tablets
3. How to take BRUSTAN Tablets
4. Possible side effects
5. How to store BRUSTAN Tablets
6. Further information

1. WHAT BRUSTAN TABLET ARE AND WHAT ARE THEY USED FOR

BRUSTAN tablets contain Ibuprofen and paracetamol.
Ibuprofen, which belongs to a group of medicines called non-steroidal anti-inflammatory medicines and to relieve pain and reduce fever. Paracetamol can be used for the fast effective relief of fever.
BRUSTAN tablets are used for relief of mild to moderate pain associated with inflammation.

2. BEFORE YOU TAKE BRUSTAN TABLETS

Do not take BRUSTAN Tablets:
- If you has ever had an allergic reaction to Ibuprofen, paracetamol or to any other NSAID (such as aspirin) or to any of the other ingredients to this medicine (listed at the end of the leaflet) an allergic reaction may include rash, itching, swelling of face, lips, or tongue/throat or breathing difficulties.
- If you have ulcer in the stomach or gut (duodenum), or in the past have had an episode or more of ulcers coming back including that associated with previous NSAID therapy.
- If you has severe liver, kidney or heart failure.
- If you are taking other products for relief of pain, fever and inflammation (such as paracetamol, Ibuprofen or other NSAIDs).
- If you are in the last 3 months of pregnancy.

BRUSTAN tablets are not recommended for children under twelve years.
BRUSTAN tablets should not be administered to patients around the time of heart surgery (coronary artery bypass grafts).

Take special care with BRUSTAN Tablets:
- If you are suffering from heart problems, have had a previous stroke or think that you may be at risk of these conditions (for example if you have high blood pressure, diabetes or high cholesterol or are a smoker). Medicines such as Ibuprofen may be associated with a small increased risk of heart attack ("myocardial infarction") or stroke. Any risk is more likely with high doses and prolonged treatment. Do not exceed the recommended dose or duration of treatment (3 days). There is an increased risk of the elderly having side effects especially bleeding in the stomach and gut.
- If you are trying to become pregnant (Ibuprofen belongs to a group of medicines (NSAIDs), which may impair fertility in women. It will affect your chances of becoming pregnant, however, tell your doctor before taking this medicine, if you have problems becoming pregnant.
- If you have connective tissue disorders such as SLE (Systemic Lupus Erythematosus).
- If you have aseptic meningitis (fever, feeling or being sick, a stiff neck, headache, sensitivity to bright light and confusion).
- If you develop skin rashes with blisters, stop BRUSTAN tablets immediately and go to your doctor. Carry the pack along with you for reference.
- If you have asthma, history of asthma or other allergic diseases.
- If you have inflammation of bowel (Crohn's disease or Colitis).
- If you are elderly and/or have a history of GI bleeding, you may develop GI bleeding particularly in the initial stages of treatment.
- If you develop symptoms of anaemia (tiredness, easy fatigability, paleness), you should get your blood tested for haemoglobin/haematocrit.
- If you observe GI bleeding or ulceration while receiving Ibuprofen, the treatment should be stopped.
- Try to consult a doctor if your symptoms persist for more than 3 days or get worse.

Taking other medicines
Please inform your doctor or pharmacist if you are taking, or have recently taken, any other medicines, including any that were obtained without a prescription.
Care is needed if you are taking:
- ACE-inhibitors like enalapril, lisinopril etc (used to treat high blood pressure)
- Aspirin. As with other NSAIDs, concomitant administration of Ibuprofen and aspirin is not generally recommended because of the potential of increased side effects.
- Diuretics (water pills) like furosemide and tiaclidine
- Beta blockers like propanolol, atenolol etc (used to treat high blood pressure)
- Lithium (used to treat mental illness)
- Methotrexate (used to treat rheumatoid arthritis)
- Warfarin or bisindione (used to thin blood)
- Preliminary drugs like methotrexate or dexamethasone (used to treat swelling or inflammation)
- Cholestyramine (used to treat high blood cholesterol)
- Cyclosporine (drugs that suppress the immune system)
- Corticosteroids (used to treat various conditions including rheumatism, arthritis, allergic conditions, certain skin diseases, asthma or certain blood disorders)
- Antibiotics (e.g. Chloramphenicol used to treat certain bacterial and microbial infections)
- Drugs used to treat heart failure (e.g. digoxin)
- Zidovudine (anti-HIV medicine)
- Medicine used to treat flu (Pleurapkin)
- Drugs used to treat depression (such as Citalopram, escitalopram, fluoxetine, furosuramine, paroxetine and sertraline).

Taking BRUSTAN Tablets with food and drink
BRUSTAN tablets may be taken each dose after meals.
Pregnancy and breast-feeding
BRUSTAN tablets should not be taken during last 3 month of pregnancy or by breast-feeding women.
Ask the doctor or pharmacist before taking any medicine.
Driving and using machines
Ibuprofen and Paracetamol are known to cause dizziness, drowsiness, visual disturbances, and fatigue (tiredness). This may affect your ability to drive and use machines. Make sure you know how you react to BRUSTAN tablets before you drive, use machines, or engage in any other activity that could be dangerous if you are not alert.

3. HOW TO TAKE BRUSTAN TABLETS

Adults and young persons above 12 years: The minimum effective dose should be used for the shortest time necessary to relieve symptoms. One tablet up to three times a day, as required. Take only as much as you need to relieve your symptoms. Not more than 3 tablets should be taken daily, unless directed by your doctor.
Tablets are to be taken with food or after meals with sufficient water.
BRUSTAN tablets are not recommended for children under twelve years.
If your age is 65 years and above, caution should be exercised while taking BRUSTAN tablets.
BRUSTAN tablets should not be used continuously for more than 3 days without consulting a doctor. If symptoms persist or worsen consult your doctor.
If you take too many BRUSTAN tablets consult your doctor or go to the nearest hospital emergency department immediately. Take the leaflet or remaining tablets with you so the doctor will know what you have taken.
If you have any further questions on the use of this product, ask the doctor or pharmacist.

4. POSSIBLE SIDE EFFECTS

Like all medicines, BRUSTAN tablets can cause side effects, although not everybody gets them.
Very serious side effects
If any of the following happen, stop taking BRUSTAN tablets and tell your doctor immediately or go to the emergency department at your nearest hospital. You may be having a serious allergic reaction to BRUSTAN and may need urgent medical attention.
- Rashes that may be lumpy, hives, falling, tightness in the chest, difficulty breathing and shortness of breath, fever or wheezing, diffuse, lips, hands, feet, fainting
- Serious illness with blistering of the skin, mouth, eyes and genitals.
- Coma

Serious side effects
You should also stop taking BRUSTAN tablets and tell your doctor immediately if you develop any of the following:
- You may have alteration or bleeding of gastrointestinal tract, sometimes fatal, particularly in the elderly. Perforation of alimentary canal and Crohn's disease.
- You are sick (vomiting) and it contains blood or dark particles that look like coffee grounds.
- You may pass blood in the urine/faeces or pass black tarry stools.
- Swelling of the body and fluid retention (edema)
- Increased heart rate, feeling you heartbeat
- Asthma, Breathlessness
- Elevated blood pressure
- Liver problems (often seen as yellowing of your skin or the whites of your eyes).
- Inflammation of the brain lining (aseptic meningitis), which is usually characterized by the presence of symptoms such as stiff neck, headache, feeling or being sick, fever or feeling disoriented.
- Heart failure
- Erythema multiforme (mildly itchy, patterned blotches, starting in the lines)
- Severe reduction in the number of white blood cells which makes infections more likely (agranulocytosis)
- Haemolytic anaemia (severe reduction in blood cells which can cause weakness, bruising or make infections more likely).
- Haemolytic anaemia, thrombocytopenia, purpura (reduction in red blood cells which can make the skin pale or yellow and can cause weakness or breathlessness, or increase the risk of bleeding or bruising).
- A blood disorder in which an abnormal amount of haemoglobin builds up in the blood (Methemoglobinemia) (which is usually characterized by the presence of symptoms such as bluish coloring of the skin, headache, fatigue, shortness of breath, lack of energy)
- Decreased white blood cells
- Kidney failure (nephritis and often temporary loss of kidney function)
- Interstitial nephritis (inflammation of the kidneys which can cause renal failure or high blood pressure)
- Nephrotic syndrome (A non-specific disorder in which the kidneys are damaged, causing them to lose large amounts of protein. Puffiness around the eyes, characteristically in the morning and pitting edema over the legs are blood common presentation)
- Renal papillary necrosis (which is usually characterized by the presence of symptoms such as back pain or flank pain, bloody urine, cloudy urine, dark, nauseous, or brown urine)
- Red colored urine (hematuria)
- Bleeding per nose
- Stroke

Other side effects:
You may experience some of the following side effects. Speak to your doctor or pharmacist if you are concerned about any of these side effects:
- Heartburn, abdominal pain, bloating, constipation, loose stools (diarrhoea), passing wind, feeling sick (nausea), being sick (vomiting), indigestion, mouth ulceration
- Headache, dizziness, sensation of rotation (vertigo), ringing in the ears (tinnitus)
- Blurred vision, reduced vision, changes in color vision, double vision, dry or red eyes, nystagmus (moving of the eyes which progresses slowly to cause vision loss)
- Nervousness
- Wheezing

There may be changes in the results of certain laboratory tests:
- Decrease in blood cell counts

If any of the side effects gets serious, or if you notice any side effects not listed in this leaflet, please inform the doctor or pharmacist.

5. HOW TO STORE BRUSTAN TABLETS

Keep out of the reach of children.
Do not take after the expiry date shown on the packing.
Store below 25°C, protected from moisture.

6. FURTHER INFORMATION

What BRUSTAN TABLETS contains
The active substance is Ibuprofen and paracetamol.
Each tablet also contains following inactive ingredients: Calcium Hydrogen Phosphate, Maize Starch, Povidone, Purified Talc, Opadry BG32180 Orange, Purified Water.
What BRUSTAN TABLETS looks like and contents of the pack
Orange coloured, oval, film coated tablets imprinted with "BRUSTAN" on one side in black ink.
BRUSTAN TABLETS are available in Clear PVC Blister pack of 10's & 20's, 10x10's, 2x10's & Bottle of 500's.
Marketing authorisation holder and manufacturer
Marketing authorisation holder
Sun Pharmaceutical Industries Limited
Sa-1 & Sa-2, Sector-1, Industrial Area-3, Pithampur (Dhar) India

This leaflet was last revised in December 2010

NOTICE POUR LE PATIENT : INFORMATIONS POUR L'UTILISATEUR

COMPRIMÉS BRUSTAN

(Comprimés d'Ibuprofène et de paracétamol)

**Prière de lire attentivement le contenu de cette notice avant de commencer à prendre ce médicament car elle contient des renseignements importants pour votre santé.**
Ce médicament est disponible sans ordonnance. Cependant, vous devez prendre le COMPRIMÉ BRUSTAN avec prudence afin d'en obtenir de bons résultats.
- Prière de garder cette notice. Vous devez la relire à nouveau.
- Si vous avez besoin d'informations ou de conseils supplémentaires adressez-vous au pharmacien.
- Si les symptômes vous inquiètent ou si vous remarquez des modifications inhabituelles.
- Si vous avez des effets secondaires sérieux, ou si vous remarquez des effets secondaires non mentionnés dans cette notice, alors prévenez votre médecin ou votre pharmacien.

Contenu de cette notice :
1. Définition du médicament BRUSTAN et à quoi sert-il ?
2. Avant de prendre des comprimés BRUSTAN
3. Comment prendre des comprimés BRUSTAN
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver les comprimés BRUSTAN
6. Informations supplémentaires

1.- DÉFINITION DU COMPRIMÉ BRUSTAN ET DE SON UTILISATION

Les comprimés BRUSTAN renferment de l'Ibuprofène et du paracétamol.
L'Ibuprofène, lequel appartient à un groupe de médicaments appelés médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens, agit en soulageant la douleur et en réduisant la fièvre. Le paracétamol peut être utilisé pour un soulagement rapide et efficace de la fièvre.
Les comprimés BRUSTAN sont utilisés pour un soulagement de la douleur liée à une inflammation associée à l'inflammation.

2.- AVANT LA PRISE DES COMPRIMÉS BRUSTAN

Ne pas prendre les comprimés BRUSTAN :
- Si vous avez souffert auparavant d'une réaction allergique à l'Ibuprofène, au paracétamol ou à tout autre AINS (anti-inflammatoires) ou à tout autre ingrédient contenu dans ce médicament et énumérés à la fin de cette notice (une réaction allergique peut inclure une éruption, une démangaison, un gonflement au niveau du visage, de la langue ou de la bouche ou des difficultés respiratoires).
- Si vous souffrez d'un ulcère de l'estomac ou des intestins (duodénum) ou si vous avez souffert auparavant d'un ulcère ou de plusieurs épisodes d'ulcères qui sont tout aussi importants et indiquent une nouvelle ou une récidive de ulcère AINS.
- Si vous avez souffert d'insuffisance hépatique, rénale ou cardiaque grave.
- Si vous prenez d'autres médicaments pour un soulagement de la douleur, de la fièvre et de l'inflammation (comme le paracétamol, l'Ibuprofène ou d'autres AINS).
- Si vous avez entamé les 3 derniers mois de votre grossesse.

Les comprimés BRUSTAN ne sont pas recommandés pour les enfants âgés de moins de 12 ans.
Il ne faudra pas administrer les comprimés BRUSTAN aux patients dans une période autour de votre chirurgie cardiaque (pontage artériel coronaire).

Prendre des précautions particulières avec les comprimés BRUSTAN :
- Vous souffrez de troubles cardiaques, si vous avez souffert auparavant d'une attaque ou vous pensez vous exposer à un risque de cela (comme par ex. si vous souffrez d'hypertension, de diabète ou de cholestérol élevé ou si vous êtes fumeur/fumeuse). Les médicaments comme l'Ibuprofène peuvent être associés à un risque légèrement plus élevé de crise cardiaque (infarctus du myocarde) ou d'attaque. Ces chiffres dépendent de la dose recommandée et de la durée du traitement (3 jours). Les personnes âgées courent un risque plus important de développement d'effets combinés et plus particulièrement du saignement au niveau de l'estomac et des intestins.
- Vous souffrez de troubles sérieux d'hypertension appartenant au groupe de médicaments (nitrés) pouvant induire à la fièvre (voir ci-dessus). Ce genre affections non classiques de cardiac encadrés. Si vous avez des difficultés à contrôler votre tension prière d'en discuter avec votre médecin avant de prise de ce médicament.
- Vous souffrez de troubles des tissus conjonctifs comme le lupus érythémateux systémique.
- Vous souffrez d'une méningite aseptique (fièvre, sensation de raideur au cou, maux de tête, une tête qui tourne, nausée ou vomissements, une sensibilité aux lumières vives et de la confusion).
- Vous développez des éruptions cutanées accompagnées d'ampoules et une similar immédiatement après la prise des comprimés BRUSTAN et vous en informe immédiatement le médecin traitant. Toutes emporter avec vous cette notice pour référence.
- Vous souffrez d'asthme, d'un antécédent d'asthme ou de toute autre maladie allergique.
- Vous souffrez d'une inflammation de l'intestin grêle et des intestins.
- Vous être d'un âge avancé et vous prétendez un antécédent de trouble gastro-intestinal ou vous risquez de développer un saignement gastro-intestinal plus particulièrement aux stades initiaux du traitement.
- Vous développez des symptômes d'anémie (fatigue, fatigabilité plus facile, pâleur) alors il sont nécessaire de faire des analyses de sang pour contrôler les taux d'hémoglobine et d'hématocrite.
- Vous observez un saignement gastro-intestinal ou une ulcération durant l'administration de l'Ibuprofène ; il faudra hâtemment arrêter le traitement.
- Il faudra essayer de consulter un médecin si vous rencontrez des problèmes pour plus de 3 jours ou s'il y a une aggravation de ces symptômes.

Prise d'autres médicaments
Prière d'informer votre médecin ou votre médecin si vous prenez ou si vous avez pris récemment tout autre médicament autant tout médicament pouvant être obtenu sans ordonnance.
Des précautions doivent être prises si vous prenez :
- Des inhibiteurs ACE comme l'enalapril, le lisinopril, etc (utilisés pour traiter la pression artérielle élevée).
- Aspirine. Comme avec les autres AINS, une administration concomitante de l'Ibuprofène et de l'aspirine n'est généralement pas recommandée suite à un potentiel plus important d'effets secondaires.
- Diurétiques (pilules d'eau) comme le furosémide et la tiaclidine et les Bêtaline.
- Bêta-bloquants comme le propanolol, l'atenolol, etc (utilisés pour traiter la pression artérielle élevée).
- Lithium (utilisé pour traiter la maladie mentale).
- Méthotrexate (utilisé pour le traitement de la fièvre de Rumatoïde).
- Warfarine ou bisindione (utilisé pour une dilution du sang).
- Médicaments préliminaires comme la méthotrexate ou la dexaméthasone (utilisés pour traiter les renversements ou l'inflammation).
- Cholestyramine (utilisés pour traiter le cholestérol élevé dans le sang).
- Cyclosporine (médicaments utilisés pour une suppression du système immunitaire).
- Corticostéroïdes (utilisés pour le traitement de conditions diverses et incluant le rhumatisme, l'arthrite, des conditions allergiques, certaines maladies cutanées, l'asthme ou certaines troubles sanguins).
- Antibiotiques (par ex. : chloramphénicol utilisé pour traiter certaines infections bactériennes et microbiennes).
- Médicaments utilisés pour le traitement d'une insuffisance cardiaque (par ex. digoxine).
- Zidovudine (médicament contre le VIH).
- Médicaments utilisés pour le traitement des allergies (pleurapkin).
- Médicaments utilisés pour le traitement de la dépression (par ex. le citalopram, fluoxétine, fluvoxamine, sertraline, paroxetine et escitalopram).

Prise des comprimés BRUSTAN avec des aliments et des boissons
Les comprimés BRUSTAN peuvent être pris avec des aliments ou après des repas.
Grossesse et allaitement
Il ne faudra pas prendre les comprimés BRUSTAN durant les trois (3) derniers mois de la grossesse ou par les femmes allaitant leurs enfants.
Prière d'en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien avant toute prise de tout médicament.
Conduite et manœuvre des machines
L'Ibuprofène et le paracétamol sont connus pour causer des vertiges, de la somnolence, des troubles de la vision et de la fatigue. Cela pourrait affecter votre capacité non de la conduite ou de la manœuvre de machines. Vous assurer que vous reconnaissez bien vos réactions face à la prise des comprimés BRUSTAN avant de conduire, manœuvrer des machines ou entreprendre toute autre activité pouvant être dangereuse si vous n'êtes pas vigilant(e).

3.- COMMENT PRENDRE LES COMPRIMÉS BRUSTAN

Adultes et adolescents âgés de plus de 12 ans : La dose efficace minimale dans la durée utilisée pour le durée la plus courte pour un soulagement des symptômes. Prendre un comprimé jusqu'à trois fois par jour au besoin. Prendre uniquement le nombre de comprimés requis pour soulager vos symptômes. Ne pas prendre plus de 3 comprimés par jour sauf si vous avez reçu des instructions de votre médecin.
Il faudra prendre les comprimés avec des aliments ou après des repas avec suffisamment d'eau.
Les comprimés BRUSTAN ne sont pas recommandés pour les enfants âgés de moins de 12 ans.
Il faudra suivre de la deuxième ou de la prise des comprimés BRUSTAN à moins de 15 ans et plus.
Il ne faudra pas utiliser continuellement les comprimés BRUSTAN pour plus de 3 jours sans avoir consulté un médecin.
Prière de consulter votre médecin si il y a une aggravation des symptômes ou ils persistent.
Prière de consulter votre médecin ou votre pharmacien immédiatement au sortie du suspension de l'hôpital le plus proche de votre ville si vous avez pris un nombre plus important de comprimés BRUSTAN.
Prière d'emporter avec vous cette notice ou le restant des comprimés afin que le médecin sache ce que vous avez pris.
Si vous avez des questions supplémentaires à poser concernant l'utilisation de ce médicament alors prière de contacter un médecin ou un pharmacien.

4.- EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES

Les comprimés BRUSTAN, comme tous les autres médicaments, peuvent causer des effets secondaires bien que ces effets ne soient pas ressentis par tout le monde.
Effets secondaires très graves
Prière d'interrompre la prise des comprimés BRUSTAN et en discuter immédiatement avec votre médecin ou vous rendre directement au service des urgences de l'hôpital le plus proche de votre ville si vous notez tout effet secondaire suivant. Vous risquez d'être une réaction allergique grave au BRUSTAN et vous pouvez nécessiter une attention médicale urgente.
- Éruptions cutanées à apparition sous forme de bosses, d'urticaire, de démangeaisons, oppression de la poitrine, de difficultés respiratoires et du manque de souffle, de fièvre ou de gonflement au niveau du visage, des lèvres, des langues, des muqueuses jaunes, des boutonnements.
- Maladie grave avec formation d'ampoules au niveau de la peau, de la bouche, des yeux et des parties génitales.
- Coma

Effets secondaires graves
Prière d'interrompre la prise des comprimés BRUSTAN et en discuter immédiatement avec votre médecin ou vous développez tout effet secondaire suivant.
- Vous souffrez d'ulcération ou de saignement au l'appareil gastro-intestinal pouvant parfois être mortel et affectant plus particulièrement les personnes âgées. Ulcération de cette dernière et maladie de Crohn.
- Vous être malade avec des vomissements avec présence de sang ou de sang au sein des particules ressemblant aux marcs de café.
- Vous prenez du sang dans vos selles ou vous passez des selles noires ressemblant au goudron noir.
- Des flèches du tissu au sein et dans les de fluide (oedème).
- Rythme cardiaque et tissus, sensation que vous prenez conscience de battements de votre cœur.
- Asthme, manque de souffle.
- Pression artérielle élevée.
- Troubles hépatiques (se présentant souvent sous forme de jaunissement de la peau ou des yeux des yeux).
- Inflammation des membranes qui entoure le cerveau (méningite aseptique) (aspects de vomissiter généralement par la présence de symptômes comme une tête et au niveau du cou, et mal au dos, un sentiment de malaise, de la fièvre et une sensibilité du lumière vive).
- Éléments rouges.
- Erythème polymorphe (démangeaisons, boutons, taches rouges sous forme de bosses au niveau des mains).
- Hémolytic anémie de cellules sanguines (réduction du nombre de cellules sanguines rouges qui peut causer une faiblesse, une sensation de manque d'air ou une infection plus probable (fièvre ou frissons).
- Anémie hémolytique, thrombocytopénie, purpura (réduction des cellules rouges pouvant causer une affection de la peau ou et particulièrement de la peau et pouvant entraîner une faiblesse ou et rendre du souffle ou augmenter le risque de saignement ou d'hématomes).
- Trouble du sang durant lequel il y a une accumulation anormale de hémoglobine (Methemoglobinemia) (qui est généralement caractérisé par la présence de symptômes comme la peau, le mal de tête, la fatigue, le manque de souffle et le manque d'énergie).
- Diminution du nombre des cellules sanguines blanches.
- Insuffisance rénale (inflammation des reins pouvant causer une perte de fonctionnement des reins).
- Nephrite interstitielle (inflammation des reins pouvant causer un gonflement des cellules au sein des reins).
- Syndrome néphrotique (un trouble non spécifique endommageant les reins et causant les fuites de quantités importantes de protéine. Une bouffissure autour des yeux plus particulièrement le matin et un œdème présent le jour représentent les symptômes les plus fréquents).
- Nécrose papillaire rénale (lorsque la nécrose du glomérulonephrite est le résultat de la présence de symptômes comme le mal au dos et au niveau du côté, le blanchissement du sang dans les urines, une urine trouble, foncée, de couleur rouille ou de couleur brunâtre).
- Urine de couleur rouge (hématurie).
- Saignement nasal.
- Attaque.

Autres effets secondaires
Vous risquez de rencontrer certaines des effets secondaires suivants. Prière d'en discuter avec votre médecin ou votre pharmacien si vous êtes concerné(e) par tout effet secondaire mentionné :
- Brûlure d'estomac, douleur abdominale, gonflement, constipation, selles liquides (diarrhée), flatulence, se sentir mal (nausées), être malade (vomissements), indigestion et ulcération de la bouche.
- Mal de tête, étourdissements, sensation de rotation (vertiges), bourdonnement des oreilles (acouphènes).
- Vision floue, vision réduite, changements au niveau de la vision des couleurs, vision double, yeux secs ou yeux rouges, mouvement involontaire de la tête pouvant lentement progresser et causer une perte de la vision.
- Nervosité.
- Difficultés à respirer.

Il pourra y avoir des changements au niveau des résultats de certains tests laboratoire :
- Baisse du nombre de cellules sanguines.

Si vous avez remarqué des effets secondaires sérieux, ou si vous notez tout effet secondaire non décrit dans cette notice alors prière d'en informer le médecin ou le pharmacien.

5.- COMMENT CONSERVER LES COMPRIMÉS BRUSTAN

Prière de garder tout médicament hors de la portée des enfants.
Ne pas prendre les comprimés après la date d'expiration apparaissant sur l'étiquette.
A conserver à moins de 25°C, à l'abri de l'humidité.

6.- INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Que contiennent les comprimés BRUSTAN ?
Les substances actives sont l'Ibuprofène et le paracétamol.
Chaque comprimé contient également les ingrédients inactifs suivants : phosphate d'hydrogène de calcium, amidon de maïs, povidone, talc purifié, opady BG32180 orange, eau purifiée.
Présentation des comprimés BRUSTAN et du contenu de la boîte
Comprimés pelliculés de forme ovale et de couleur orange portant l'inscription "BRUSTAN" imprimée à l'encre noire comme sur un côté du comprimé.
Les comprimés BRUSTAN sont disponibles en boîte de 10 comprimés de 10 x 10 comprimés, de 20 x 10 comprimés, sous blister plastique transparent et en flacon de 500 comprimés.
Titulaire d'autorisation de mise en marché et fabricant
Titulaire d'autorisation de mise en marché
Sun Pharmaceutical Industries Limited
Sa-1 & Sa-2, Sector-1, Industrial Area-3, Pithampur (Dhar) India
Notice mise à jour en décembre 2010

5195197 - LIT BRUSTAN TABLETS, MARKET : FWA, SIZE : 125x400mm (SINGLE FOLD), SPIL-DWS : 16/01/19WSV6/V1, REF CODE : 5141295, ITF CODE : 05195197