

AZITRINE® 500, comprimé pellicule :
 Attens idéalement, le paracétolue uouez s'achez :
 • pour le traitement de certaines angines et des infections bucco-dentaires : 1 comprimé une seule prise par jour pendant 3 jours ;
 • pour le traitement des bronchites : 1 comprimé une seule prise par jour, puis 1 comprimé d'AZITRINE® 250 pour les 4 jours suivants.
 • pour le traitement des arérites et cervicales : 2 comprimés une prise.
 Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.
 Si vous avez l'impression que l'effet de AZITRINE®, comprimé pellicule est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration
 Les comprimés peuvent être pris pendant ou en dehors des repas, une seule prise par jour.

Durée du traitement
 La durée du traitement est de :
 • 3 jours pour le traitement de certaines angines et des infections bucco-dentaires
 • 5 jours pour le traitement des bronchites.
 Ne pas interrompre le traitement avant d'avoir utilisé régulièrement au doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.
 La disparition de la fièvre, du tou ou autre symptôme, ne signifie pas que vous êtes complètement guéri.
 L'absence d'impression de mieux-être, n'est pas due au traitement antibiotique mais à l'infection elle-même. Le fait de réduire ou de suspendre votre traitement sans vous soumettre à cette impression et retarderait votre guérison.
 Si vous avez plus de AZITRINE®, comprimé pellicule que vous n'auriez dû prendre, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
 Si vous oubliez de prendre AZITRINE®, comprimé pellicule
 Ne prenez pas de doses doubles pour compenser la dose que vous avez oubliée.
 Si vous avez arrêté de prendre AZITRINE®, comprimé pellicule
 Sans raison.
 Si vous avez eu d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou au service d'information des médicaments.

AZITRINE® 500, comprimé pelliculé
 Altair (azithromide) comprimé effervescent, cristallin soluble
 - pour le traitement de certaines angines et des infections bucco-dentaires : 1 comprimé en une seule prise par jour pendant 3 jours ;
 - pour le traitement des otites moyennes : 1 comprimé en une seule prise 1 jour, puis 1 comprimé de AZITRINE® 250 par jour les 4 jours suivants ;
 - pour le traitement des bronchites et des virus : 2 comprimés en une prise.
 Se conformer strictement à l'ordonnance de votre médecin.
 Si vous avez l'impression que l'effet de AZITRINE®, comprimé pelliculé est trop fort ou trop faible, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Mode d'administration
 Prendre les comprimés AZITRINE®, comprimé pelliculé en une seule prise pendant ou en dehors des repas, en une seule prise par jour.
Durée du traitement
 La durée du traitement est de 3 à 5 jours pour le traitement de certaines angines et des infections bucco-dentaires.

[illegible]

Cumpra rigorosamente com a prescrição do seu médico.

Se tiver a impressão de que o efeito de AZITRINE[®], comprimido revestido é demasiado forte ou fraco, fale com o seu médico ou farmacêutico.

Modo de administração

Os comprimidos podem ser administrados com ou sem alimentos, uma vez ao dia.

Duração do tratamento

A duração do tratamento é de:

- 3 dias para o tratamento de certas amigdalites e infeções ares;
- 5 dias para o tratamento de bronquites;
- 3 dias para a infeção da garganta.

Se o seu médico prescrever AZITRINE[®], comprimido revestido, não se deve utilizar regularmente nas doses prescritas e apenas sob a orientação do seu médico.

O desenvolvimento de febre, ou uma piora dos sintomas, não significa que você esteja desenvolvendo uma complicação.

A possível sensação de fadiga não se deve ao tratamento com antibióticos, mas à própria infeção. Reduzir ou suspender o tratamento não irá cessar a sensação e agravar a sua recuperação.

Como tomar AZITRINE[®], comprimido revestido, caso deva tomar

Consulte imediatamente o seu médico ou farmacêutico.

Caso se tenha esquecido de tomar AZITRINE[®], comprimido revestido:

Não tome uma dose a dobrar para compensar uma dose que se esqueceu de tomar.

Se parou de tomar AZITRINE[®], comprimido revestido, não se aplicará.

Caso ainda tenha dúvidas sobre a utilização deste medicamento ou se deseja parar o tratamento, fale com o seu médico ou farmacêutico.

[illegible][illegible]

Conservar a temperatura inferior a 30°C, ao abrigo da luz e da humidade.
Manter fora da vista e do alcance das crianças.
Não utilizar após a data de validade indicada na embalagem.
Não deite fora quaisquer medicamentos na canalização ou no lixo doméstico. Pergunte ao seu farmacêutico como deitar fora os medicamentos que já não utiliza. Estas medidas ajudarão a proteger o ambiente.

Qual a composição de AZITRINE[®], comprimido revestido

AZITRINE[®] comprimido revestido

Cada comprimido revestido contém:

Azitromicina didratada 250 mg
equivalente a azitromicina anidra

Excipientes q.s.

Excipientes com efeito conhecido: Benzoato de sódio,

Outros excipientes: celulose microcristalina, amido de milho amido glicolato de sódio, talco purificado, estearato de magnésio, álcool isopropílico, diclorometano, corante WT-1001 branco,

Cada comprimido revestido contém:
Azitromicina dihidratada 500 mg
equivalente a azitromicina anidra q.s.
Excipientes com efeito conhecido: Benzoato de sódio.
Outros excipientes: c.c. Jose microcristalina, amido de milho amido glicolato de sódio, talco purificado, estearato de magnésio, álcool isopropílico, diclorometano, cor whiteat W-1001 branco.

AZITRINE® 500 mg, comprimido revestido
Este medicamento apresenta-se sob a forma de comprimidos revestidos por película. Embalagem de 3 comprimidos.

Se tem alguma dúvida sobre este medicamento ou se gostaria de notificar uma reação adversa contacte-nos através da linha de Informação ao Paciente: + 225 27 21 25 52 38

Fabricado por: **BLISS GVS PHARMALTD.**
Dewan Uday Nagar, Alvala, Palghar, Maharashtra-401 404, INDIA.
