

DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE GEL
Tube de 25g

7,1% de Digluconate de chlorhexidine équivalent à 4% de chlorhexidine

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

COMPOSITION

Digluconate de chlorhexidine7,1mg
Pour 100 mg de gel.

Les autres composants sont :

Gomme de guar, eau purifiée.

QU'EST-CE QUE DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE GEL, Tube de 25g ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmacothérapeutique

Classe pharmacothérapeutique : Anti-infectieux et antiseptique pour un traitement local.

DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE GEL, Tube de 25g est un antiseptique qui réduit temporairement le nombre de germes au niveau du cordon ombilical des nouveau-nés.

Indications thérapeutiques

Antisepsie des plaies superficielles et de faible étendue DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE GEL, Tube de 25g est utilisé pour les soins ombilicaux du nouveau-né. Il empêche les infections du cordon ombilical et réduit de ce fait la mortalité néonatale. La chlorhexidine est une bisbiguanide désinfectant et antiseptique qui est bactéricide et bactériostatique contre une large gamme de bactéries Gram-positives et Gram-négatives. Elle est plus efficace contre les bactéries Gram-positif que Gram-négatif et certaines espèces de Pseudomonas.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE GEL, Tube de 25g ?

Contre-indications

N'utilisez jamais DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE GEL, Tube de 25g dans les cas suivants :

- Hypersensibilité à la chlorhexidine ou à l'un des composants ;
- Ne pas appliquer dans les yeux, les oreilles ou sur les muqueuses ;
- Ce produit ne doit pas pénétrer dans le conduit auditif en particulier en cas de perforation tympanique ni, d'une façon générale, être mis au contact du tissu nerveux ou des méninges.
- Ce produit ne peut pas être utilisée pour la désinfection du matériel microchirurgical ni pour l'antisepsie de la peau saine avant acte chirurgical (antisepsie du champ opératoire et antisepsie des zones de ponction, d'injection ou de transfusions).

Mises en garde spéciales ; Précautions d'emploi

Faites attention avec DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE GEL, Tube de 25g :

Mises en garde spéciales

- Usage externe exclusivement.
- Risque de sensibilisation à la chlorhexidine.
- Bien que la résorption transcutanée de la chlorhexidine soit très faible, le risque de passage systémique ne peut être exclu. Ces effets systémiques pourraient être favorisés par la répétition des applications, par l'utilisation sur une grande surface cutanée, sous pansement occlusif, sur une peau lésée (notamment brûlée), une muqueuse, une

peau de prématuré ou de nourrisson (en raison du rapport surface/poids et de l'effet d'occlusion des couches au niveau du siège).

- Dès l'ouverture du conditionnement d'une préparation à visée antiseptique, une contamination microbienne est possible.

Précautions particulières d'emploi

Tout antiseptique est à utiliser avec précautions dans les conditions où un effet systémique peut être redouté, notamment chez le nourrisson, en cas de peau lésée, ou sur une grande surface (cf. Mises en garde).

Interactions avec d'autres médicaments

Prise ou utilisation d'autres médicaments

Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation), l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques est à éviter sauf avec les autres composants cationiques.

Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

Grossesse et allaitement

Sans objet.

3. COMMENT UTILISER DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE GEL, Tube de 25g ?

Posologie et Mode et/ou voie(s) d'administration, Posologie

Appliquer le gel généreusement à la souche et les zones environnantes du cordon ombilical une fois par jour.

Mode d'administration

Le gel est prêt à l'emploi. Application topique

Instructions en cas de surdosage

En cas d'ingestion orale massive, procéder à un lavage gastrique. La toxicité aiguë per os de la chlorhexidine est faible (absorption digestive presque négligeable).

Contactez un centre antipoison.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE GEL, Tube de 25g est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

- Risque d'allergie locale, se manifestant généralement par un eczéma de contact ;
- Risque d'allergie générale pouvant aller (rarement) jusqu'au choc anaphylactique, notamment en cas d'utilisation sur : la peau lésée, les muqueuses, les ulcérations des membres inférieurs, avec possibilité d'aggravation d'une lésion sur infectée lors d'utilisation prolongée.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE GEL, Tube de 25g ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Date de péremption

Ne pas utiliser DIGLUCONATE DE CHLORHEXIDINE GEL, Tube de 25g après la date de péremption mentionnée sur la boîte et le tube.

Conditions de conservation

Stockez en-dessous de 30°C. Protéger de la lumière.

FABRICANT ET TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

Drugfield Pharmaceuticals Limited

Avenue Lynson chimique, Km 38 Lagos-Abeokuta Expressway, Sango-Otta,

L'Etat d'Ogun, au Nigeria.

Tel : +234 08029055002

E-mail : info@drugfieldpharma.com