

LuexTM

BABY COUGH SYRUP

Please read this leaflet carefully before you administer this medicine to your child as it contains important information. If you have any questions or are not sure if this product is suitable, ask your pharmacist. Keep this leaflet as you may need it again.

What is in LUEX Baby cough syrup?

Each 5ml contains glycerol 0.75ml as the active ingredient.
Other inactive ingredients (excipients) are sorbitol, propylene glycol, sucralose, sodium methyl paraben, sodium propyl paraben, sodium CMC, liquid glucose, erythrosine colour, raspberry flavor, citric acid monohydrate, purified water.

Mechanism of action

Glycerol has demulcent properties and may possibly block sensory cough receptors in the respiratory tract.

What is LUEX Baby cough syrup used for?

LUEX Baby cough syrup is specially formulated for babies and young children and provides symptomatic relief from dry, tickly cough and sore throat.

Special precautions and warnings

This medicine should not be administered to children under 4 months old.
If your child has any of the following symptoms you should consult your doctor so that the cough can be investigated further: coughing up phlegm that is green, rusty brown, yellow, blood-stained or foul smelling; asthma; shortness of breath; wheezing or difficulty breathing; sudden weight loss; recurrent night-time cough; or a long-term persistent cough.

Contraindications

This medicine should not be given to your child if they are hypersensitive to any of the ingredients.

Interactions with other medicines

There are no known interactions between LUEX Baby cough syrup and other medicines.

How to administer BABY COUGH syrup

Oral administration only	
4 months to 1 year:	5ml to be given three to four times a day
1 – 5 years:	10ml to be given three to four times a day

Cautions

Do not give more frequently than every 6 hours.

Do not administer with any other cough and cold remedies.

If symptoms persist for longer than three days, consult your doctor.

WARNING: DO NOT EXCEED THE STATED DOSE

If you forget to give a dose, administer it as soon as you remember unless it is time for the next dose. Do not give two doses at the same time.

Possible side effects

Like all medicines, LUEX Baby cough syrup can cause side effects, although not everybody gets them. LUEX Baby cough syrup may cause diarrhoea in overdose. If your child experiences any side effects, please tell your doctor or pharmacist.

In case of overdose

The main symptom overdose is diarrhoea. If your child accidentally takes too much medicine, go to your nearest hospital casualty department immediately or contact your doctor or pharmacist.

Storing LUEX Baby cough syrup

Store in cool, dry and dark place below 25°C

Do not use after the expiry date shown on the pack.

Keep out of reach and sight of children.

This leaflet was last revised in April 2017



Manufactured for:
LONDON UNITED EXPORTS LTD.
By:
CIRON DRUGS & PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
TANAPUR, BOLNISI-401506.
www.luxhealthcare.com



LuexTM

SIROP PEDIATRIQUE TOUX SECHE

Lire attentivement cette notice avant d'administrer ce médicament à votre enfant puisqu'elle contient l'information importante. Au cas où vous auriez des questions ou que vous n'êtes pas sûr si ce produit est convenable, consultez votre pharmacien. Conserver cette notice; vous pourriez souhaiiter la relire

Quelle est la composition de LUEX SIROP POUR BEBÉS?

Chaque 5ml contient glycerol 0.75ml comme ingrédient actif.
Les autres ingrédients inactifs sont Sorbitol, propylène glycol, sucralose, parahydroxybenzoate de méthyle sodique, parahydroxybenzoate de propyle sodique, carboxyméthylcellulose de sodium, glucose liquid, l'erythrosine, arôme framboise, acide citrique, l'eau purifiée.

Quand peut-on prendre LUEX SIROP POUR BEBÉS?

La sirop est spécialement formulé pour procurer un soulagement des symptômes de la toux sèche et maux de gorge

Précautions avant d'administrer LUEX sirop pour bébés

La sirop ne doit pas administrer à l'enfants dessous de 4 mois.

Si votre enfant présente un des symptômes suivants vous devez consulter votre médecin pour plus d'analyse de la toux:

L'asthme, la respiration courte, la respiration sifflante ou difficile, soudaine perte de poids, une toux continue durant la nuit, ou une toux persistante pendant une long durée.

Contre-indications

Ce médicament ne doit pas être administré à votre enfant s'il est hypersensible à un des ingrédients

Interactions médicamenteuses.

Il n'est connu aucune interaction entre le sirop LUEX Toux de Bébé et d'autres médicaments

Comment administrer LUEX sirop pour bébés?

Voie Orale	
4 mois à 1 an:	5ml trois or quatre fois par jour
1 à 5 ans:	10ml trois or quatre fois par jour

Précautions

Ne pas administrer plus fréquemment que toutes les 6 heures.

Ne pas administrer avec d'autres remèdes contre la toux et le rhume.

Si les symptômes persistent consulter votre médecin

MISES EN GARDE: NE PAS DEPASSER LA DOSE PRESCRITE

Si vous oubliez d'administrer une dose, il faut l'administrer dès que vous vous rappelez à moins qu'il ne soit l'heure de la prochaine dose.

Ne pas prendre deux doses à la fois.

Effets indésirables possibles:

Comme tout médicament, le sirop de bébé LUEX contre la toux peut causer des effets indésirables à certains patients.

En cas de forte dose, le sirop LUEX Toux de Bébé peut causer la diarrhée. Si votre enfant présente un effet indésirable, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

En cas de surdosage

Si vous avez pris plus de la dose recommandée, adressez-vous aussitôt au service des urgences à l'hôpital le plus près

Comment conserver LUEX sirop pour les bébés?

Conserver dans un endroit frais et sec, au-dessous de 25°C et à l'abri de la lumière

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur la flacon

Tenir hors de la portée des enfants

Date de révision de la notice: avril 2017



Fabriqué pour:
LONDON UNITED EXPORTS LTD.
Londres, Angleterre
www.luxhealthcare.com



par:
CIRON DRUGS & PHARMACEUTICALS PVT. LTD.
Tanapur, Bolnisi-401506.