

90mm

FLUDOL[®] Capsules

Capsules décongestionnant pour le soulagement du rhume, de la grippe, de l'étouffement nasal, des éternuements, de l'écoulement nasal, des maux de tête et la restauration de la respiration naturelle.

CHACQUE CAPSULE CONTIENT:

Paracétamol BP	300mg.
Chlorphéniramine maléate BP	4 mg.
Phényléphrine HCl BP	5mg.
Caféine anhydre BP	30mg.

Excipients à effet connu

Chaque capsule contient : Lactose anhydre ... 121mg

LISTE DES EXCIPIENTS

Lactose anhydre
Stéarate de magnésium
Capsule de gélatine de taille "0"

INDICATIONS:

Fludol est indiqué pour le soulagement des symptômes du rhume et de la grippe, comme le nez bouché, les éternuements, les céphalées, l'écoulement nasal, la congestion bronchique et la fièvre.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Adultes et enfants de plus de 12 ans

Fludol capsule doit être pris toutes les six heures, lorsque cela est nécessaire ou selon les directives du médecin.
Ne pas dépasser 6 gélules par jour.

PHARMACOLOGIE & PHARMACOCINÉTIQUE:

Fludol est bien toléré, c'est un anti-catarrhale efficace avec des propriétés analgésiques, décongestionnants et antihistaminiques. Les différents constituants agissent en synergie ou seuls pour produire les effets pharmacologiques souhaités de Fludol.

Le **paracétamol** est utilisé dans le traitement symptomatique de la douleur et de la fièvre. Il est largement métabolisé et excrété dans l'urine.

La **caféine** est un stimulant du système nerveux central. Il inhibe l'enzyme phosphodiesterase et a un effet antagoniste sur les récepteurs centraux adénosines. Il est facilement absorbé après administration orale et est complètement métabolisé par oxydation, déséthylation et acétylation et est excrété dans l'urine. La caféine est utilisée dans FLUDOL pour neutraliser les effets sédatifs des antihistaminiques.

La **Phényléphrine** est utilisée pour le soulagement temporaire des symptômes de la congestion nasale, des sinus et des oreilles provoquée par le rhume; mais aussi la grippe, les allergies, les maladies respiratoires ou autres (par exemple, sinusite, bronchite). Il agit en diminuant l'enflure dans le nez et les oreilles, ce qui diminue l'inconfort et rend la respiration plus facile.

Le **Maléate de chlorphéniramine** est un antihistaminique de type amine, un inhibiteur compétitif de l'histamine au niveau des récepteurs d'histamine H-1. Elle est absorbée relativement lentement au niveau du tractus gastro intestinal et est largement métabolisée en desméthyl et didesméthyl chlorphéniramine. Le médicament sous forme inchangée et ses métabolites sont excrétés principalement dans l'urine.

90mm

CONTRE-INDICATIONS :

Paracétamol & caféine:

Hypersensibilité connue à l'un des ingrédients.

Phényléphrine:

• Hypersensibilité à l'un des ingrédients.

• À éviter chez les patients souffrant de maladies cardiovasculaires, d'hypertension artérielle, de diabète sucré, de glaucome à angle fermé, d'hyperthyroïdie, d'hypertrophie de la prostate et de phéochromocytome.
• Les patients traités par des inhibiteurs de la monoamine oxydase ou dans les 14 jours suivant l'arrêt d'un tel traitement.

Maléate de chlorphéniramine:

• La chlorphéniramine est contre-indiquée chez les patients qui sont hypersensibles aux antihistaminiques.

Les propriétés anticholinergiques de la chlorphéniramine sont intensifiées par les inhibiteurs de la monoamine oxydase (IMAO). La chlorphéniramine est donc contre-indiquée chez les patients qui ont été traités par des IMAO au cours des quatorze derniers jours.

PRÉCAUTIONS:

S'il vous plaît noter que la dose indiquée ne doit pas être dépassée. Fludol peut causer de la somnolence. Dans ce cas, ne pas conduire ou utiliser des machines. L'alcool doit être évité lors de la prise de Fludol. Si vous prenez actuellement un autre médicament, consultez votre pharmacien ou votre médecin avant de prendre Fludol.

En cas de surdosage accidentel ou si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

EFFETS SECONDAIRES:

Des effets secondaires bénins, comme des éruptions cutanées, sécheresse de la bouche et des nausées peuvent être expérimentés. Si des effets inhabituels sont observés, Fludol doit être interrompu et votre médecin ou pharmacien devrait être consulté.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT:

Fludol ne doit pas être administré aux femmes enceintes ou qui allaitent.

CONSERVATION:

Mettre à l'abri de la lumière, de la chaleur et de l'humidité. A conserver de préférence à une température inférieure à 30° C. Conserver hors de portée des enfants.

Présentation: Fludol capsules Boite de 1x100.

"Cette notice a été révisée pour la dernière fois en juin 2021"

PHARMATEC
Caring for all generations

Fabriqué par:
Pharmatec Pakistan (Pvt.) Ltd.,
D-86/A, S.I.T.E., Karachi-Pakistan.

Pour toute Information
Thérapeutique, Contacter:
IMS Pharma Sipres M'bao N° 642:
Dakar- Sénégal.

AW206114
01020202

175mm