

72 mm

72 mm

FLUDOL-P[®]

Sirop

POUR ENFANTS

COMPOSITION:

Chaque 5 ml contient:

Paracétamol B.P. 120mg.
Phényléphrine HCl B.P. 5mg.
Chlorphéniramine Maléate B.P. 1mg.

Excipients à effet connu

Chaque 5ml contient : Solution de sorbitol 70% ... 2000mg, Propylène Glycol ... 375mg, Glycérine ... 375mg, Saccharine de sodium ... 7.5mg, Benzoate de sodium ... 18mg & Sorbate de potassium ... 5mg.

LISTE DES EXCIPIENTS

Polyéthylène Glycol 1500
Solution de sorbitol à 70
Propylène Glycol
Glycérine
Saccharine de sodium
Benzoate de sodium
Sorbate de potassium
Arôme artificiel vanille-cerise
F.D & C Rouge # 40
Eau purifiée

INDICATIONS:

Fludol-P + sirop procure un soulagement efficace des symptômes du rhume et de la grippe, y compris la douleur et la fièvre, la congestion ou les symptômes associés aux allergies tels que la rhinite, la sinusite, l'écoulement nasal et les éternuements.

POSOLOGIE:

Enfants:

6-12 ans: 1-2 cuillères à café 3 fois par jour.
2-5 ans: 1 cuillerée à café 3 fois par jour.
1-2 ans: 1/2 cuillère à café 3 fois par jour.

Mise en garde: Pour les nourrissons et les enfants jusqu'à 6 ans, à utiliser selon les recommandations du médecin.

La prise ne doit pas être répétée avant 6 heures.
Ne pas dépasser la dose recommandée.

PHARMACOLOGIE & PHARMACOCINÉTIQUE:

Fludol P+ Sirop est un analgésique efficace et bien toléré, il possède des propriétés décongestionnantes et antihistaminiques. Les différents constituants agissent en synergie ou seuls pour produire les effets pharmacologiques souhaités de Fludol P+ Sirop.

Le paracétamol est utilisé dans le traitement symptomatique de la douleur et de la fièvre. Il est largement métabolisé et excrété dans l'urine.

Chlorhydrate de phényléphrine: est utilisée pour le soulagement temporaire des symptômes de la congestion nasale, des sinus et des oreilles provoquées par le rhume ; mais aussi la grippe,

les allergies, les maladies respiratoires ou autres (par exemple, sinusite, bronchite). Il agit en diminuant l'enflure dans le nez et les oreilles, ce qui diminue l'inconfort et rend la respiration plus facile.

Maléate de chlorphéniramine est un antihistaminique de type amine, un inhibiteur compétitif de l'histamine au niveau des récepteurs d'histamine H-1. Elle est absorbée relativement lentement au niveau du tractus gastro intestinal et est largement métabolisée en desméthyl et didesméthyl chlorphéniramine. Le médicament sous forme inchangée et ses métabolites sont excrétés principalement dans l'urine.

CONTRE-INDICATIONS:

Hypersensibilité à l'un des constituants de Fludol-P + Sirop, en cas d'hypertension, de maladie coronarienne sévère ou avec IMAO.

PRÉCAUTIONS:

Fludol-P + sirop peut causer de la somnolence, si cela survient, ne pas conduire ou utiliser des machines. L'alcool doit être évité lors de la prise Fludol-P + sirop.

En cas de prise d'autres médicaments, consultez votre médecin ou pharmacien avant de prendre Fludol-P + Sirop

En cas de surdosage accidentel ou si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

EFFETS SECONDAIRES:

Des effets secondaires bénins, comme des éruptions cutanées, sécheresse de la bouche et des nausées peuvent survenir. Si des effets inhabituels sont observés Fludol-P+ sirop doit être interrompu et votre pharmacien ou votre médecin doit être consulté.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT: Pendant la grossesse et l'allaitement, le produit peut être utilisé que s'il est recommandé par un médecin agréé.

CONSERVATION:

Mettre à l'abri de la lumière et de la chaleur. A conserver de préférence à une température inférieure à 30°C.

Conservez tous les médicaments hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser après la date de péremption indiquée sur l'emballage.

Uniquement à usage oral.

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT:

Fludol-P + sirop est disponible en flacon en verre ambré de 60ml et 120ml.

"Cette notice a été révisée pour la dernière fois en juin 2022"

AW205000
010201078

PHARMATEC

Fabriqué par:
Pharmatec Pakistan (Pvt.) Ltd.,
D-86/A, S.I.T.E., Karachi-Pakistan.