



TONG MEI LABORATOIRE

QUININE TM INJ 600MG/2ML IM/IV B/100

1.3.2 Notice à l'intention du patient

TONGMEI LABORATOIRE QUININE DIHYDROCHLORIDE TM INJECTABLE

FORME ET PRESENTATION

Solution injectable (IM, IV) à 600 mg / 2 ml : Ampoule (verre brun) de 2 ml, boîte de 100

COMPOSITION

Quinine 490 mg

(Sous forme de quinine dihydrochloride: 600mg/2ml)

Excipients : Eau pour préparations injectables. Conservateurs : EDTA

FORME PHARMACEUTIQUE

Ampoules injectables

CLASSE PHARMACO – THERAPEUTIQUE

Antipaludique (P : parasitologie).

INDICATIONS THERAPEUTIQUES

Traitement du paludisme :

- Accès pernicieux ;
- Accès palustre, en particulier en cas de résistance aux amino-4-quinoléines, avec impossibilité d'utiliser la voie orale.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION

Voie intraveineuse :

25 mg/kg/j de quinine base répartis en 3 injections de 8 mg/kg, en perfusion intraveineuse lente de 4heures chacune à répéter toutes les 8 heures (ou éventuellement en continu à la seringue électrique).

Le produit sera dilué de préférence dans une solution glucosée à 5% ou 10% ou bien dans un soluté physiologique.

Voie intramusculaire :

2 à 3 injections lentes et profondes par jour de 8 mg/kg de quinine.

NB : En raison du risque de nécrose induite par la quinine, cette voie d'administration doit être réservée aux situations où il est impossible de mettre en place une perfusion intraveineuse. La durée de traitement d'un accès palustre par la quinine est de 5 à 7 jours. Le relais par la voie orale sera envisagé dès que possible.

Mode d'administration :

Perfusion intraveineuse lente de préférence.

CONTRE – INDICATIONS

Absolues:

- Troubles de la conduction intraventriculaire.
- Antécédent de fièvre bilieuse hémoglobinurique.
- Antécédent d'hypersensibilité à l'un des composants.
- Astémizole.



Relatives :

- Méfloquine

MISES EN GARDES ET PRECAUTIONS PARTICULIERES D'EMPLOI

La quinine induit une augmentation de la sécrétion de l'insuline par le pancréas ; donc une surveillance de la glycémie est recommandée pendant le traitement.

La survenue d'une hémolyse importante sous le traitement doit faire évoquer une fièvre bilieuse hémoglobinurique devant conduire à l'arrêt du traitement par la quinine.

Pendant l'injection ; une surveillance de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle est recommandée. La survenue d'une arythmie nécessite le ralentissement de la vitesse de perfusion.

INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Associations contre-indiquées :

- Astémizole : risque majoré de troubles du rythme ventriculaire, notamment de torsades de pointes.

Associations déconseillées :

- Méfloquine : risque majoré d'apparition de crises convulsives en raison de l'addition des effets convulsivants.

Respecter un délai minimal de 12 heures entre la fin de l'administration IV de quinine et le début de l'administration de la méfloquine.

EFFETS INDESIRABLES

- Risque de survenue d'hypoglycémie.
- Possibilité de survenue de signes de cinchonisme (acouphènes, vertiges, céphalées, troubles de la vision, baisse de l'acuité auditive, nausée).
- Manifestations allergiques : prurit, urticaire, éruption cutanée généralisée, choc anaphylactique.
- Anémie hémolytique aiguë parfois grave.
- Thrombopénie, purpura thrombocytopénique.
- En cas d'extrasation ou de perfusion de produit trop concentré, risque de survenue d'endophlébite et de sclérose de la veine.

SURDOSAGE

Signes de surdosages fréquents :

- Acouphènes, baisse de l'acuité auditive et vertige ;
- Amblyopie, rétrécissement du champ visuel, diplopie et héméralopie ;
- Effet quinidine-like aboutissant à une hypotension ;

Le surdosage peut être fatal pour le patient, en cas de surdosage ; effectuer un traitement symptomatique des anomalies en milieu hospitalier.

CONDUITE ET UTILISATIONS DE MACHINES

L'attention sera attirée notamment chez les conducteurs de véhicules et les utilisateurs des machines sur les risques de vertiges et les troubles de la vision, attachés à l'emploi de ce produit.

INCOMPATIBILITES

En l'absence d'études de compatibilité, ce médicament ne doit pas être mélangé avec d'autres médicaments.



TONG MEI LABORATOIRE

QUININE TM INJ 600MG/2ML IM/IV B/100

CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C, à l'abri de la lumière, ne pas dépasser la date limite figurant sur le conditionnement extérieur.

LISTE I



Fabriqué par: Grand Pharmaceutical (Chine) Co., Ltd. Wuhan city , Chine

pour: TONGMEI LABORATOIRE

Siège: Immeuble SODEVZF B.P.3076 Lomé-TOGO

Tel:(00228)22 71 37 74 Fax:(00228)22 71 37 75

E-mail:headquarters@tomepharm.com

DATE DE REVISION DE LA NOTICE

Juin 2023