نوڤوكلان® أكياس

أموكسيسيلين- حامض كلاڤولانيك

التقديم و التركيب :

نوڤوكلان 1 غ/125 مغ، علب من 12، 16 و 24 كيسا : في الكيس

أموكسيسيلين ..... 1000 مغ

حامض كلاڤولانيك ..... 125 مغ

نوڤوكلان 500 مغ/62.5 مغ، علبة من 12 كيسا : في الكيس

أموكسيسيلين ..... 500 مغ

حامض كلاڤولانيك ..... 62.5 مغ

نوڤوكلان 250 مغ/31.25 مغ، علبة من 12 كيسا : في الكيس

أموكسيسيلين ..... 250 مغ

حامض كلاڤولانيك ..... 31.25 مغ

سواغ ذو مفعول هام : أسبرطام.

حالات الإستعمال :

تقتصرعلى التعفنات الناتجة عن جراثيم حساسة خاصة حالات تكاثر و/ أو مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية الموجودة حاليا.

لنوڤوكلان تأثير خاص في الحالات التالية :

- إلتهاب الأذن الحاد عند الطفل ،إلتهاب الأذن المتكرر؛
- إلتهاب الجيب؛
- ذبحة اللوزتين المتكررة، إلتهاب اللوزتين المزمن؛
- إلتهاب القصبات و الرئة الحاد عند الشخص ذي خطر: كحولي حاد، المدخن والشخص ما فوق 65 سنة؛
- تضاعف تعفنات القصبات و الرئة الحادة؛
- التعفنات البولية المتكررة و المعقدة باستثناء التعفنات البروستاتية؛
- تعفنات الجهاز التناسلي؛
- تعفنات الفم الحادة : خراج، قلغمون، إلتهاب النسيج الخلوي.

حالات عدم الإستعمال :

- الحساسية للبينيسيلين؛
- المانونوكليوز والإستعمال مع الألوبورينول.

تأثيرات غير مرغوب فيها

- هضمية : غثيان، قيء، إسهال، عسر الهضم وآلام بطنية؛
- حساسية : خاصة الشرى، مرض الأيوسية، إنتفاخ الوجه و العنق، ضيق التنفس؛
- جلدية ناتجة أو غير ناتجة عن حساسية .

الإحتياطات :

- الأخذ بعين الإعتبار ظهور حادث حساسي متصالب مع سيفالوسبورين؛
- في حالة القصور الكلوي، تطبق المقادير حسب تصفية الكرياتينين؛
- الأخذ بعين الإعتبار المرور في المشيمة وفي حليب الأم.

إنتباه : يجب توقيف العلاج عند ظهور أي أعراض حساسية.

طريقة الإستعمال والمقادير :

عن طريق الفم :

اقطع الطرف الأعلى للكيس، أفرغ محتواه في كأس، أضف قليلا من الماء، حرك واشرب على الفور.

- **البالغين** : 2 إلى 3 غ / اليوم، أي 2 إلى 3 أكياس من نوڤوكلان 1 غ/125 مغ مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.
- **الأطفال** من 6 إلى 12 سنة : 40 إلى 50 مغ/كلغ/اليوم من نوڤوكلان 500 مغ/62.5 مغ مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم دون تجاوز 15 مغ/كلغ/اليوم من حامض كلاڤولانيك.
- **الأطفال** من 30 شهرا إلى 6 سنوات : 80 مغ/كلغ/اليوم من نوڤوكلان 500 مغ/62.5 مغ مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.
- **الأطفال** أقل من 30 شهرا : 80 مغ/كلغ/اليوم من نوڤوكلان 250 مغ/31.25 مغ ثلاث مرات في اليوم.

كيفية تخزين نوڤوكلان :

- يحفظ في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية.
- يحفظ بعيدا عن الرطوبة.

القائمة I .

صنع بالمختبر الصيدلي نوڤوفارما،
م.ص. 2إ، تيط مليل، الدار البيضاء.

NOVOCLIN® Sachets

Amoxicilline - acide clavulanique

PRESENTATIONS ET COMPOSITION :

NOVOCLIN 1 g/125 mg (Rapport : 8/1), boites de 12, 16 et 24 sachets : P.sachet

Amoxicilline.....1000 mg

Acide clavulanique.....125 mg

NOVOCLIN 500 mg/62,5 mg (Rapport : 8/1), boites de 12 sachets : P.sachet

Amoxicilline.....500 mg

Acide clavulanique.....62,5 mg

NOVOCLIN 250 mg/31,25 mg (Rapport : 8/1), boites de 12 sachets : P.sachet

Amoxicilline.....250 mg

Acide clavulanique.....31,25 mg

Excipients à effet notoire : Aspartam.

INDICATIONS :

Elles sont limitées aux infections dûes aux germes sensibles, notamment à certaines situations où les espèces bactériennes responsables de l'infection peuvent être multiples et /ou résistantes aux antibiotiques actuellement disponibles. NOVOCLIN présente un intérêt particulier dans les indications suivantes :

- Otites moyennes aiguës du jeune enfant, otites récidivantes ;
- Sinusites ;
- Angines récidivantes, amygdalite chronique ;
- Bronchopneumopathies aiguës du sujet à risque : éthylique chronique, tabagique, sujet de plus de 65 ans ;
- Surinfections de bronchopneumopathies chroniques ;
- Infections urinaires récidivantes ou compliquées à l'exclusion des prostatiques ;
- Infections gynécologiques hautes à l'exclusion des infections à chlamydiae ;
- Infections stomatologiques sévères : abcès, phlegmons, cellulites, parodontites.

CONTRE–INDICATIONS :

- Allergie aux pénicillines ;
- Mononucléose et association avec l'allopurinol (risque accru d'accidents cutanés).

EFFETS INDESIRABLES :

- Manifestations digestives : nausées, vomissements, diarrhées, dyspepsies et douleurs abdominales.
- Manifestations allergiques, notamment urticaire, éosinophilie, œdème de Quincke, gêne respiratoire, exceptionnellement choc anaphylactique.
- Eruptions cutanées maculopapuleuses d'origine allergique ou non.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Tenir compte du risque d'allergie croisée avec les antibiotiques de la famille des céphalosporines.
- En cas d'insuffisance rénale, adapter la posologie en fonction de la clairance de la créatinine.
- Tenir compte du fait que NOVOCLIN traverse la barrière placentaire et passe dans le lait maternel.

MISES EN GARDE :

En cas de manifestation allergique, arrêter le traitement et prévenir le médecin.

MODE D'EMPLOI ET POSOLOGIE :

Voie orale.

Déchirer le haut du sachet et verser le contenu dans un verre, ajouter de l'eau, remuer et boire immédiatement.

Les posologies sont exprimées en Amoxicilline elles dépendent de la sévérité de l'infection, en moyenne :

- ***Adultes :*** la posologie usuelle est de 2 à 3 g/jour soit 1 sachet de 1g/125 mg 2 à 3 fois par jour.
- ***Enfants de 6 à 12 ans :*** la posologie est de 40 à 50 mg/kg/jour de Novoclin sachets 500 mg/62,5 mg 2 à 3 fois par jour sans jamais dépasser 15 mg/kg/jour d'acide clavulanique.
- ***Enfants de 30 mois à 6 ans :*** la posologie est de 80 mg/kg/jour de Novoclin sachets 500 mg /62,5 mg 2 à 3 fois par jour.
- ***Enfants de moins de 30 mois :*** la posologie est de 80 mg/kg/jour de Novoclin sachets 250 mg/31,25mg 3 fois par jour.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION :

- A conserver à une T°<25° à l'abri de l'humidité.
- Durée de conservation : 2 ans.

Liste I.

Fabriqué par le laboratoire Pharmaceutique **NOVOPHARMA**
Z.I.I$_2$ Tit Mellil - Casablanca -

PRLN0V02 V02

06-21

LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE
NOVOPHARMA
Pharmacien responsable
Zineb ALAOUI
Tél. 05 22 51 10 00
Mail: z.alaoui@novopharma.ma