

ÉNALAPRIL BIOGARAN® 5 mg ÉNALAPRIL BIOGARAN® 20 mg

Comprimé sécable

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

- ❶ Qu'est-ce que ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable et dans quels cas est-il utilisé ?
- ❷ Quelles sont les informations à connaître avant de prendre ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable ?
- ❸ Comment prendre ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable ?
- ❹ Quels sont les effets indésirables éventuels ?
- ❺ Comment conserver ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable ?
- ❻ Contenu de l'emballage et autres informations.

❶ QU'EST-CE QUE ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?



Classe pharmacothérapeutique : Inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine - code ATC : C09AA02. ÉNALAPRIL BIOGARAN® contient une substance active appelée maléate d'énalapril. Ce médicament appartient à une famille de médicaments appelés les IEC (inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine).

ÉNALAPRIL BIOGARAN® est utilisé :

- pour traiter une pression artérielle élevée (hypertension artérielle) ;
- pour traiter l'insuffisance cardiaque (déficiência de la fonction cardiaque). Il peut éviter un séjour à l'hôpital et peut aider les patients à vivre plus longtemps ;
- pour prévenir l'insuffisance cardiaque symptomatique. Certains de ces symptômes sont : essoufflement, fatigue après une légère activité physique telle que la marche, ou gonflement des chevilles et des pieds.

Ce médicament agit en dilatant vos vaisseaux sanguins. Cela baisse votre pression artérielle. Le médicament commence à agir dans la première heure, et sa durée d'action est au moins de 24 heures. Certains patients devront suivre un traitement de plusieurs semaines pour obtenir une amélioration de la pression sanguine.

❷ QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable ?



Ne prenez jamais ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable

- Si vous êtes allergique au maléate d'énalapril ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6 ;
- si vous avez déjà eu une réaction allergique à un autre médicament de la même classe que ce médicament, appelé inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ;
- si vous avez déjà eu un gonflement de la face, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge, qui a entraîné des difficultés pour avaler ou respirer (angio-cedème) que la raison soit inconnue ou héréditaire ;
- si vous avez du diabète ou une insuffisance rénale et que vous êtes traité(e) par un médicament contenant de l'aliskiren pour diminuer votre pression artérielle ;

- si vous êtes enceinte de plus de 3 mois (Il est également préférable d'éviter de prendre ÉNALAPRIL BIOGARAN® en début de grossesse, voir rubrique « Grossesse et allaitement ») ;
- si vous avez pris ou prenez actuellement l'association sacubitril/valsartan, un médicament utilisé pour traiter un type d'insuffisance cardiaque au long cours (chronique) chez l'adulte, car le risque d'angio-cedème (gonflement rapide sous la peau dans une région telle que la gorge) est accru.

Ne prenez pas ce médicament si l'un de ces cas s'applique à vous. Si vous n'êtes pas sûr, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.



Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou votre infirmier/ère avant de prendre ÉNALAPRIL BIOGARAN® :

- si vous souffrez de problèmes cardiaques ;
- si vous avez une pathologie des vaisseaux sanguins du cerveau ;
- si vous avez un problème sanguin tel qu'une diminution ou un manque de globules blancs (neutropénie/agranulocytose), un nombre de plaquettes bas (thrombocytopénie) ou une diminution des globules rouges (anémie) ;
- si vous avez un problème hépatique ;
- si vous avez des problèmes rénaux (y compris transplantation rénale) ;
- si vous suivez un régime hyposodé, si vous prenez des suppléments potassiques, des agents épargneurs de potassium, des substituts de sel contenant du potassium ou d'autres médicaments pouvant augmenter le potassium dans votre sang (par exemple, héparine [médicament utilisé pour prévenir les caillots sanguins], médicaments contenant du triméthoprim tels que cotrimoxazole [médicaments utilisés pour traiter les infections]). Ils peuvent induire une augmentation du taux de potassium dans le sang qui peut être grave. Dans ce cas votre médecin pourra être amené à ajuster le dosage de ÉNALAPRIL BIOGARAN® ou à surveiller votre taux de potassium ;
- si vous êtes hémodialysé(e) ;
- si vous avez été très malade (vomissements importants) ou avez eu récemment une diarrhée importante ;
- si vous souffrez d'un diabète. Vous devez surveiller l'apparition d'une hypoglycémie, surtout le premier mois de traitement. Votre taux de potassium sérique peut également augmenter ;
- si vous avez déjà eu une réaction allergique avec gonflement de la face, des lèvres, de la bouche, de la langue ou de la gorge, avec des difficultés pour avaler ou respirer. Vous devez savoir que les patients noirs ont un risque accru de ces réactions aux IEC ;
- si vous avez une pression artérielle basse (qui peut vous donner l'impression de syncope ou d'étourdissement, surtout en position verticale) ;
- si vous souffrez de collagénose (notamment d'un lupus érythémateux, d'arthrite rhumatoïde ou de sclérodermie), si vous suivez un traitement qui diminue vos défenses immunitaires, si vous prenez de l'allopurinol, de la procainamide, ou une association de ces deux médicaments ;
- si vous prenez l'un des médicaments qui suivent, le risque d'angio-cedème peut être accru :
 - le racécadotril, un médicament utilisé pour traiter la diarrhée ;
 - des médicaments utilisés pour prévenir le rejet d'un organe transplanté et pour traiter le cancer (tels que temsirolimus, sirolimus, évérolimus) ;



- la vildagliptine, un médicament utilisé pour traiter le diabète ;
- si vous prenez l'un des médicaments suivants pour traiter une hypertension :
 - un « antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II » (ARA II) (aussi connu sous le nom de sartans – par exemple valsartan, telmisartan, irbésartan), en particulier si vous avez des problèmes rénaux dus à un diabète ;
 - aliskiren.

Votre médecin pourra être amené à surveiller régulièrement le fonctionnement de vos reins, votre pression artérielle et le taux des électrolytes (par exemple du potassium) dans votre sang.

Voir aussi les informations dans la rubrique « Ne prenez jamais ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable ».

Vous devez informer votre médecin si vous pensez être (ou susceptible de devenir) enceinte. Ce médicament est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant en cas d'utilisation à partir de ce stade de la grossesse (voir rubrique « Grossesse »).

Vous devez savoir que ce médicament est moins efficace pour diminuer la pression artérielle chez les patients noirs que chez les autres patients. Si vous n'êtes pas certain que l'un de ces cas s'applique à vous, consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Si vous êtes sur le point de subir un examen

Si vous êtes sur le point d'avoir une des opérations suivantes, avvertissez votre médecin que vous prenez ÉNALAPRIL BIOGARAN® :

- si vous devez subir une intervention chirurgicale ou une anesthésie (même chez le dentiste) ;
- si vous devez suivre un traitement anti-cholestérolémiant appelé « aphérèse des LDL » ;
- si vous devez subir un traitement de désensibilisation, pour diminuer l'effet de l'allergie due aux piqûres de guêpe ou d'insecte.

Si l'un de ces cas s'applique à vous, avvertissez votre médecin ou votre dentiste, avant l'intervention.

Autres médicaments et ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Cela inclut les préparations à base de plantes. Ceci parce que ÉNALAPRIL BIOGARAN® peut agir sur le mécanisme d'action de certains médicaments. Les autres médicaments peuvent également modifier le mécanisme d'action de ÉNALAPRIL BIOGARAN®. Votre médecin pourrait avoir besoin de modifier la dose de vos médicaments et/ou prendre d'autres précautions.

En particulier, informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II (ARA II) ou l'aliskiren (voir aussi les informations dans les rubriques « Ne prenez jamais ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable » et « Avertissements et précautions ») ;
- d'autres médicaments pour baisser la pression artérielle, tels que des bêta-bloquants, ou des diurétiques ;
- des suppléments potassiques (y compris des substituts de sel), des diurétiques épargneurs de potassium et d'autres médicaments qui peuvent augmenter la quantité de potassium dans le sang (tels que le triméthoprim et le cotrimoxazole pour traiter des infections causées par des bactéries ; la ciclosporine, un médicament immunosuppresseur utilisé pour prévenir le rejet d'un organe transplanté ; et l'héparine, un médicament utilisé pour fluidifier le sang afin d'éviter la formation de caillots). Voir aussi les informations dans la rubrique « Avertissements et précautions » ;
- des médicaments pour le diabète (incluant les antidiabétiques par voie orale et l'insuline) ;
- le lithium (médicament utilisé pour traiter certains cas de dépression) ;
- des médicaments pour la dépression appelés antidépresseurs tricycliques ;
- des médicaments pour les problèmes mentaux appelés antipsychotiques ;
- certains médicaments pour la toux et le rhume, et certains médicaments utilisés pour réduire la surcharge pondérale, qui contiennent un agent sympathomimétique ;

- certains médicaments contre la douleur ou des médicaments antiarthritiques y compris les sels d'or ;
- un inhibiteur mTOR (tels que temsirolimus, sirolimus, évérolimus, médicaments utilisés pour traiter certains types de cancer ou pour empêcher le système immunitaire de l'organisme de rejeter un organe transplanté). Voir aussi les informations dans la rubrique « Avertissements et précautions » ;
- un médicament contenant un inhibiteur de la néprilysine, tel que le sacubitril (disponible en association à doses fixes avec le valsartan), le racécadotril ou la vildagliptine. Le risque d'angio-œdème (gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge avec difficulté à avaler ou à respirer) peut être augmenté. Voir également les informations dans les rubriques « Ne prenez jamais ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable » et « Avertissements et précautions » ;
- les anti-inflammatoires non stéroïdiens, incluant les inhibiteurs de la COX-2 (médicaments qui diminuent l'inflammation, et peuvent être utilisés pour aider à soulager la douleur) ;
- l'aspirine (acide acétylsalicylique) ;
- les médicaments utilisés pour dissoudre les caillots sanguins (anti-thrombotiques) ;
- l'alcool.

Si vous n'êtes pas sûr(e) que l'un de ces cas s'applique à vous, informez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ÉNALAPRIL BIOGARAN®.

ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable avec des aliments et boissons

ÉNALAPRIL BIOGARAN® peut être pris avec ou sans aliments. Le plus souvent, les patients prennent ÉNALAPRIL BIOGARAN® avec un verre d'eau.



Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Grossesse

Votre médecin vous recommandera normalement d'arrêter de prendre ÉNALAPRIL BIOGARAN® avant d'être enceinte ou dès que vous apprenez que vous êtes enceinte. Il vous recommandera de prendre un autre médicament à la place de ÉNALAPRIL BIOGARAN®. Ce médicament est déconseillé en début de grossesse, et ne doit pas être pris si vous êtes enceinte de plus de 3 mois, car cela pourrait nuire gravement à votre enfant.

Allaitement

Informez votre médecin si vous allaitez ou si vous êtes sur le point de commencer l'allaitement. L'allaitement de nouveau-nés (premières semaines après la naissance), et en particulier l'allaitement de prématurés, est déconseillé lors d'un traitement par ce médicament. En cas d'allaitement d'un bébé plus âgé, votre médecin devra vous informer sur les bénéfices et les risques de la poursuite de ce médicament pendant l'allaitement en comparaison à d'autres traitements.



Conduite de véhicules et utilisation de machines

La prise de ce médicament peut entraîner une sensation de vertige ou d'endormissement. Si cela arrive, ne pas conduire ni utiliser des outils ou des machines.

ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable contient du lactose

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

3 COMMENT PRENDRE ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable ?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.



VOIE ORALE

- Il est très important de continuer à prendre ce médicament, aussi longtemps que votre médecin vous l'a prescrit ;
- ne prenez pas plus de comprimés que prescrits.

Hypertension artérielle :

- la dose habituelle initiale recommandée est de 5 à 20 mg par jour en une prise ;
- certains patients peuvent nécessiter une dose initiale plus faible ;
- la dose habituelle d'un traitement au long cours est de 20 mg par jour en 1 prise ;
- la dose maximale au long cours est de 40 mg par jour.

Insuffisance cardiaque :

- la dose initiale habituelle est de 2,5 mg par jour ;
- cette dose sera augmentée par palier par votre médecin jusqu'à ce qu'une dose adaptée soit atteinte ;
- la dose habituelle d'un traitement au long cours est de 20 mg par jour en 1 à 2 prises ;
- la dose maximale d'un traitement au long cours est de 40 mg par jour en 2 prises.

Patient avec troubles rénaux :

Votre dose sera adaptée selon l'état de fonctionnement de vos reins.

- Problèmes rénaux modérés : 5 mg à 10 mg par jour ;
- problèmes rénaux graves : 2,5 mg par jour ;
- si vous êtes hémodialysé : 2,5 mg par jour. Durant les jours sans dialyse, votre dose pourra être modifiée selon l'état de votre tension artérielle.

Patients âgés :

Votre médecin décidera de la dose en fonction de l'état de santé de vos reins.

Utilisation chez les enfants

Les données chez les enfants hypertendus sont limitées. Si l'enfant peut avaler des comprimés, la dose sera définie en fonction de son poids et de sa pression artérielle. Les doses initiales habituelles sont :

- entre 20 kg et 50 kg : 2,5 mg par jour ;
- plus de 50 kg : 5 mg par jour.

Les doses peuvent être modifiées en fonction des besoins de l'enfant :

- une dose maximale de 20 mg par jour peut être utilisée chez les enfants entre 20 kg et 50 kg ;
- une dose maximale de 40 mg par jour peut être utilisée chez les enfants de plus de 50 kg ;
- ce médicament n'est pas recommandé chez les nouveau-nés (premières semaines après la naissance) et chez les enfants souffrant de troubles rénaux.

Si vous avez pris plus de ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de ÉNALAPRIL BIOGARAN® que vous n'auriez dû, parlez-en à votre médecin ou allez immédiatement à l'hôpital. Prenez la boîte de médicament avec vous. Les effets suivants peuvent arriver : sensation de tête légère ou de vertige. Cela est dû à une baisse soudaine ou excessive de la pression artérielle.

Si vous oubliez de prendre ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable

- Si vous oubliez de prendre un comprimé, sautez la dose ;
- continuez simplement votre traitement comme prévu ;
- ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable

N'arrêtez votre traitement que si votre médecin vous le demande.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmier/ère.

4 QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir lors de la prise de ce médicament :

Arrêtez de prendre ÉNALAPRIL BIOGARAN® et parlez-en à votre médecin immédiatement, si vous avez l'un des symptômes suivants :

- un gonflement de la face, des lèvres, de la langue, de la bouche ou de la gorge, qui peut vous donner des difficultés pour respirer ou avaler ;
- un gonflement de vos mains, pieds ou chevilles ;
- une éruption de plaques rouges ou en relief (urticaire).

Vous devez savoir que les patients noirs ont un risque accru de ces types de réactions. Si l'un de ces cas vous arrive, arrêtez de prendre ÉNALAPRIL BIOGARAN® et consultez immédiatement votre médecin.

Lorsque vous débutez un traitement par ce médicament vous pouvez avoir une sensation de perte de connaissance ou de vertige. Si cela vous arrive, allongez-vous. Cela est dû à la diminution de votre pression artérielle. Cela s'améliorera en continuant à prendre le traitement. Si vous êtes inquiet, consultez votre médecin.

Les autres effets incluent :

Très fréquent (pouvant affecter au-delà d'1 patient sur 10) :

- sensation d'étourdissements, de fatigue ou de malaise ;
- vision trouble ;
- toux.

Fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10) :

- étourdissement en raison d'une pression artérielle basse, troubles du rythme cardiaque, augmentation de la fréquence cardiaque, angine de poitrine ou douleurs thoraciques ;
- maux de tête, dépression, évanouissement (syncope) ;
- modification du goût ;
- essoufflement ;
- diarrhée, douleurs abdominales ;
- fatigue ;
- éruption cutanée, réactions allergiques avec gonflement du visage, des lèvres, de la langue, ou de la gorge entraînant des difficultés pour avaler ou respirer ;
- taux élevé du potassium dans le sang, augmentation du taux de créatinine dans le sang (les deux sont habituellement détectés lors d'une prise de sang).

Peu fréquent (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 100) :

- bouffées vasomotrices ;
- chute soudaine de la pression artérielle ;
- battements de cœur rapides ou irréguliers (palpitations) ;
- infarctus du myocarde (pouvant être dû à une pression artérielle excessivement basse chez les patients à haut risque, y compris chez les personnes ayant des problèmes de circulation sanguine du cœur ou du cerveau) ;
- accident vasculaire cérébral (pouvant être dû à une pression artérielle excessivement basse chez les patients à haut risque) ;
- anémie (aplasique ou hémolytique) ;
- confusion, somnolence, insomnie, nervosité ;
- fourmillements, palpitations ;
- vertige (sensations de rotation) ;
- bourdonnement d'oreilles (acouphène) ;
- écoulement nasal, mal de gorge ou enrouement ;
- asthme – associé à une sensation d'oppression dans la poitrine ;
- transit lent des aliments dans l'intestin (iléus), inflammation du pancréas ;
- vomissement, indigestion, constipation, anorexie ;
- irritation de l'estomac (irritation gastrique), sécheresse de la bouche, ulcère ;
- crampes musculaires ;
- dysfonctionnement rénal, insuffisance rénale ;
- augmentation de la transpiration ;

- démangeaisons ou urticaire ;
- perte de cheveux ;
- sensation de malaise, poussée de fièvre, impuissance ;
- forte concentration de protéines dans les urines (mesurée par une analyse) ;
- augmentation de l'urée sanguine, diminution du taux de sucre ou de sodium dans le sang (tous mesurés lors d'une prise de sang).

Rare (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 1000) :

- syndrome de Raynaud, lorsque vos mains et vos pieds deviennent très froids et blancs, à cause d'une circulation sanguine lente ;
- modifications des valeurs sanguines, telles que diminution du nombre de globules blancs ou rouges, baisse de l'hémoglobine, augmentation des plaquettes ;
- gonflement des ganglions dans le cou, les aisselles ou l'aîne ;
- inhibition de la fonction de la moelle osseuse ;
- maladies auto-immunes ;
- anomalies du sommeil et des rêves ;
- accumulation des fluides ou d'autres substances dans les poumons (vus aux rayons X) ;
- inflammation du nez ;
- inflammation des poumons provoquant des difficultés respiratoires (pneumonie) ;
- inflammation des joues, gencives, langue, lèvres et gorge ;
- excrétion d'urine réduite ;
- éruption cutanée ressemblant à une cible (érythème polymorphe) ;
- syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique (troubles cutanés graves avec rougeurs de la peau et desquamation, crevasse ou plaie à vif), dermatite exfoliative/érythrodermie (éruption cutanée avec desquamation ou écaillage de la peau), le pemphigus (petites bosses remplies de liquide sur la peau) ;
- problèmes du foie ou de la vésicule biliaire tels que diminution de la fonction hépatique, inflammation du foie, jaunisse (jaunissement de la peau ou des yeux), taux élevés d'enzymes hépatiques ou de bilirubine (mesurée par des tests sanguins) ;
- gonflement de la poitrine chez l'homme (gynécomastie).

Très rare (pouvant affecter jusqu'à 1 patient sur 10 000) :

- gonflement de l'intestin (angio-œdème intestinal).

Fréquence indéterminée (ne peut être estimée à partir des données disponibles) :

- la surproduction de l'hormone antidiurétique, provoquant la rétention d'eau, entraînant une faiblesse, fatigue ou confusion ;
- une association des symptômes a été rapportée, pouvant inclure tout ou partie des effets suivants : fièvre, inflammation des vaisseaux sanguins (série/vascularite), douleurs musculaires (myalgies/myosite), douleurs articulaires (arthralgie/arthritis). Éruption cutanée, photosensibilisation ou autres manifestations cutanées peuvent également se produire.

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet : www.signalement-sante.gouv.fr.

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

COMMENT CONSERVER ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable ?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

À conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable

ÉNALAPRIL BIOGARAN® 5 mg, comprimé sécable

- La substance active est :

Maléate d'énalapril5 mg

Pour un comprimé sécable.

- Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, amidon de maïs, crospovidone, amidon prégélatinisé, acide maléique, stéarate de magnésium.

ÉNALAPRIL BIOGARAN® 20 mg, comprimé sécable

- La substance active est :

Maléate d'énalapril20 mg

Pour un comprimé sécable.

- Les autres composants sont :

Lactose monohydraté, amidon de maïs, crospovidone, amidon prégélatinisé, acide maléique, stéarate de magnésium, oxyde de fer jaune.

Qu'est-ce que ÉNALAPRIL BIOGARAN®, comprimé sécable et contenu de l'emballage extérieur



Ce médicament se présente sous forme de comprimé sécable.

Boîte de 28 comprimés.

Titulaire/Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché

Laboratoires Biogaran
15, boulevard Charles de Gaulle
92707 Colombes Cedex

Fabricant

Delpharm Evreux
5, avenue du Guesclin
27000 Evreux

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est octobre 2021.

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETTRI.FR

BIOGARAN

Aurélie POTIN
Digitally signed by Aurélie POTIN
Date: 2021.11.29 16:25:52 +01'00'

00014092