

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pouvez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autre question, si vous avez un doute, demandez plus de information SVP à votre médecin ou pharmacien.
- Cette médicament vous a été personnellement prescrite. Ne le donnez jamais à quelque un d'autres, même en cas de symptômes identiques cela pourrait lui être nocif.



Lorit-MD

**Comprimés de
desloratadine 5mg**

1. Qu'est-ce que Lorit comprimés orodispersibles et dans quel cas est-il utilisé?

Qu'est-ce que Lorit comprimés orodispersibles?

Lorit comprimés orodispersibles contient de la desloratadine qui est un antihistaminique.

Comment agit Lorit comprimés orodispersibles?

Lorit comprimés orodispersibles est un médicament contre l'allergie qui ne vous rend pas somnolent. Il aide à contrôler votre réaction allergique et ses symptômes.

Quand Lorit comprimés orodispersibles doit-il être utilisé?

Lorit comprimés orodispersibles soulage les symptômes associés à la rhinite allergique (inflammation nasale provoquée par une allergie, par exemple, le rhume des foins ou l'allergie aux acariens) chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus. Ces symptômes comprennent les éternuements, le nez qui coule ou qui démange, les démangeaisons du palais, les yeux qui démangent, qui sont rouges ou larmoyants.

Lorit comprimés orodispersibles est aussi utilisé pour soulager les symptômes associés à l'urticaire (atteinte cutanée provoquée par une allergie). Ces symptômes comprennent les démangeaisons et éruptions urticariennes.

Le soulagement de ces symptômes dure toute la journée et vous aide à poursuivre vos activités quotidiennes normales et préserve votre sommeil.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Lorit comprimés orodispersibles?

Ne prenez jamais Lorit comprimés orodispersibles si vous êtes allergique à la desloratadine, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6), ou à la loratadine.

Avertissements et précautions

Adressez-vous à votre médecin, pharmacien ou infirmière avant de prendre Lorit comprimés orodispersibles :

- si vous présentez une maladie des reins

Utilisation chez les enfants et les adolescents

Ne donnez pas ce médicament à des enfants de moins de 12 ans.

Autres médicaments et Lorit comprimés orodispersibles

Il n'y a pas d'interactions connues d'Lorit comprimés orodispersibles avec d'autres médicaments.

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

Lorit comprimés orodispersibles avec des aliments et boissons

Lorit comprimés orodispersibles peut être pris pendant ou en dehors des repas.

Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou si vous envisagez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament. La prise d'Lorit comprimés orodispersibles n'est pas recommandée si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

Fertilité: Aucune donnée n'est disponible sur la fertilité chez l'humain.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

À la dose recommandée, il est peu probable que ce médicament affecte votre capacité à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. Bien que la plupart des personnes ne ressentent pas de somnolence, il est néanmoins recommandé de tester votre réponse à ce médicament avant d'accomplir des activités exigeant une vigilance, telles que conduire des véhicules ou utiliser des machines.

Lorit comprimés orodispersibles contient du lactose. Les comprimés d'Lorit comprimés orodispersibles contiennent du lactose. Si votre médecin vous a informé que vous présentez une intolérance à certains sucres, contactez votre médecin avant de prendre ce médicament.

3. Comment prendre Lorit comprimés orodispersibles?

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Adultes et adolescents de 12 ans et plus : La dose recommandée est d'un comprimé une fois par jour avec de l'eau, au moment ou en dehors des repas. Ce médicament est destiné à la voie orale.

Avant utilisation, ouvrez la plaquette thermoformée avec précaution et retirez le comprimé Mouff Dissolvant sans l'écraser.

Placez-le dans votre bouche et il se dispersera immédiatement. L'eau ou toute autre boisson n'est pas nécessaire pour avaler la dose.

Prenez la dose immédiatement après avoir retirée de la plaquette thermoformée.

Concernant la durée du traitement, votre médecin déterminera le type de rhinite allergique dont vous souffrez et déterminera la durée pendant laquelle vous devrez prendre Lorit comprimés orodispersibles.

Si votre rhinite allergique est intermittente (présence de symptômes sur une période de moins de 4 jours par semaine ou sur une période inférieure à 4 semaines), votre médecin vous recommandera ce traitement pour une durée qui dépendra de l'évaluation des antécédents de votre maladie.

Si votre rhinite allergique est persistante (présence de symptômes sur une période de 4 jours ou plus par semaine et pendant plus de 4 semaines), votre médecin peut vous recommander ce traitement pour une durée plus longue.

Concernant l'urticaire, la durée de traitement peut être variable d'un patient à l'autre et vous devez donc suivre les instructions de votre médecin.

Si vous avez pris plus d'Lorit comprimés orodispersibles que vous n'auriez dû. Prenez Lorit comprimés orodispersibles uniquement comme il vous a été prescrit. Aucun problème sérieux n'est attendu lors d'un surdosage accidentel.

Ce pendant, si vous avez pris plus d'Lorit comprimés orodispersibles que vous n'auriez dû, prévenez immédiatement votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.

Si vous oubliez de prendre Lorit comprimés orodispersibles

Si vous oubliez de prendre votre dose à temps, prenez-la dès que possible, puis continuez votre traitement normalement. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Lorit comprimés orodispersibles

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmière.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Depuis la commercialisation d'Lorit comprimés orodispersibles, des cas de réactions allergiques sévères (difficulté à respirer, sifflements bronchiques, démangeaisons, urticaire et gonflements) ont été très rarement rapportés.

Si vous ressentez l'un de ces effets indésirables graves, arrêtez de prendre le médicament et consultez d'urgence un médecin.

Lors des essais cliniques chez les adultes, les effets indésirables étaient à peu près les mêmes que ceux observés avec un comprimé placebo. Ce pendant, la fatigue, la sécheresse de la bouche et le mal de tête ont été rapportés plus souvent qu'avec un comprimé placebo. Chez les adolescents, le mal de tête était l'effet indésirable le plus fréquemment rapporté. Dans les essais cliniques avec Lorit comprimés orodispersibles, les effets indésirables suivants ont été rapportés :

Fréquence : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10

Fatigue, Sécheresse de la bouche, Maux de tête

Depuis la commercialisation d'Lorit comprimés orodispersibles, les effets indésirables suivants ont été rapportés :

Très rares : pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 1000

Réactions allergiques sévères, Eruption cutanée, Battements du cœur irréguliers ou plus intenses, Battements du cœur rapides, Douleur d'estomac, Nausées, Vomissements, Pesanteur d'estomac, Diarrhées, Vertige, Somnolence, Insomnie, Douleur musculaire, Hallucinations, Convulsions, Agitation avec mouvements corporels augmentés, Inflammation du foie, Anomalies du bilan hépatique sanguin.

Fréquence indéterminée :

la fréquence de survenue ne peut être estimée sur la base des données disponibles

Augmentation de la sensibilité de la peau au soleil, y compris en cas de soleil voilé, ainsi qu'au rayonnement ultraviolet (UV) par exemple aux lampes UV d'un solarium.

Déclaration des effets secondaires Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou à votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice.

Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration décrit en Annexe V. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'information sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Lorit comprimés orodispersibles

A conserver au-dessous de 30°C, à l'abri de lumière et l'humidité.

Ne pas laisser à la portée des enfants.

6. Contenu de l'emballage et autres informations ce que contient Lorit comprimés orodispersibles

- La substance active est la desloratadine 5mg.

Les autres composants sont la Lactose, cellulose microcristalline, l'amidon prégélatinisé, le carboxyméthylamidon sodique, le stéarate de magnésium, la croscopolldone, le bicarbonate de sodium, le dioxyde de silicium colloïdal, l'oxyde ferrique, l'aspartame et l'arôme Orange.

Présentation: Les comprimés sont conditionnés dans des boîtes de bandes Alu-Alu de 10, 20 100 comprimés.

Toutes les tailles peuvent être commercialisées.

MEDNEXT

BIOTECH LIMITED

Manufactured in India / Fabriqué en Inde

MEDNEXT BIOTECH LIMITED

Araji No. 1845-46-47, Near Jain Temple,
Isdal, Udaipur-313 011 (INDIA)



8 908010 1876948