

# AMOXICILLINE 500 mg, gélule

CREACIL

Blister de 10 gélules.

Blister de 12 gélules.

## COMPOSITION POUR UNE GELULE :

Amoxicilline ..... 500 mg

(sous forme d'amoxicilline trihydrate)

Excipients : Stéarate de magnésium.

## QU'EST-CE QUE AMOXICILLINE 500 mg, gélule ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Il s'agit d'un antibiotique de la famille des bêta-lactamines. Ce médicament est indiqué dans le traitement des infections bactériennes à germes sensibles.

Il est indiqué également chez l'adulte dans le traitement de certains ulcères de l'estomac ou du duodénum.

## QUELLES SONT LES INFORMATIONS NÉCESSAIRES AVANT DE PRENDRE AMOXICILLINE 500mg, gélule ? Contre-indications

Ne pas prendre ce médicament dans les cas suivants :

- Allergie aux antibiotiques de la famille des bêta-lactamines (pénicillines, céphalosporines) : tenir compte du risque d'allergie croisée avec les antibiotiques du groupe des céphalosporines,
- Allergie connue à l'un des composants du médicament (voir composition),

Ce médicament NE DOIT GÉNÉRALEMENT PAS ÊTRE UTILISÉ en association avec le méthotrexate (voir Interactions avec d'autres médicaments).

## Mises en garde spéciales - Précautions d'emploi

### Mises en garde

La survenue de toute manifestation allergique impose l'arrêt du traitement et la mise en place d'un traitement adapté. Avant de prendre ce traitement, prévenez votre médecin si à l'occasion d'un traitement antibiotique antérieur (même avec une autre famille d'antibiotique), une réaction allergique est apparue : urticaire ou autres éruptions cutanées, démangeaisons, brusque gonflement du visage et du cou d'origine allergique (oedème de Quincke)...

La survenue, en début de traitement, d'une rougeur se généralisant à tout le corps avec des pustules, et accompagnée de fièvre, doit faire suspecter une réaction grave appelée pustulose exanthématique aiguë généralisée (voir QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?) ; prévenez votre médecin immédiatement car cela impose l'arrêt du traitement; cette réaction va contre-indiquer toute nouvelle administration d'amoxicilline seule ou associée dans un même médicament à une autre substance active. La survenue de diarrhée au cours d'un traitement antibiotique ne doit pas être traitée sans avis médical.

### Précautions d'emploi

L'administration de fortes doses de bêta-lactamines chez l'insuffisant rénal ou chez les patients ayant eu par exemple des convulsions antérieurement, une épilepsie traitée ou des atteintes méningées, peut exceptionnellement entraîner des convulsions.

Utiliser ce médicament AVEC PRÉCAUTION en cas d'insuffisance rénale.

Boire abondamment pendant la durée du traitement.

Ce médicament peut fausser certains résultats d'analyse biologique : test de Coombs, glycémie, protéides totaux sériques, recherche de glucose dans les urines. Prévenez votre médecin de la prise d'amoxicilline si ces examens vous sont prescrits.

La prise de gélule est contre indiquée chez l'enfant avant 6 ans car il peut avaler de travers et s'étouffer.

### Interactions avec d'autres médicaments

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, et notamment avec le méthotrexate, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUÉMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

#### Grossesse

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

#### Allaitement

L'allaitement est possible avec la prise de ce médicament. Toutefois, si

le nouveau-né présente des troubles tels que diarrhée, éruptions sur la peau, candidose (affection due à certains champignons microscopiques), interrompre l'allaitement ou le médicament. Avertissez immédiatement votre médecin qui vous conseillera sur la conduite à tenir.

### COMMENT PRENDRE AMOXICILLINE 500mg, gélule ? Posologie :

Cette forme en gélule est réservée à l'adulte et à l'enfant de plus de 6 ans (voir Précautions d'emploi).

DANS TOUS LES CAS SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DE VOTRE MÉDECIN.

Les doses prescrites peuvent varier en fonction de la pathologie.

A titre indicatif :

- chez l'adulte : 1 g à 6 g par jour,

- chez l'enfant : 25 mg/kg à 150 mg/kg par jour.

Cas particulier du traitement de certaines angines :

- chez l'adulte : 2 g/jour en 2 prises,

- chez l'enfant de plus de 30 mois : 50 mg/kg/jour en 2 prises, pendant 6 jours.

La posologie doit être adaptée en cas d'insuffisance rénale.

### Fréquence d'administration

2 à 3 prises par jour.

### Mode d'administration

Voie orale.

Les gélules doivent être avalées, telles quelles, sans les ouvrir, avec un verre d'eau.

Ce médicament peut être pris indifféremment à jeun, avant, pendant ou après les repas

### Durée de traitement

Pour être efficace, ce médicament doit être utilisé régulièrement, aux doses prescrites, et aussi longtemps que votre médecin vous l'aura conseillé.

### QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ?

**Les effets plus fréquemment observés :** candidose, diarrhées, selles molles, nausées.

**Les effets peu fréquemment observés :** prurit (démangeaisons), urticaire, vomissements

**Les effets très rarement observés :** leucopénie réversible (baisse plus ou moins importante du nombre de globules blancs dans le sang), neutropénie réversible (baisse de certains globules blancs : neutrophiles dans le sang), agranulocytose réversible (chute importante du nombre de certains globules blancs dans le sang), thrombocytopénie réversible (baisse du nombre de plaquettes dans le sang), anémie hémolytique réversible (par destruction des globules rouges), allergie généralisée (dont choc allergique), maladie sérique (éruption cutanée avec fièvre et douleurs articulaires), vascularite allergique (inflammation des petits vaisseaux sanguins) (voir Mises en garde spéciales : Précautions d'emploi), convulsions, colite pseudomembraneuse (inflammation de l'intestin avec diarrhée et/ou douleurs abdominales), colite hémorragique (inflammation de l'intestin avec diarrhée et/ou saignements), hépatite, jaunisse.

**Très Rare :** autres réactions cutanées sévères, notamment : changement de la couleur de la peau, bosse sous la peau, cloques, pustules, peau qui pèle, rougeurs, douleurs, démangeaisons, desquamation. Ces symptômes peuvent s'accompagner de fièvre, de maux de tête et courbatures. Symptômes de type grippal accompagnés d'une éruption cutanée, de fièvre, de ganglions enflés, et de résultats anormaux des tests sanguins [dont une augmentation des globules blancs (éosinophilie) et des enzymes hépatiques] [syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS)].

**Des cas de :** vertiges, augmentation modérée et sans signes cliniques des transaminases (enzymes du foie), éosinophilie (augmentation de certains globules blancs dans le sang), allergies pouvant se manifester de façon plus ou moins grave : urticaire, oedème de Quincke (brusque gonflement du visage et du cou), gêne respiratoire (voir Mises en garde spéciales; Précautions d'emploi), néphrite interstitielle (maladie inflammatoire des reins) et cristallurie (présence de cristaux dans les urines) ont été signalés.

### CONDITIONS DE CONSERVATION :

Ne pas utiliser après la date de péremption (durée de vie : 3 ans).

Entreposer en dessous de 25° C.

Mise à jour : 10-2017

## LABORATOIRE BAILLY - CREAT

Chemin de Nuisement - Z.I des 150 Arpents  
28500 Vernouillet (France)