

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice. Vous pouvez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autre question, si vous avez un doute, demandez plus de information SVP à votre médecin ou pharmacien.
- Cette médicament vous a été personnellement prescrite. Ne le donnez jamais à quelque un d'autres, même en case de symptômes identiques cela pourrait lui être nocif.

Fangid kit

Un kit de Clotrimazole Comprimé Vaginale USP 100mg & Clotrimazole Crème BP 1%

Clotrimazole Comprimé Vaginale

COMPOSITION:

Chaque comprimé vaginale contient:
Clotrimazole USP 100 mg
Excipients q.s.

Clotrimazole Crème BP

COMPOSITION:

Clotrimazole BP 1% p/p
Base de miscible dans à l'eau q.s.

CLASSIFICATION PHARMACOLOGIQUE:

Fongicides

Action pharmacologique:

Clotrimazole est un antifongique à large spectre et a une action fongicide sur les espèces de Candida.

INDICATIONS:

Ovules vaginale: Pour le soulagement des démangeaisons vaginales, sensation de brûlure et de décharge associées aux infections vaginales par voie vaginale (candidose vaginale).

Due à l'espèce candida vaginite.

Crème topique: Infections des grandes lèvres et les zones adjacentes, ainsi que l'inflammation du gland et le prépuce du partenaire sexuel causées par des champignons levures (Candida vulvite et balanite à candida).

CONTRE-INDICATIONS:

Ovules vaginaux: Hypersensibilité possible au clotrimazole.

Crème topique: Hypersensibilité possible à l'alcool clotrimazole et cétostéarylique.

AVERTISSEMENTS: (Ovules vaginaux)

- i) Ne pas utiliser par voie orale.
- ii) Utiliser uniquement si vous avez déjà eu une infection vaginale à levures diagnostiquée par un médecin et vous avez les mêmes symptômes maintenant, sinon consultez votre médecin. Ces symptômes comprennent les démangeaisons et des brûlures du vagin et parfois des pertes blanches. Pour le traitement des personnes souffrant de candidose vaginale chez la première fois la condition doit être diagnostiquée par un médecin, et l'utilisation de FANGID Vaginal ovule.
- iii) S'il n'y a pas d'amélioration dans 3 jours ou si les symptômes n'ont pas disparu en 7 jours, puis consulter un médecin comme toutes les infections vaginales sont causées par des levures.
- iv) Consulter un médecin si vous souffrez de douleurs abdominales, fièvre ou des pertes vaginales malodorantes avant ou pendant l'utilisation de ce médicament.
- v) Si les symptômes réapparaissent dans les 2 mois, consulter un médecin.
- vi) Si vous êtes enceinte ou pensez que vous mai être enceinte ou allaitant, n'utilisez pas ce médicament, sauf sur avis d'un médecin.
- vii) Ne pas utiliser chez les filles de moins de 12 ans d'âge, sauf sur l'avis d'un médecin.
- viii) Si une éruption cutanée ou d'irritation nouveau se produit, cesser l'utilisation.
- ix) FANGID ® Ovules vaginaux et Crème topique mai réduire l'efficacité et la sécurité des produits en latex, tels que les préservatifs et les diaphragmes. L'effet est temporaire et ne survient que pendant le traitement.

POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI: Ovules vaginale

En général, une dose unique de 500mg de traitement sera suffisant pour la vaginite à Candida. Sauf disposition contraire prescrite par le médecin, des ovules vaginale FANGID 100mg devrait être insérée de préférence la nuit, dans le vagin le plus profondément possible (voir instructions pour l'utilisation de l'applicateur) pendant 6 jours en continu.

Le mieux est réalisé en position allongée dos avec les jambes légèrement écartées.

Cependant, la ovules mai également être inséré par le médecin après l'examen. Si nécessaire, un deuxième traitement mai être effectuée. Il est recommandé que le traitement devra être programmé de manière à éviter la période menstruelle. Pour la prévention de la réinfection du partenaire doit être traité localement avec FANGID Crème au même moment.

Dans les cas individuels où la désintégration du ovules ne se produit pas, comme dans le vagin de sécheresse associées à la ménopause, il est recommandé que la crème vaginale Clotrimazole être utilisé.

Crème topique (Candida vulvite / Candida balanite)

FANGID Crème est appliquée à peine dans les zones touchées (organes génitaux externes de l'anus chez les femmes; gland au prépuce chez les hommes) 2-3 fois par jour et se frotta po le délai normal de traitement est de 1-2 semaines. Une petite quantité de crème est généralement suffisant pour une région de la taille d'une paume. Un traitement efficace exige que FANGID être appliquée correctement et sur une période suffisamment longue.

Le traitement topique des infections fongiques doit être poursuivi pendant environ 2 semaines après la disparition de tous les symptômes en dépit d'un rapide, une amélioration subjective, afin de prévenir une rechute.

Utilisation pendant la grossesse:

FANGID ovules vaginale devraient pas être administré aux femmes enceintes durant le premier trimestre, sauf sur avis d'un médecin. Au cours de la grossesse de la FANGID Vaginal ovules à 100 mg doit être inséré sans l'aide d'un applicateur.

EFFETS SECONDAIRES ET PRECAUTIONS:

Ovules vaginale: Des réactions locales, dont l'irritation et la gravure mai se produire. La dermatite de contact allergique n'a été rapporté. Dans le cas d'une absorption systémique, la baisse des crampes abdominales, augmentation de la fréquence urinaire ou une éruption cutanée mai se produire.

Dans des cas isolés y mai être généralisée des réactions d'hypersensibilité à des degrés de sévérité. Ces réactions mai affecter la peau (démangeaisons, rougeur), la respiration (essoufflement), la circulation (par exemple une baisse de la pression artérielle nécessitant un traitement ou même de troubles de la conscience) ou le tractus gastro-intestinal (égnausea, diarrhée).

Crème topique: N'est pas destiné à un usage ophtalmique. Des réactions locales, dont l'irritation de la peau et le brûlage mai se produire. La dermatite de contact allergique n'a été rapporté. En cas d'absorption systémique, la baisse des crampes abdominales, augmentation de la fréquence urinaire ou une éruption cutanée mai se produire.

SURDOSAGE:

Symptômes et les détails de son traitement:

Voir les effets secondaires et les précautions spéciales. En cas d'ingestion accidentelle, des troubles gastro-intestinaux et une dépression du système nerveux mai se produire. Le traitement est symptomatique.

IDENTIFICATION:

Ovules vaginale: Près de couleur blanche à jaunâtre légèrement ovules vaginal oblongue.

Crème topique: une crème blanche

PRESENTATION:

Carton Pack contenant six ovules vaginale de 100 mg, un applicateur et un tube de 15gm un crème topique.

STOCKAGE: A conserver en dessous de 30°C, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Ne pas laisser a la portée des enfants.

Date de révision : 17.4.2021

MEDNEXT
BIOTECH LIMITED

Manufactured in India/Fabriquée en Inde:

MEDNEXT BIOTECH LIMITED

Araji No.1845-46-47, Near Jain Temple,

Iswal, Udaipur-313 011 (INDIA)

www.mednextpharma.com