

200x140mm

MOXICON 0,5 %, collyre en solution

Moxifloxacin

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que MOXICON 0,5 %, collyre en solutionet dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser MOXICON 0,5 %, collyre en solution ?
3. Comment utiliser MOXICON 0,5 %, collyre en solution ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver MOXICON 0,5 %, collyre en solution ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE MOXICON 0,5 %, collyre en solution ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco thérapeutique : antibiotiques ophtalmologiques - code ATC : S01AA12

Ce médicament contient un antibiotique de la famille des quinolones : la Moxifloxacin.

Ce médicament est indiqué dans le traitement local de certaines infections de l'œil dues à des bactéries pouvant être combattues par cet antibiotique, chez l'adulte et l'enfant de plus de 1 an : conjonctivites, kératites (inflammation de la cornée d'origine bactérienne) et ulcères de la cornée.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER MOXICON 0,5 %, collyre en solution ?

N'utilisez jamais MOXICON 0,5 %, collyre en solution

Si vous êtes allergique (hypersensible) à la moxifloxacin (antibiotique de la famille des quinolones) ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissement et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser MOXICON 0,5 %, collyre en solution.

Utilisez MOXICON 0,5%, collyre en solution seulement en gouttes dans les yeux.

- Si vous présentez des réactions allergiques avec MOXICON 0,5 %, collyre en solution, arrêtez le traitement et consultez votre médecin. Les réactions allergiques peuvent varier de démangeaisons localisées ou de rougeurs cutanées à des réactions allergiques graves (réaction anaphylactique). Ces réactions allergiques peuvent se produire avec d'autres antibiotiques topiques ou systémiques de la même famille (quinolones).
- Si vous prenez un autre traitement antibiotique, y compris par voie orale, en plus de MOXICON 0,5% collyre en solution, demandez conseil à votre médecin.
- Si vos symptômes s'aggravent ou réapparaissent de manière soudaine, consultez votre médecin. Vous pouvez devenir plus sensible aux infections oculaires.
- Le port de lentilles de contact est déconseillé durant le traitement d'une infection oculaire.
- Un conservateur présent dans MOXICON 0,5 %, collyre en solution (le chlorure de benzalkonium) peut provoquer une irritation des yeux et peut également teinter les lentilles de contact souples. Si votre médecin considère que vous pouvez porter des lentilles de contact, retirez-les avant d'utiliser MOXICON 0,5 %, collyre en solution, et attendez au moins 15 minutes avant de les remettre.
- Le collyre ne doit pas être employé en injection péri ou intraoculaire.
- Ne pas toucher l'œil avec l'extrémité du flacon.
- Reboucher celui-ci soigneusement après usage.
- En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Enfants et adolescents :

MOXICON 0,5%, collyre en solution peut être administré aux enfants âgés d'un an ou plus à la même dose que celle préconisée pour les adultes.

Autres médicaments et MOXICON 0,5 %, collyre en solution

Informez votre médecin ou pharmacien si vous utilisez, avez récemment utilisé ou pourriez utiliser tout autre médicament.

MOXICON 0,5 %, collyre en solution avec des aliments et boissons

Sans objet.

Grossesse et allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament. Lui seul pourra adapter le traitement à votre état.

MOXICON 0,5 %, collyre en solution est déconseillé pendant la grossesse en raison des risques identifiés lors de l'utilisation de ce médicament par voie générale (orale ou injectable).

MOXICON 0,5 %, collyre en solution est déconseillé pendant l'allaitement.

Sportifs

Sans objet.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vous pouvez présenter une vision trouble pendant un moment après utilisation de MOXICON 0,5 %, collyre en solution. Ne conduisez pas de voiture et n'utilisez pas de machines avant que cet effet ait disparu.

MOXICON 0,5 %, collyre en solution contient du chlorure de benzalkonium.

3. COMMENT UTILISER MOXICON 0,5 %, collyre en solution ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Posologie :

Chez l'adulte et l'enfant de plus de 1 an, la dose habituelle est :

Une goutte de collyre, 3 à 8 fois par jour (selon la prescription médicale) dans l'œil malade.

Si nécessaire, la fréquence des instillations pourra être augmentée en fonction des signes cliniques, puis diminuée progressivement, par votre médecin.

Mode d'administration :

Après ouverture du bouchon, si le dispositif de sécurité du col du flacon s'est cassé, retirez-le avant d'utiliser ce produit.

N'utilisez MOXICON 0,5 %, collyre en solution que pour les yeux.

Comme pour tous les collyres, effectuez, dans l'ordre les opérations suivantes :

- a. Lavez-vous soigneusement les mains.
- b. Évitez de toucher l'œil ou les paupières avec l'embout compte-gouttes.
- c. Instillez 1 goutte de collyre dans le cul-de-sac conjonctival inférieur en regardant vers le haut et en tirant légèrement la paupière inférieure vers le bas. Si une goutte tombe à côté de votre œil, essayez à nouveau.
- d. Après l'instillation, gardez la paupière fermée, tout en en appuyant doucement sur le coin de l'œil proche du nez pendant 2 minutes. Cette mesure est utile pour limiter la quantité de médicaments qui passera dans le sang après application du collyre.
- e. L'œil fermé, essuyez proprement l'excédent.
- f. Refermez le flacon après utilisation.

Si vous utilisez un autre collyre ou une pommade ophtalmique, attendez 5 minutes entre chaque médicament. Les pommades ophtalmiques doivent être appliquées en dernier.

Durée du traitement :

5 à 15 jours.

Si vous avez utilisé plus de MOXICON 0,5 %, collyre en solution que vous n'auriez dû :

Rincez abondamment à l'eau tiède. Cependant, il n'y a pas d'effets indésirables attendus. Ne mettez pas d'autre goutte jusqu'à ce que le moment soit venu de mettre la goutte suivante.

Si vous oubliez d'utiliser MOXICON 0,5 %, collyre en solution :

Continuez votre traitement normalement. Cependant, si le moment de la dose suivante est proche, ne prenez pas la dose oubliée. N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

N'utilisez pas de dose double pour compenser la dose simple que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez d'utiliser MOXICON 0,5 %, collyre en solution :

Sans objet.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre

pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLESÉVENTUELS ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables suivants ont été observés avec MOXICON 0,5 %, collyre en solution :

•*Effets fréquents (pouvant concerner jusqu'à 1 patient sur 10) :*

Effets au niveau de l'œil : gêne oculaire, rougeur oculaire

• *Effets peu fréquents (pouvant concerner jusqu'à 1 patient sur 100) :*

Effets au niveau de l'œil : inflammation de la surface de l'œil, lésion à la surface de l'œil (cornée), altération de la vue, vision floue, rougeur de la paupière, gonflement de l'œil et de la paupière, douleur oculaire, sécheresse oculaire, écoulement oculaire, démangeaison oculaire, augmentation de la production des larmes

Effets généraux : allergie (hypersensibilité), maux de tête, urticaire, inflammation de la peau, diminution de la croissance ou du nombre de cils, démangeaisons et peau sèche.

•*Effets secondaires signalés à l'issue de l'expérience post-commercialisation et dont la fréquence est indéterminée*

Effets au niveau de l'œil : allergie de l'œil, irritation de l'œil, démangeaison des paupières

Effets généraux : réaction allergique sévère, éruption cutanée

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. COMMENT CONSERVER MOXICON 0,5 %, collyre en solution ?

- Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.
- N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur le flacon.
- A conserver à une température ne dépassant pas 30°C dans un endroit sec et frais à l'abri de la lumière.
- Ce médicament se conserve 15 jours maximum après ouverture du flacon.

6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient MOXICON0,5 %, collyre en solution

- La substance active est :Moxifloxacin..... 0,5 g  
Pour 100 ml.
- Les autres composants sont :

Chlorure de benzalkonium,édéate de sodium, chlorure de sodium, phosphate dihydrogene sodique, phosphate hydrogene disodique anhydre, hydroxyde de sodium, eau purifiée.

- Quel est le contenu de l'emballage extérieur de MOXICON 0,5 % ?  
Collyre en solution, présenté sous forme de 10 ml en flacon : boîte de 1.

Titulaire/Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché :

OLYMPEA Healthcare Pvt. Ltd. Rajasthan, India.

Fabricant:

INDIANA OPTHALMICS  
135-136-137, GIDC IND. ESTATE,  
WADHWAN CITY – 363035 DIST: SURENDRANAGAR.  
GUJARAT, INDIA

- La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est :

Juillet 2019.

AUTRES :

CONSEILS D'EDUCATION SANITAIRE

QUOI SAVOIR SUR LES ANTIBIOTIQUES ?

Les antibiotiques sont efficaces pour combattre les infections dues aux bactéries. Ils ne sont pas efficaces contre les infections dues aux virus.

Aussi, votre médecin a choisi de vous prescrire cet antibiotique parce qu'il convient précisément à votre cas et à votre maladie actuelle.

Les bactéries ont la capacité de survivre ou de se reproduire malgré l'action d'un antibiotique. Ce phénomène est appelé résistance : il rend certains traitements antibiotiques inactifs.

La résistance s'accroît par l'usage abusif ou inapproprié des antibiotiques.

Vous risquez de favoriser l'apparition de bactéries résistantes et donc de retarder votre guérison ou même de rendre inactif ce médicament, si vous ne respectez pas

- la dose à prendre,
- les moments de prise,
- et la durée de traitement.

En conséquence, pour préserver l'efficacité de ce médicament :

- ***N'utilisez un antibiotique que lorsque votre médecin vous l'a prescrit.***
- ***Respectez strictement votre ordonnance.***
- ***Ne réutilisez pas un antibiotique sans prescription médicale même si vous pensez combattre une maladie apparemment semblable.***
- ***Ne donnez jamais votre antibiotique à une autre personne, il n'est peut-être pas adapté à sa maladie.***
- ***Une fois votre traitement terminé, rapportez à votre pharmacien toutes les boîtes entamées pour une destruction correcte et appropriée de ce médicament.***