

200x140mm

OLYFRESH 5 mg/ml, Collyre en Flacon
Carmellose sodique

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, ou votre pharmacien.

Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.

Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon et dans quels cas est-il utilisé ?

2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon ?

3. Comment utiliser OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon ?

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

5. Comment conserver OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon ?

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. QU'EST-CE QUE OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

Classe pharmaco thérapeutique : Substitut lacrymal - code ATC : S01XA20

Ce médicament est utilisé pour soulager les signes d'irritation liés à la sécheresse de l'œil (quand il existe une insuffisance de larmes).

Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon ?

N'utilisez jamais OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon :

Si vous êtes allergique à la carmellose sodique ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6.

Avertissements et précautions :

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser OLYFRESH 5mg/ml, collyre en flacon.

En cas de persistance des symptômes, CONSULTEZ UN OPHTALMOLOGUE afin qu'il adapte votre traitement.

Afin d'éviter toute contamination ou possible dommage de l'œil, ne toucher pas l'œil ou toute

autre surface avec l'embout du flacon.

Un trouble visuel bref peut se produire à l'instillation du produit jusqu'à ce qu'il se répartisse uniformément à la surface de l'œil.

Autres médicaments et OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon :

En cas de traitement concomitant par un autre collyre, attendre 15 minutes entre les deux instillations et terminer par le produit le plus visqueux. OLYFRESH 5mg/ml, collyre en flacon pouvant retarder la pénétration d'autres médicaments, doit être instillé en dernier s'il est le plus visqueux.

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament.

OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en Flacon avec des aliments, boissons et de l'alcool :

Sans objet.

Grossesse et allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines :

La vision peut être brouillée pendant quelques minutes après l'instillation en fonction de la viscosité du produit. Dans ce cas, il doit être recommandé au patient de ne pas conduire ni utiliser de machines jusqu'à ce que la vision normale soit rétablie.

3. COMMENT UTILISER OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon ?

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée est de 1 goutte dans l'œil ou les yeux à traiter 2 à 4 fois par jour et jusqu'à 8 fois par jour si la sécheresse de l'œil persiste.

Mode d'administration :

Voie locale.

EN INSTILLATION OCULAIRE.

Pour une bonne utilisation du collyre, certaines précautions doivent être prises :

- *Se laver soigneusement les mains avant,*
- *Ne pas toucher l'œil ou toute autre surface avec l'embout du flacon,*
- *Ne pas utiliser le flacon si le capuchon semble cassé avant usage.*

Pour utiliser le flacon, procéder de la façon suivante :

a. *Tenir le flacon à la verticale (capuchon tête en haut). Pour ouvrir le flacon, tourner complètement la partie plate afin de rompre la soudure.*

b. *Tirer doucement la paupière inférieure vers le bas en regardant vers le haut.*

<i>Renverser le flacon et la presser légèrement pour faire tomber 1 goutte dans l'œil ou les yeux à traiter. Cligner des yeux plusieurs fois.</i>Fréquence d'administration : Répartir les instillations au cours de la journée, en fonction des besoins. Durée du traitement : Si les troubles persistent ou s'aggravent, consulter un ophtalmologiste afin qu'il adapte votre traitement. Si vous avez utilisé plus de OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon que vous n'auriez dû : Consultez votre médecin ou votre pharmacien. Si vous oubliez d'utiliser OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon : Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre. Si vous arrêtez d'utiliser OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon : Sans objet. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS ? Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Effets indésirables fréquents Ces effets indésirables peuvent concerner 1 à 9 patients sur 100 Effets sur l'œil <i>Irritation de l'œil (incluant brûlures et gêne oculaire).</i> <i>Données post-commercialisation :</i> <i>Les effets indésirables suivants ont été rapportés depuis la commercialisation du produit :</i> <i>Effets indésirables dont la fréquence est indéterminée</i> <i>Réactions allergiques (incluant gonflement de l'œil ou des paupières).</i> Ecoulement de l'œil, douleur de l'œil, formation de croûtes sur les paupières ou de résidus de produit, troubles de la vision, blessure superficielle de l'œil due au contact entre l'embout du flacon et l'œil lors de l'administration, et/ou traumatisme superficiel de la cornée vision trouble sensation de picotement, sensation d'avoir quelque chose dans l'œil, démangeaisons des yeux, œil rouge, augmentation des larmoiements. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament. 5. COMMENT CONSERVER OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon ? Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur l'emballage.	La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois. A conserver à une température ne dépassant pas 30°C dans un endroit sec et frais et à l'abri de la lumière. Après ouverture : le produit peut être conservé dans son emballage d'origine pendant 15 jours. N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez que l'emballage est endommagé, que la solution a changé de couleur ou est devenue trouble. 6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS Ce que contient OLYFRESH 5 mg/ml, collyre en flacon •La substance active est : Carmellose sodique..... 5,00 mg •Les autres composants sont : complexe oxychloro stabilisé, chlorure de sodium, chlorure de potassium, chlorure de calcium, chlorure de magnesium, eau purifiée. Quel est le contenu de l'emballage extérieur de OLYFRESH 5 mg/ml ? Collyre. Flacon de 10 ml. Titulaire/Exploitant de l'autorisation de mise sur le marché : OLYMPEA Healthcare Pvt. Ltd. Rajasthan, India. Fabricant: INDIANA OPTHALMICS 135-136-137, GIDC IND. ESTATE, WADHWAN CITY – 363035 DIST: SURENDRANAGAR. GUJARAT, INDIA La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Juillet 2019. Autres Sans objet.
---	--