

BLISS GVS PHARMA LTD.				
Product: Dolimex supp 125/250mg		Market: IMEX Pharma	Size: (L x H)225 x 205 mm	
Component: Leaflet		Artwork code: 1300XXXX	Pack Size:2X5's	
Color Shades: Black		Date of Initiation:30.09.2021	Mfg Location: BGPL (Plot 1200)	
Barcode: N.A		Substrate: 40 GSM BIBLE PAPER		
Reason for Issue: Change in text			Superceded Code: 13006274	
Designer	Ramesh			
D:\H Drive\Backup\Ramesh singh data backup For d drive\IMEX\DOLIMEX MIGRAINE Effervescent Tablets\Reg Excipients /DOLIMEX 125-250 supp LEAFLET.cdr				

NOTICE (INFORMATION DE L'UTILISATEUR) Dolimex® Suppositoires 125mg Paracétamol Dolimex® Suppositoires 250 mg Paracétamol	Comment utiliser Dolimex® Suppositoires 1. Les intestins de votre enfant doivent être vidés lors de l'administration de ce médicament. Votre enfant doit aller aux toilettes, assurez-vous qu'il le fasse avant d'administrer le suppositoire. 2. L'insertion du suppositoire sera plus facile si votre enfant est allongé sur le ventre ou sur le côté. Faites ce qui est le plus confortable pour votre enfant. 3. Lavez-vous les mains. Puis retirez l'emballage pour sortir le suppositoire. Ne pas casser le suppositoire avant son utilisation. Puis relevez-vous les mains. 4. Insérez délicatement le suppositoire dans le rectum de votre enfant la pointe en avant. 5. Essayez de maintenir votre enfant immobile pendant une ou deux minutes. 6. Si votre enfant a besoin d'un autre suppositoire, retirez un autre suppositoire de son emballage, puis insérez le dans le rectum de votre enfant comme pour le suppositoire précédent. Une fois de plus, essayez de maintenir votre enfant immobile pendant une ou deux minutes. Puis lavez-vous les mains. Si vous administrez plus de Dolimex® Suppositoires que vous ne devriez - Ne pas administrer plus de suppositoires qu'indiqué - Demandez immédiatement un avis médical en cas de surdosage, même si l'enfant semble aller bien; un effet en cas de surdosage il y a un risque d'être au foie. Votre enfant peut avoir besoin de faire une analyse de sang pour s'assurer du bon fonctionnement de son foie. Si vous oubliez d'administrer Dolimex® Suppositoires à votre enfant - Si vous oubliez d'administrer la dose de Dolimex® Suppositoires, administrez-la dès que vous y pensez ; - Toutefois n'essayez pas de prendre la prochaine dose, sautez la dose omise ; - Ne donnez pas de double dose à votre enfant (deux doses en même temps) pour compenser la dose oubliée. Si vous avez des questions sur l'utilisation de ce produit, consultez le pédiatre ou pharmacien. 4. Effets secondaires possibles Comme avec tous les médicaments, il peut y avoir des effets secondaires avec Dolimex® Suppositoires, toutefois ils ne surviennent pas chez tout le monde. Les effets secondaires suivants peuvent survenir : Commun (survient chez 1 à 10 patients sur 100) Rare (survient chez 1 à 10 patients sur 10000)) - Reactions allergiques comme gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge ; - Problèmes cutanés comme rash ou démangeaisons ; - Problèmes sanguins. Si un ou si surviennent votre enfant peut former des ecchymoses ou saigner plus facilement, ou avoir une poussée de fièvre ou des saignés dans la bouche ou la gorge. - Problèmes de foie (votre enfant peut avoir besoin de faire une prise de sang pour s'assurer du bon fonctionnement du foie). De très rares cas de réactions cutanées graves ont été signalés. 5. Comment conserver Dolimex® Suppositoires Conserver en dessous de 30°C, à l'abri de la lumière. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser après la date d'expiration indiquée sur la boîte. La date d'expiration correspond au dernier jour de ce mois. Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Ces mesures permettront de protéger l'environnement. Demandez à votre pharmacien comment vous débarrasser des médicaments inutilisés, sauf si le pédiatre vous a recommandé de les conserver. 6. Contenu de l'emballage et autres informations Ce que contient Dolimex® Suppositoires : Dolimex® Suppositoires 125 mg : Chaque suppositoire contient : Paracétamol 125mg Excipients : 6,4g Colorant : Dioude de titane Excipients à effet notoire: polyéthylène glycol Dolimex® Suppositoires 250 mg : Chaque suppositoire contient : Paracétamol 250mg Excipients : 6,4g Colorant : Dioude de titane Excipients à effet notoire: polyéthylène glycol Aspect de Dolimex® Suppositoires et contenu de la boîte Aspect : suppositoire blanc opaque en forme d'olive. Contenu de la boîte : Chaque boîte contient 5 boîtes de 5 suppositoires avec la notice. Date de révision/Publication : 10/2021. Si vous avez des questions sur ce produit ou si vous souhaitez signaler un effet indésirable contactez-nous par téléphone : +225 27 21 25 12 38. Titulaire d'exploitation ANM : IMEX PHARMA Rose Belle Building, Unit 3, Rose Belle Business Park, Mauritius. Fabriqué par : BLISS GVS PHARMA LTD. Dewan Udoy Nagar, Alipali, Palghat, Maharashtra - 401 404, INDIA.
---	--

Front