

### **1.3.2 Notice à l'intention du patient**

#### **Plasmocur®-80/640 comprimés pelliculés**

Antipaludique

#### **NOTICE D'INFORMATION AU PATIENT**

Veuillez lire l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes vous concernant.

Dihydroartémisinine + Phosphate de Pipéraquline

#### **Composition :**

Plasmocur®-80/640 est un nouveau médicament antipaludique qui contient 80 mg de Dihydroartémisinine (DHA) et 640 mg de Phosphate de Pipéraquline (PQP) par comprimé pelliculé.

Excipients à effet notoire : cochenille 35 mg et saccharose 25 mg par comprimé pelliculé.

#### Autres excipients :

Amidon, cellulose microcristalline, hypromellose 3%, carboxyméthylamidon sodique et stéarate de magnésium.

#### **Propriétés :**

Plasmocur®-80/640 est un antipaludique d'action efficace, rapide et durable sur la forme schizonte (plasmatique) du parasite qui provoque l'infestation paludéenne : le plasmodium.

Plasmocur®-80/640 est aussi spécialement efficace dans l'inhibition de la forme gamétocyte du parasite, ce qui abaisse la transmission dans un milieu clos tel que le milieu familial.

Les deux principes actifs de Plasmocur®-80/640 ont une action synergique.

#### **Indications :**

Traitement par voie orale du paludisme causé par toutes les formes de Plasmodium. Plasmocur®-80/640 est spécialement efficace dans le traitement des formes multi-résistantes de Plasmodium, surtout *Plasmodium falciparum*.

#### **Posologies et mode d'emploi :**

La boîte de Plasmocur®-80/640 boîte de 6 comprimés constitue un traitement complet de 3 jours chez les adolescents et les adultes de 36 à 80 kg. Boîte verte.

La boîte de Plasmocur®-80/640 boîte de 8 comprimés constitue un traitement complet de 3 jours chez les adultes de plus de 80 kg. Boîte bleue.


Chez le nourrisson et l'enfant de moins de 6 ans (6 mois à 6 ans/ de 5 à 17 kg), l'emploi de la forme comprimés dispersibles Plasmocur® *Dispersible* 20/160 est conseillé.

Chez l'enfant dès 6 ans/ de 17 à 36 kg, l'emploi de la forme comprimés Plasmocur®-40/320 est conseillé.

**HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO. LTD.**

No.118, Xianshan Road, Xiangyang City,  
Hubei Province, China

**PLASMOCUR® 20/160mg comprimé dispersible**  
**DIHYDROARTEMISININE+PHOSPHATE DE PIPERAQUINE**  
**MODULE 1**



Pour Plasmocur®-80/640 comprimés (boîtes de 6 et 8 comprimés), la posologie par tranche de poids (et d'âge) est la suivante :

| Poids (Age)                        | De 36 à <60 kg<br>(Enfants de plus de 14 ans et adultes < 60 kg) | Adultes et adolescents de 60 à 80 kg         | Adultes > 80 kg                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Jour 1, dose initiale              | 1.5 comprimés<br>(soit 120 mg DHA+960 mg PQP)                    | 2 comprimés<br>(soit 160 mg DHA+1280 mg PQP) | 2.5 comprimés<br>(soit 200 mg DHA+1600 mg PQP) |
| Jour 2, 24h après la dose initiale | 1.5 comprimés                                                    | 2 comprimés                                  | 2.5 comprimés                                  |
| Jour 3, 48h après la dose initiale | 1.5 comprimés                                                    | 2 comprimés                                  | 2.5 comprimés                                  |
| <b>Total</b>                       | <b>4.5 comprimés</b>                                             | <b>6 comprimés</b>                           | <b>7.5 comprimés</b>                           |

**Effets indésirables :**

Occasionnellement quelques effets gastro-intestinaux légers peuvent être observés, tels que nausées et vomissements. Ces effets ont une incidence inférieure à 6%.

**Contre-indications :**

Ne pas utiliser en cas d'allergie connue à la Dihydroartémisinine ou au Phosphate de Pipéraquline.

**Précautions d'emploi :**

L'utilisation pendant le premier trimestre de la grossesse est possible et laissée à l'appréciation du médecin traitant, qui jugera si les avantages priment sur les risques (en cas de paludisme cérébral, par exemple). Le non-passage du produit dans le lait maternel n'a pas été prouvé, son emploi est donc déconseillé en cas d'allaitement sauf, si le prescripteur estime que les avantages priment sur les risques (en cas de paludisme cérébral, par exemple).

Ce médicament contient un agent colorant azoïque (cochenille) et peut provoquer des réactions allergiques.


Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase /isomaltase (maladies héréditaires rares).

Informez le médecin ou prescripteur en cas de présence d'une autre maladie, ou de prise d'autres médicaments.

**HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO. LTD.**  
No.118, Xianshan Road, Xiangyang City,  
Hubei Province, China

**PLASMOCUR® 20/160mg comprimé dispersible**  
**DIHYDROARTEMISININE+PHOSPHATE DE PIPERAQUINE**  
**MODULE 1**

---



Ce médicament est administré sur prescription médicale. Ce médicament est inscrit sur la Liste I.

**Conservation :**

Garder hors de portée des enfants.

Conserver dans un endroit sec, toujours dans l'emballage original et à une température ambiante inférieure à 30°C.

Ne pas utiliser au-delà de la date de péremption indiquée sur la boîte.

**Présentations :**

Plasmocur®-80/640 comprimés pelliculés pour adolescents et adultes, de 36 à 80 kg: boîte de 6 comprimés sécables sous blister. Boîte verte.

Plasmocur®-80/640 comprimés pelliculés pour adultes de 80 kg: boîte de 8 comprimés sécables sous blister. Boîte bleue.

Plasmocur® existe également sous forme :

- de comprimés dispersibles Plasmocur® *Dispersible* 20/160. Cette forme est réservée aux nourrissons et aux enfants jusqu'à 6 ans.
- de comprimés pelliculés sécables Plasmocur®-40/320. Cette forme est réservée aux enfants de 17 à 36 kg.

Laboratoire exploitant : Expha Ltd., Zeinenweg 4, 8405 Winterthur-Iberg, Suisse

Laboratoire fabricant: Huazhong Pharmaceutical Co., Ltd., No.118 Xianshan Road, Xiangyang City, Hubei, P.R. Chine

**HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO. LTD.**

No.118, Xianshan Road, Xiangyang City,  
Hubei Province, China