

Notice : information de l'utilisateur VENOSMIL 200 mg gélules

Hidrosmine

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

Pour l'administration de ce médicament, suivez attentivement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Si vous ressentez des effets indésirables, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien, même s'il s'agit d'effets indésirables non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Consultez un médecin si vous vous sentez mal ou ne vous sentez pas mieux au bout de 2 semaines.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Venosmil gélules et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Venosmil gélules ?
3. Comment prendre Venosmil gélules ?
4. Éventuels effets indésirables.
5. Comment conserver Venosmil gélules.
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

1. Qu'est-ce que Venosmil gélules et dans quels cas est-il utilisé ?

Venosmil est un médicament veinotonique : il augmente le tonus veineux et la résistance des capillaires (petits vaisseaux sanguins).

Chez les adultes, Venosmil est indiqué pour le soulagement des symptômes liés à une insuffisance veineuse légère dans les membres inférieurs, comme la douleur, la sensation de lourdeur, l'oppression, les picotements et les démangeaisons dans les jambes avec des veines ou des jambes enflées.

Consultez un médecin si vous vous sentez mal ou ne vous sentez pas mieux au bout de 2 semaines.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Venosmil gélules ?

N'utilisez jamais Venosmil

- Si vous êtes allergique à l'hidrosmine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Mises en garde et précautions

Demandez l'avis de votre médecin ou pharmacien avant de prendre Venosmil gélules.

- Ne prenez pas ce médicament de manière prolongée sans surveillance médicale.

Enfants et adolescents

Ne convient pas aux enfants ou aux adolescents, sauf indication contraire de votre médecin.

Prise de Venosmil avec d'autres médicaments

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez pris récemment ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris les médicaments obtenus sans ordonnance.

Il n'existe pas d'interactions avec d'autres médicaments. Cependant, aucun autre médicament ne devrait être pris à moins qu'il n'ait été prescrit par votre médecin.

Prise de Venosmil avec des aliments

Il n'existe pas d'interactions avec les aliments.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou en période d'allaitement, si vous pensez que vous pourriez être enceinte ou prévoyez de l'être, demandez l'avis à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

Il n'existe pas de données cliniques sur Venosmil concernant les femmes enceintes exposées à l'hidrosmine. Cependant par précaution, l'utilisation de Venosmil durant la grossesse n'est pas conseillée, à moins que votre médecin considère que les bénéfices attendus l'emportent sur les risques éventuels.

Il n'existe pas de données cliniques concernant les femmes pendant l'allaitement exposées à l'hidrosmine. On ignore si l'hidrosmine est excrétée dans le lait maternel, son utilisation est donc déconseillée pendant l'allaitement.

Aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

L'influence de Venosmil sur l'aptitude à conduire ou à utiliser des machines est non existante ou négligeable.

3. Comment prendre Venosmil gélules ?

Pour l'administration de ce médicament, suivez attentivement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin. Si vous avez d'autres questions, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament est administré oralement.

Si les symptômes ne s'améliorent pas au bout de 2 semaines, arrêtez le traitement et consultez un médecin.

Le traitement peut être poursuivi avec la même dose quotidienne pendant 2 à 3 mois si votre médecin vous l'a recommandé.

Adultes

La dose recommandée de Venosmil est d'une gélule de 200 mg, 3 fois par jour, généralement à l'heure des deux repas principaux.

Enfants et adolescents

Ne convient pas aux enfants ou aux adolescents, sauf indication contraire de votre médecin.

Instructions pour la bonne administration du médicament

Une fois extraite du blister, la gélule doit être avalée directement, elle peut être accompagnée d'eau ou d'une autre boisson pour faciliter la déglutition.

Si vous avez pris plus de Venosmil que vous n'auriez dû

En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien ou rendez-vous au centre médical le plus proche.

Si vous avez oublié de prendre Venosmil gélules

Prenez la dose oubliée dès que vous vous en rappelez. Cependant, si vous deviez bientôt prendre la dose suivante, sautez la dose oubliée et prenez la gélule suivante à l'heure prévue. Ne prenez pas une dose double pour compenser la dose oubliée.

Si vous avez d'autres questions concernant l'utilisation de ce médicament, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

4. Éventuels effets indésirables.

Comme tous les médicaments, Venosmil peut entraîner certains effets indésirables, bien que tout le monde ne les ressent pas.

Les effets indésirables suivants ont été observés avec Venosmil, mais leur fréquence n'a pas pu être déterminée avec précision :

- Réactions d'hypersensibilité (allergies) au principe actif (hidrosmine) ou à l'un de ses excipients (voir rubrique 2 « Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Venosmil gélules »)
- Vertiges
- Maux de tête
- Douleur d'estomac
- Nausées
- Éruption cutanée
- Démangeaisons

Notification des effets indésirables

Si vous ressentez des effets indésirables, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Ceci inclut les effets indésirables qui ne sont pas mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le Système National de Pharmacovigilance. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

5. Comment conserver Venosmil gélules ?

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à une température inférieure à 25°C.

Ne pas utiliser Venosmil après la date de péremption qui apparaît sur la boîte après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois. Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou à la poubelle. Si vous avez d'autres questions concernant l'élimination de ce médicament et de son emballage, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien. De cette façon, vous contribuez à protéger l'environnement.

6. Contenu de l'emballage et autres informations.

Composition de Venosmil gélules

- Le principe actif est l'hidrosmine. Chaque gélule contient 200 mg d'hidrosmine.
- Les autres ingrédients (excipients) sont le stéarate de magnésium et la gélule de gélatine composée de : gélatine, érythrosine (E127), jaune de quinoléine (E104), dioxyde de titane (E171) et de l'eau.

Aspect du produit et contenu de l'emballage :

Venosmil gélules se présente dans des blisters en aluminium-PVC de 60 (6 blisters*10 gélules) ou 20 (2 blisters*10 gélules) gélules de gélatine de couleur orange contenant une fine poudre de couleur jaunâtre.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

FAES FARMA, S.A.
Máximo Aguirre, 14
48940 Leioa - ESPAGNE

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est : Juillet 2016