

LEVOX[®] 5^{mg}

Dichlorhydrate de lévécétirizine

Comprimés orodispersibles
VOIE ORALE

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit.
- Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que LEVOX[®] et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre LEVOX[®]
3. Comment prendre LEVOX[®]
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver LEVOX[®]
6. Contenu de la boîte et informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE LEVOX[®] ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Le principe actif de LEVOX[®] est le dichlorhydrate de lévécétirizine.

LEVOX[®] est un médicament antiallergique pour le traitement des symptômes associés à :

- une rhinite allergique (y compris la rhinite allergique persistante) ;
- des éruptions cutanées (urticaire).

2. CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AVANT DE PRENDRE LEVOX[®]

Ne prenez jamais LEVOX[®] :

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au dichlorhydrate de lévécétirizine ou aux antihistaminiques, ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés à la rubrique 6).
- Si vous avez une insuffisance rénale sévère (avec une clairance de la créatinine inférieure à 10 ml/min).

Mises en garde et précautions d'emploi :

Parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant de prendre LEVOX[®].

Enfants : l'utilisation de LEVOX[®] est déconseillée chez les enfants de moins de 6 ans, le comprimé orodispersible ne permettant pas d'adapter les doses.

Interactions de LEVOX[®] avec les autres médicaments :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris les médicaments obtenus sans ordonnance.

Interactions de LEVOX[®] avec les aliments, les boissons et l'alcool :

LEVOX[®] peut être pris pendant ou en dehors des repas.

La prudence est recommandée en cas d'absorption d'alcool en même temps que LEVOX[®]. Chez les patients sensibles, l'usage simultané de LEVOX[®] et d'alcool, ou d'autres substances à action centrale, peut avoir des effets sur le système nerveux central, bien qu'il ait été prouvé que la cétirizine racémique n'augmente pas les effets de l'alcool.

Grossesse et allaitement :

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou projetez d'avoir un enfant, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduite de véhicule et utilisation de machines :

Aux doses préconisées, LEVOX[®] ne devrait pas affecter votre capacité à conduire un véhicule ou à utiliser une machine. Cependant, somnolence, fatigue et épuisement ont été décrits chez certains patients traités. Par conséquent, les patients susceptibles de conduire un véhicule, ou de manipuler un outil ou une machine potentiellement dangereux, devront évaluer au préalable leur réponse au traitement.

Informations importantes concernant certains composants de LEVOX[®] :

Ces comprimés contiennent du **lactose** et du **sorbitol** (E420). Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament. Ces comprimés contiennent aussi de l'**aspartame** (E951), une source de phénylalanine contre-indiquée pour les personnes souffrant de phénylcétonurie.

3. COMMENT PRENDRE LEVOX[®]

Prenez toujours LEVOX[®] exactement comme votre médecin ou pharmacien vous l'a prescrit.

En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Posologie :

La dose recommandée pour les adultes et les enfants de plus de 6 ans est d'un comprimé par jour.

Posologie spécifique à certains patients :

- Si vous êtes atteint d'insuffisance rénale, il pourra être nécessaire de réduire la posologie. Suivant l'état de votre fonction rénale, votre médecin décidera de la dose et de la fréquence à laquelle vous devez prendre LEVOX[®].
- Si vous êtes atteint d'insuffisance hépatique, il n'y a pas lieu de modifier la posologie.
- Chez les patients atteints d'insuffisances rénale et hépatique associées, il pourra être nécessaire de réduire la posologie. Suivant l'état de votre fonction rénale, votre médecin décidera de la dose et de la fréquence à laquelle vous devez prendre LEVOX[®]. Pour les enfants, la dose sera prescrite en fonction de leur poids.

Mode d'administration :

Le comprimé orodispersible est un comprimé qui se délite rapidement dans la bouche grâce à la salive.

Il ne doit pas être mâché ni croqué. Mettre le comprimé orodispersible dans la bouche, laisser fondre puis avaler.

Le comprimé orodispersible peut être pris avec ou sans eau et avec ou sans nourriture.

Si vous avez pris plus de LEVOX[®] que vous n'auriez dû :

Si vous avez pris une quantité de LEVOX[®] supérieure à celle prescrite, consultez immédiatement votre médecin. Chez l'adulte, un surdosage peut provoquer des symptômes tels que : confusion, diarrhée, étourdissement, sensation de fatigue, maux de tête, sensation de malaise, dilatation des pupilles, démangeaisons, agitation, somnolence, endormissement, accélération des battements cardiaques, tremblements et difficultés à uriner. Les enfants peuvent montrer une certaine excitation et agitation suivies de somnolence.

Si vous oubliez de prendre LEVOX[®] :

Si vous oubliez de prendre LEVOX[®] ou si vous en prenez moins que la dose prescrite par votre médecin, ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre. Attendez l'heure de la prochaine prise et prenez la dose normale prescrite par votre médecin.

Si vous arrêtez de prendre LEVOX[®] :

Si vous arrêtez de prendre LEVOX[®] plus tôt que prévu, cela ne devrait pas avoir d'incidence autre que la possible réapparition progressive des symptômes de la maladie, sans plus de sévérité qu'avant le traitement avec ce médicament. Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, demandez plus d'informations à votre médecin ou pharmacien.

4. EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, LEVOX[®] est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants ont été utilisés pour classer les effets indésirables en fonction de leur fréquence d'apparition : très fréquents