

65x140 mm

1

ERYKAM 500

Stéarate d'Erythromycine 500 mg BP Comprimés

1. Numéro d'identification

L'érythromycine agit en pénétrant la membrane de la cellule bactérienne et en se liant de manière réversible à la sous-unité 50 S des ribosomes bactériens ou à proximité du site "P" ou site donneur, de sorte que la liaison de l'ARNt (ARN de transfert) au site donneur est bloquée. La translocation des peptides du site "A" ou accepteur vers le site "P" ou donneur est empêchée, et la synthèse protéique ultérieure est inhibée. L'érythromycine n'est efficace que contre les organismes qui se divisent activement. Le mécanisme exact par lequel l'érythromycine réduit les lésions de l'acné vulgaire n'est pas entièrement connu, mais l'effet semble être dû en partie à l'activité antibactérienne du médicament.

Les comprimés **ERYKAM 500** sont utilisés pour traiter certaines infections causées par des bactéries, telles que les infections des voies respiratoires, y compris la bronchite, la pneumonie, la maladie du légionnaire (un type d'infection pulmonaire) et la coqueluche, la diphtérie (une infection grave de la gorge), les maladies sexuellement transmissibles (MST), y compris la syphilis, et les infections de l'oreille, de l'intestin, gynécologiques, des voies urinaires et de la peau. Il est également utilisé pour prévenir la fièvre rhumatismale récurrente.

2. Les informations à connaître avant de prendre le médicament

Ne prenez pas ERYKAM 500 :

Si vous êtes allergique à l'érythromycine ou à d'autres antibiotiques macrolides tels que la clarithromycine ou l'azithromycine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans ces comprimés ;

Comprimé **ERYKAM 500** est contre-indiqué chez les patients prenant de la terfénadine, de l'astémizole, du pimoizide ou du cisapride.

Faites attention avec ERYKAM 500

L'érythromycine étant principalement excrétée par le foie, il faut donc faire preuve de prudence lors de l'administration de l'antibiotique à des patients présentant une insuffisance hépatique ou recevant des agents potentiellement hépatotoxiques.

Une dysfonction hépatique, y compris une augmentation des enzymes hépatiques et / ou une hépatite cholestatique, avec ou sans jaunisse, a été rarement rapportée avec l'érythromycine.

Des rapports suggèrent que l'érythromycine n'atteint pas le fœtus à des concentrations adéquates pour prévenir la syphilis congénitale. Les nourrissons, nés de femmes traitées avec de l'érythromycine par voie orale pendant la grossesse pour la syphilis précoce, doivent être traités avec un régime approprié de pénicilline.

Il a été signalé que l'érythromycine pouvait aggraver la faiblesse des patients atteints de myasthénie grave.

L'érythromycine interfère avec la détermination fluorométrique des catécholamines urinaires.

Comme avec d'autres antibiotiques à large spectre, des colites pseudo-membraneuses ont été rarement rapportées avec l'érythromycine.

Une rhabdomyolyse avec ou sans insuffisance rénale a été rapportée chez des patients gravement malades recevant de l'érythromycine en concomitance avec la lovastatine.

Soyez vigilant en cas de symptômes importants

Les effets secondaires les plus fréquents des préparations d'érythromycine par voie orale sont gastro-intestinaux et sont liés à la dose. Ils comprennent les nausées, les vomissements, les douleurs abdominales, la diarrhée et l'anorexie. Il peut se produire des symptômes d'hépatite, de dysfonctionnement hépatique et/ou des résultats anormaux des tests de la fonction hépatique.

Autres médicaments et ERYKAM 500

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament, y compris des médicaments obtenus sans ordonnance.

ERYKAM 500 ne doit pas être utilisé avec :

ERYKAM 500 est contre-indiqué chez les patients prenant de la terfénadine, de l'astémizole, du pimoizide ou du cisapride.

Grossesse et Allaitement

Grossesse

Il n'y a aucune preuve de tératogénicité ou de tout autre effet indésirable sur la reproduction chez les rats femelles ayant reçu de l'érythromycine base (jusqu'à 0,25 % du régime alimentaire) avant et pendant l'accouplement, pendant la gestation et jusqu'au sevrage de deux portées successives. Pourtant, il n'existe pas d'étude adaptée et standardisée chez la femme enceinte. Étant donné que les études sur la reproduction chez l'animal ne permettent pas toujours de prédire la réponse chez l'humain, ce médicament ne doit pas être utilisé pendant la grossesse qu'en cas de nécessité absolue.

2

Allaitement

L'érythromycine est excrétée dans le lait maternel. La prudence est de mise lorsque l'érythromycine est administrée à une femme allaitante.

Conduite et utilisation de machines :

Sans objet

3. Comment prendre ERYKAM 500

Voie : Orale

Mode d'administration :

Prenez toujours ce médicament exactement comme votre médecin ou votre pharmacien vous l'a dit. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Dosage:

Adultes: La dose habituelle est une tablette de 500 mg toutes les 12 heures.

Si vous avez pris plus d'ERYKAM 500 que vous n'auriez dû

Si vous avez oublié de prendre une dose du médicament en une journée que votre médecin vous l'a conseillé, ou qu'un enfant prend une partie du médicament par erreur, contactez votre médecin ou rendez-vous immédiatement au service des urgences de l'hôpital le plus proche. Un surdosage d'**ERYKAM 500** peut entraîner une perte auditive temporaire, des nausées, des vomissements et des diarrhées.

Traitement : lavage gastrique, mesures générales de soutien.

Si vous oubliez de prendre ERYKAM 500

Si vous avez oublié de prendre une dose du médicament, prenez-la dès que vous vous en rendez compte. Ne dépassez pas la dose quotidienne indiquée par votre médecin. Pour toute autre question sur l'utilisation de ce produit, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

4. Effets indésirables

Comme tous les médicaments, **ERYKAM 500** peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets secondaires les plus courants sont :

- Urticaire, respiration difficile, gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge
- Diarrhée aqueuse ou sanglante
- Maux de tête accompagnés de douleurs thoraciques et de vertiges graves, évanouissements, de battements de cœur rapides ou battants
- Problèmes auditifs (rare)
- Problèmes de foie - nausées, douleurs à l'estomac supérieur, démangeaisons, sensation de fatigue, perte d'appétit, urines foncées, selles de couleur argileuse, icctère (jaunissement de la peau ou des yeux)
- Réactions cutanées graves - fièvre, maux de gorge, gonflement du visage ou de la langue, sensation de brûlure dans les yeux, douleurs cutanées, suivies d'une éruption cutanée rouge ou violette qui s'étend (surtout sur le visage ou le haut du corps) et provoque des cloques et une desquamation.

Si vous constatez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci inclut tous les effets secondaires possibles non mentionnés dans cette notice.

5. Préservez

- À conserver dans un endroit sec, à l'abri de la lumière, à une température inférieure à 30°C.
- Garder tous les médicaments hors de la portée des enfants.
- Ne pas utiliser **ERYKAM 500** après la date de péremption mentionnée sur l'emballage.
- La date de péremption correspond au dernier jour de ce mois.
- N'utilisez pas ce médicament s'il y a des signes visibles de détérioration.
- Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Consultez votre pharmacien pour connaître le circuit d'élimination. Ces mesures permettent de protéger l'environnement.
- Lire attentivement la notice avant emploi.

6. Informations complémentaires

Ce que contient ERYKAM 500 :

- La substance active est le stéarate d'Erythromycine BP équivalent à 500 mg d'Erythromycine.
- Excipients q.s.

Qu'est-ce que ERYKAM 500 et contenu de l'emballage extérieur

10 Comprimés sous blister ALU-ALU.2 blisters sont emballées dans un carton avec la notice d'emballage.

Fabriqué par :

IMPULSE

J-201, J-202/1, MIDC Tarapur,
Boisar, Dist-Palghar-401506,
Maharashtra State, India.
Email : info@kamlagroup.co.in
Website : www.kamlagroup.co.in