

Size 184x146 mm

Sidegra 100

Comprimés de Citrate de Sildenafil

COMPOSITION:

Sidegra 100

Chaque comprimé pelliculé contient:

Citrate de Sildenafil

Équivalent à Sildenafil 100 mg

Excipients q.s.

PRÉSENTATION:

Strip de 4 comprimés.

TITULAIRE / EXPLOITANT :

IMPACT HEALTHCARE PVT. LTD.
210, MASC, L.S.C. NO-7, Sector-9,
Rohini, Delhi-110085, India.

FABRIQUÉ PAR :

IMPACT HEALTH CARE PVT. LTD.
At : Kishanpura, Guru Majra Road, Baddi,
Teh. Nalagarh, Distt. Solan (H.P.) INDIA

Lisez cet entier feuillet soigneusement avant que vous commenciez à prendre ce médicament.

- * Gardez ce feuillet. Vous pouvez avoir besoin de le lire encore.
- * Si vous avez toute autre question, demandez SVP à votre médecin ou pharmacien.
- * Si tout des effets secondaires deviennent sérieux, ou vous notez des effets secondaires non énumérés dans ce feuillet, dites-les SVP à votre médecin ou pharmacien.
- * Ne partagez pas ce médicament avec d'autres, puisqu'ils peuvent avoir un problème qui ne soit pas

effectivement traité par cette drogue, ou ils peuvent avoir une condition qui soit compliquée par cette drogue. N'employez pas la drogue après la date de péremption, imprimée sur le paquet.

Que SIDEGRA-100 contient-il ?

Sidegra-100 contient de 100mg de citrate de sildenafil comme le composant actif.

Pour quoi Sidegra-100 est-il employé ?

Sidegra est employé pour traiter le dysfonctionnement érectile (ED) des hommes, qui est connu également sous le nom de l'impuissance. Dans ce cas l'homme ne peut pas avoir la érection appropriée ou ne peut pas maintenir son pénis dur pour longtemps, pendant l'activité sexuelle

Comment Sidegra-100 fonctionne-t-il ?

Sidegra-100 appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de phosphodiesterase type 5 (PDE 5). Il fonctionne en aidant des vaisseaux sanguins de pénis à détendre, permettant au sang de couler à travers de pénis pendant l'excitation sexuelle. Il n'aidera pas à obtenir une érection en l'absence de la stimulation sexuelle. Il ne devrait pas être pris si la personne n'est pas touché de dysfonctionnement érectile

Quand l'on ne devrait pas prendre Sidegra-100?

Sidegra-100 ne devrait pas être pris si vous prenez n'importe quelle drogue de nitrate telle que le médicament de nitrate pour la maladie cardiaque, la nitroglycérine pour l'angine, ou n'importe quel donneur d'oxyde nitrique tel que la drogue de partie, nitrate amylique (« poppers ») parce que la combinaison puisse provoquer une chute abrupte de pression artérielle et

puisse prouver mortel en causant la mort.

Si vous prenez un inhibiteur de protéase de VIH (par exemple, ritonavir, saquinavir), ne prenez pas plus qu'une dose de 25mg de sildenafil dans une période de 48 heures.

Si vous prenez plus qu'une dose de 25mg de sildenafil et prenez également un médicament alpha-bloquant (par exemple, doxazosine, prazosine, terazosine) pour différentes conditions (par exemple, prostatémégalie), prenez ces médicaments séparément par plus de 4 heures.

Si vous êtes allergique (hypersensible) au sildenafil ou à toute ingrédients de Sidegra-100.

Si vous avez la maladie cardiaque, l'affection hépatique ou la maladie rénale.

Dans tels cas, demandez le conseil de votre médecin ou pharmacien.

Ce document ne contient pas toutes les interactions possibles. Par conséquent, avant d'employer ce produit, dites votre médecin ou pharmacien de tous les produits que vous employez. Gardez une liste de tous vos médicaments avec vous, et partagez la liste avec votre médecin et pharmacien.

Quelles précautions devriez-vous prendre tout en prenant Sidegra-100 ?

Tout en prenant **Sidegra -100** évitez

l'alcool comme il peut augmenter certains des effets secondaires.

Essayez d'éviter même d'employer d'autres médecines pour traiter l'impuissance sans consulter votre médecin. Les médecins conseillent des hommes lesquels ont les problèmes de santé suivants de ne pas employer **Sidegra** ou de ne pas l'employer avec l'ajustement de dosage ou les essais spéciaux pendant le traitement

Size 184x146 mm

- * Cardiopathie ou des problèmes de rythme cardiaque ou passé d'une crise cardiaque ou troubles de rythme cardiaque hypotension artérielle ou
- * hypertension artérielle
- * Affection hépatique
- * Maladie rénale
- * Drépanocytose, myélome multiple, ou leucémie
- * trouble hémostatique tel que l'hémophilie;
- * Ulcère à l'estomac
- * Déformation physique du pénis

Qui ne devrait pas prendre Sidegra-100 ?

Sidegra-100 ne devrait pas être donné aux ceux qui ont moins de 18 ans.

Il ne devrait pas être pris par des femmes.

Quels sont les effets secondaires de Sidegra-100 ?

Les effets secondaires sont plus probables avec une dose plus élevée. Arrêtez l'utilisation de Sidegra-100 si vous avez quelconque des effets secondaires importants

- * la douleur thoracique ou battements de coeur irréguliers et même la crise cardiaque
- * Nausée, sudation, sentiment général d'être malade;
- * tuméfaction de mains, des chevilles ou feet
- * érection douloureuse de pénis qui dure 4 heures ou plus.
- * étourdissement

* Vision bleuâtre provisoire ou vision floue,
Rarement, le sildenafil puisse provoquer des problèmes d'audition soudains, ou la sonnerie dans les oreilles. Demander le conseil médical immédiatement si ces effets se produisent. Les effets secondaires communs comme ceux énumérés ci-dessous ne nuiront pas à votre corps ou à la période d'amour. Par conséquent

vous pouvez prolonger son utilisation.

- * Rougeur dans le visage, le cou, ou la poitrine
- * nez fâché
- * Mal de tête
- * trouble d'estomac
- * Douleur de dos.

Comment prendre Sidegra-100 ?

Il est recommandé de prendre Sidegra-100 selon le conseil de votre médecin. La dose habituelle pour commencer est de 100 mg qui, l'on prendre une fois par jour entre 30 minutes et 4 heures avant de l'acte sexuel. Si vous avez des érections balky - et c'est parfaitement normal pour les hommes qui ons plus de 45 ans, alors vous pourriez décider si vous voulez employer le médicament pour assurer d'érection. Si oui, vous pouvez obtenir de bons résultats avec la moitié de la dose type - 25 mg de Sidegra au lieu de la dose habituel de 100 mg.

Si vous estimez que l'effet de Sidegra-100 est trop fort ou trop faible, demandez le conseil de votre médecin ou pharmacien.

Sidegra-100 aidera seulement à obtenir une érection si vous êtes sexuellement stimulé. Le temps que Sidegra-100 prend pour fonctionner ne varie de personne à personne, mais il prend normalement entre une demi-heure et une heure. Cela prend plus longtemps pour fonctionner si l'on le prend après avoir trop mangé. Si Sidegra-100 n'aide pas à atteindre l'érection ou si l'érection ne dure pas assez longtemps vous pour accomplir des rapports sexuels vous devriez consulter votre médecin.

SURDOSAGE

Si vous sentez que vous avez pris un surdosage de

médicament prescrit alors demander le conseil médical immédiatement. Les symptômes d'un surdosage de Sidegra-100 peuvent inclure la douleur thoracique, la nausée, le battement de coeur irrégulier, et l'étourdissement

Comment stocker Sidegra-100 ?

Stockez dans un endroit sec au-dessous de 30°C. Protégez contre l'humidité.

Gardez à l'abri des enfants

CONSERVATION :

Conserver à moins de 30°C,
Protéger de la lumière et de l'humidité

CONDITION DE DÉLIVRANCE : LISTE I
CONDITION NON SOUMISE A PRESCRIPTION
MÉDICALE

Lic./Numéro de licence de fabrication: L/14/1505/MNB