

# FRONT

Package leaflet: Information for the patient	
<b>COZEE 90/120 tablets</b> (Etoricoxib)	Rheumatoid arthritis The recommended dose is 60 mg once a day, increased to a maximum of 90 mg once a day if needed.
<b>Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Keep this leaflet. You may need to read it again.</li><li>- If you have any further questions, ask your doctor, pharmacist or nurse.</li><li>- This medicine has been prescribed for you only. Do not pass it on to others. It may harm them, even if their signs of illness are the same as yours.</li><li>- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.</li></ul>	Ankylosing spondylitis The recommended dose is 60 mg once a day, increased to a maximum of 90 mg once a day if needed.
<b>What is in this leaflet</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. What Cozee tablets are and what they are used for</li><li>2. What you need to know before you take Cozee tablets</li><li>3. How to take Cozee tablets</li><li>4. Possible side effects</li><li>5. How to store Cozee tablets</li><li>6. Contents of the pack and other information</li></ol>	Acute pain conditions Cooze tablets should be used only for the acute painful period.
<b>1. What Cozee tablets are and what they are used for</b> <p>The name of your medicine is Cozee film-coated tablets (referred to as Cozee tablets throughout this leaflet). The active substance etoricoxib which belongs to a group of medicines called selective COX-2 inhibitors. These belong to a family of medicines called non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).</p> <p>Cozee tablets helps to reduce the pain and swelling (inflammation) in the joints and muscles of people 16 years of age and older with osteoarthritis, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and gout.</p> <p>Cozee is also used for the short term treatment of moderate pain after dental surgery in people 16 years of age and older.</p>	Gout The recommended dose is 120 mg once a day which should only be used for the acute painful period, limited to a maximum of 8 days treatment.
<b>What is osteoarthritis?</b> <p>Osteoarthritis is a disease of the joints. It results from the gradual breakdown of cartilage that cushions the ends of the bones. This causes swelling (inflammation), pain, tenderness, stiffness and disability.</p>	Postoperative dental surgery pain The recommended dose is 90 mg once daily, limited to a maximum of 3 days treatment.
<b>What is rheumatoid arthritis?</b> <p>Rheumatoid arthritis is a long term inflammatory disease of the joints. It causes pain, stiffness, swelling, and increasing loss of movement in the joints if affects. It may also cause inflammation in other areas of the body.</p>	<b>People with liver problems</b> If you have mild liver disease, you should not take more than 60 mg a day. If you have moderate liver disease, you should not take more than 30 mg a day.
<b>What is gout?</b> <p>Gout is a disease of sudden, recurring attacks of very painful inflammation and redness in the joints. It is caused by deposits of mineral crystals in the joint.</p>	<b>Use in children and adolescents</b> Cooze tablets should not be taken by children or adolescents under 16 years of age.
<b>What is ankylosing spondylitis?</b> <p>Ankylosing spondylitis is an inflammatory disease of the spine and large joints.</p>	<b>Elderly</b> No dose adjustment is necessary for elderly patients. Caution should be exercised in elderly patients.
<b>2. What you need to know before you take Cozee</b> <p><b>Do not take Cozee:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- if you are allergic to Cozee tablets or any of the other ingredients of this medicine (listed in section 6).</li><li>- if you are allergic to non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), including acetylsalicylic acid and COX-2 inhibitors (see Possible Side Effects, section 4).</li><li>- if you have a current stomach ulcer or bleeding in your stomach or intestines.</li><li>- if you have serious kidney disease.</li><li>- if you have serious kidney disease.</li><li>- if you are or could be pregnant or are breast-feeding (see 'Pregnancy, breast-feeding and fertility').</li><li>- if you are under 16 years of age.</li><li>- if you have inflammatory bowel disease, such as Crohn's Disease, ulcerative colitis, or colitis.</li><li>- if you have high blood pressure that has not been controlled by treatment (check with your doctor or nurse if you are not sure whether your blood pressure is adequately controlled).</li><li>- if your doctor has diagnosed you with heart problems including heart failure (moderate or severe types), angina (chest pain).</li><li>- if you have had a heart attack, bypass surgery, peripheral arterial disease (poor circulation in legs or feet due to narrow or blocked arteries).</li><li>- if you have had any kind of stroke (including mini-stroke, transient ischaemic attack or TIA). Cozee tablets may slightly increase your risk of heart attack and stroke and this is why it should not be used in those who have already had heart problems or stroke.</li><li>- if you think any of these are relevant to you, do not take the tablets until you have consulted your doctor.</li></ul>	<b>Method of administration</b> Cooze tablets is for oral use. Take the tablets once a day. Cozee tablets can be taken with or without food.
<b>Warnings and precautions</b> <p>Talk to your doctor or pharmacist before taking Cozee tablets if:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- you have a history of stomach bleeding or ulcers.</li><li>- you are dehydrated, for example by a prolonged bout of vomiting or diarrhoea.</li><li>- you have swelling due to fluid retention.</li><li>- you have a history of heart failure, or any other form of heart disease.</li><li>- you have a history of high blood pressure. Cozee tablets can increase blood pressure in some people, especially in high doses, and your doctor will want to check your blood pressure from time to time.</li><li>- you have any history of liver or kidney disease.</li><li>- you are being treated for an infection. Cozee tablets can mask or hide a fever, which is a sign of infection.</li><li>- you have diabetes, high cholesterol, or are a smoker. These can increase your risk of heart disease.</li><li>- you are a woman trying to become pregnant.</li><li>- you are over 65 years of age.</li></ul>	<b>If you forget to take Cozee tablets</b> La polyarthrite rhumatoïdale est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale et des grosses articulations .
<p>Cozee tablets works equally well in older and younger adult patients. If you are over 65 years of age, your doctor will want to appropriately check a check on you. No dosage adjustment is necessary for patients over 65 years of age.</p>	<b>If you take more Cozee tablets than you should</b> If you should never take more tablets than the doctor recommends. If you do take too many Cozee tablets, you should seek medical attention immediately.
<b>Children and adolescents</b> <p>Do not give this medicine to children and adolescents under 16 years of age.</p>	<b>If you have further questions on the use of this medicine, ask your doctor or pharmacist.</b>
<b>Other medicines and Cozee tablets</b> <p>Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. In particular if you are taking any of the following medicines, your doctor may want to monitor you to check that your medicines are working properly, once you start taking Cozee tablets:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- medicines that thin your blood (anticoagulants), such as warfarin</li><li>- rifampicin (an antibiotic)</li><li>- methotrexate (a drug used for suppressing the immune system, and often used in rheumatoid arthritis)</li><li>- ciclosporin or tacrolimus (drugs used for suppressing the immune system)</li><li>- lithium (a medicine used to treat some types of depression)</li><li>- medicines used to help control high blood pressure and heart failure called ACE inhibitors and angiotensin</li><li>- diuretics (water tablets)</li><li>- digoxin (a medicine for heart failure and irregular heart rhythm)</li><li>- minoxidil (a drug used to treat high blood pressure)</li><li>- salbutamol tablets or oral solution (a medicine for asthma)</li><li>- birth control pills (the combination may increase your risk of side effects)</li><li>- hormone replacement therapy (the combination may increase your risk of side effects)</li><li>- acetylsalicylic acid, the risk of stomach ulcers is greater if you take Cozee tablets with acetylsalicylic acid.</li><li>- acetylsalicylic acid for prevention of heart attack or stroke.</li><li>- Cozee tablets can be taken with low-dose acetylsalicylic acid. If you are currently taking low-dose acetylsalicylic acid to prevent heart attacks or stroke, you should not stop taking acetylsalicylic acid until you talk to your doctor</li><li>- acetylsalicylic acid and other non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs).</li><li>- do not take high-dose acetylsalicylic acid or other anti-inflammatory medicines while taking Cozee tablets.</li></ul>	<b>4. Possible side effects</b> Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them.
<p>Cozee tablets with food and drink The onset of the effect of Cozee tablets may be faster when taken without food.</p>	<b>5. How to store Cozee tablets</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Store in the original package.</li><li>- Store below 30°C. Protect from light &amp; moisture.</li><li>- Keep this medicine out of the sight and reach of children.</li><li>- Do not take Cozee tablets after the expiry date which is stated on the carton after EXP. The expiry date refers to the last day of that month.</li></ul> Do not throw away any medicines via wastewater or household waste. Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use.
<b>Pregnancy, breast-feeding and fertility</b> <p>If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.</p> <p><b>Pregnancy</b> Cooze tablets must not be taken during pregnancy. If you are pregnant or think you may be pregnant or are planning to have a baby, do not take the tablets. If you become pregnant, stop taking the tablets and consult your doctor. Consult your doctor if you are unsure or need more advice.</p> <p><b>Breast-feeding</b> It is not known if Cozee tablets is excreted in human milk. If you are breast-feeding, or planning to breast-feed, consult your doctor before taking Cozee tablets. If you are taking Cozee tablets, you must not breast-feed.</p> <p><b>Fertility</b> Cooze tablets is not recommended in women attempting to become pregnant.</p>	<b>6. Contents of the pack and other information</b> <p><b>What Cozee 90 tablets contains</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- The active substance is etoricoxib. Each film-coated tablets contains 90 mg etoricoxib.</li><li>- The other ingredients are Maize Starch, Dibasic Calcium Phosphate, Methyl paraben Sodium, Magnesium stearate, Purified Talc, Sodium Starch Glycolate, Propylparaben Sodium, Povidone K-30, Aerosil (Colloidal anhydrous silica)</li></ul> <p>- The film coat contains AF COAT, Colour Quinoline Yellow Lake, Iso propyl alcohol &amp; Methylene Chloride</p> <p><b>What Cozee 120 tablets contains</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- The active substance is etoricoxib. Each film-coated tablets contains 120 mg etoricoxib.</li><li>- The other ingredients are Maize Starch, Dibasic Calcium Phosphate, Methyl paraben Sodium, Propylparaben Sodium, Purified Talc, Magnesium stearate, Sodium Starch Glycolate, Povidone K-30, Aerosil (Colloidal anhydrous silica) &amp; Microcrystalline Cellulose</li></ul> <p>- The film coat contains AF COAT, Titanium Dioxide, Colour Tartrazine Lake, Iso propyl alcohol &amp; Methylene Chloride</p>
<b>Driving and using machines</b> <p>Dizziness and sleepiness have been reported in some patients taking Cozee tablets.</p> <p>Do not drive if you experience dizziness or sleepiness. Do not use any tools or machines if you experience dizziness or sleepiness.</p>	<b>Manufactured in India by :</b> ZEE LABORATORIES LIMITED Behind 47, Industrial Area, Poanta Sahib-173025, India
<b>3. How to take Cozee tablets</b> <p>Always take this medicine exactly as your doctor has told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.</p> <p>Do not take more than the recommended dose for your condition. Your doctor will want to discuss your treatment from time to time. It is important that you use the lowest dose that controls your pain and you should not take Cozee tablets for longer than necessary. This is because the risk of heart attacks and strokes might increase after prolonged treatment, especially with high doses.</p> <p>There are different strengths available for this medicinal product and depending on your disease your doctor will prescribe the tablet strength that is appropriate for you.</p> <p>The recommended dose is:</p> <p>Osteoarthritis The recommended dose is 30 mg once a day, increase to a maximum of 60 mg once a day if needed.</p>	

# BACK

Notice: Information du patient	
<b>COZEE 90/120 comprimés</b> (Étoricoxib)	Il existe différents dosages disponibles pour ce médicament et en fonction de votre En cas de maladie grave, votre médecin vous prescrira la force du comprimé qui vous conviendra.
<b>Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Garder cette notice. Tu auras peut-être besoin de la relire.</li><li>- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.</li><li>- Ce médicament n'a été prescrit que pour vous. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur être nocif, même si leurs signes de maladie sont identiques aux vôtres.</li><li>- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Ceci inclut tout effet indésirable non mentionné dans cette notice. Voir section 4.</li></ul>	La dose recommandée est: Arthrose La dose recommandée est de 30 mg une fois par jour, augmentez à maximum à 60 mg une fois par jour, si besoin.
<b>Qu'est-ce que dépliant</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Qu'est-ce que les comprimés Cozee et dans quel cas sont-ils utilisés?</li><li>2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre les comprimés Cozee?</li><li>3. Comment prendre les comprimés de Cozee</li><li>4. Effets secondaires possibles</li><li>5. Comment conserver les comprimés Cozee</li><li>6. Contenu de l'emballage et autres informations</li></ol>	La polyarthrite rhumatoïde La dose recommandée est de 60 mg une fois par jour, augmentée à un maximum de 90 mg une fois par jour, si besoin.
<b>Qu'est-ce que la goutte?</b> <p>La goutte est une maladie d'attaques récurrentes d'inflammation et de rougeur très douloureuses les articulations. Elle est causée par des dépôts de cristaux minéraux dans le joint.</p>	Spondylarthrite ankylosante La dose recommandée est de 60 mg une fois par jour, augmentée à 90 mg au maximum une fois par jour si besoin.
<b>Qu'est-ce que la polyarthrite rhumatoïde?</b> <p>La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire à long terme des articulations. Ça fait mal, raidir, gonfler et perte croissante de mouvement dans les articulations qu'il affecte. Il peut aussi provoquer une inflammation dans d'autres zones du corps.</p>	Conditions de douleur aiguë Les comprimés de Cozee ne doivent être utilisés que pendant la période douloureuse aiguë.
<b>Qu'est-ce que la goutte?</b> <p>La goutte est une maladie d'attaques récurrentes d'inflammation et de rougeur très douloureuses les articulations. Elle est causée par des dépôts de cristaux minéraux dans le joint.</p>	Goutte La posologie recommandée est de 120 mg une fois par jour, qui ne doit être utilisé que pour le traitement aigu période douloureuse, limitée à 8 jours de traitement.
<b>Qu'est-ce que la spondylarthrite ankylosante?</b> <p>La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire de la colonne vertébrale et des grosses articulations .</p>	Douleur postopératoire de chirurgie dentaire La dose recommandée est de 90 mg une fois par jour, limitée à 3 jours de traitement.
<b>2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Cozee?</b> <p><b>Ne prenez pas Cozee:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- si vous êtes allergique aux comprimés de Cozee ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (numérotés à la section 6).</li><li>- si vous êtes allergique aux anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), y compris:<ul style="list-style-type: none"><li>- Acide acétylsalicylique et inhibiteurs de la COX-2 (voir Effets secondaires possibles, Section 4).</li><li>- si vous avez actuellement ou au cours de saignements dans l'estomac ou les intestins.</li><li>- si vous avez une maladie grave du foie.</li><li>- si vous avez une maladie rénale grave.</li><li>- si vous êtes ou pourriez être enceinte ou allaiter (voir 'Grossesse, allaitement et fertilité').</li><li>- si vous avez moins de 16 ans.</li><li>- si vous avez une maladie inflammatoire de l'intestin, telle que la maladie de Crohn</li><li>- Maladie, colite ulcéreuse ou colite.</li><li>- si vous avez une pression artérielle élevée non contrôlée par un traitement (vérifiez auprès de votre médecin ou votre infirmière si vous n'êtes pas sûr que votre tension artérielle est adéquate contrôlée).</li><li>- si votre médecin vous a diagnostiqué des problèmes cardiaques, y compris une insuffisance cardiaque ou types sévères), l'angine (douleur à la poitrine)</li><li>- si vous avez une crise cardiaque, un pontage, une maladie artérielle périphérique circulation dans les jambes ou les pieds en raison d'artères étroites ou obstruées).</li><li>- si vous avez eu un accident vasculaire cérébral (y compris un mini-accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire) ou TIA).</li></ul></li><li>- si vous avez eu un accident vasculaire cérébral (y compris un mini-accident vasculaire cérébral, un accident ischémique transitoire) ou TIA).</li></ul> Les comprimés de Cozee peuvent augmenter légèrement votre risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral et c'est pourquoi il ne devrait pas être utilisé chez ceux qui ont déjà eu des problèmes cardiaques ou accident vasculaire cérébral.	Personnes ayant des problèmes de foie Si vous avez une maladie hépatique légère, vous ne devez pas prendre plus de 60 mg par jour. Si vous avez une maladie du foie modérée, vous ne devez pas prendre plus de 30 mg par jour.
<b>3. Comment prendre les comprimés de Cozee</b> <p>Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien si vous n'êtes pas sûr.</p>	<b>Utilisation chez les enfants et les adolescents</b> Les comprimés de Cozee ne doivent pas être pris par des enfants ou des adolescents de moins de 16 ans.
<b>4. Effets secondaires possibles</b> <p>Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.</p> <p><b>Si vous développez l'un de ces signes, vous devez arrêter les comprimés de Cozee et consulter votre médecin, immédiatement (voir Ce que vous devez savoir avant de prendre Cozee comprimés section 2):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- essoufflement, douleur thoracique ou gonflement de la cheville ou aggravation, jaunissement de la peau et des yeux (jaunisse) - ce sont des signes de problèmes de foie.</li><li>- douleur abdominale grave ou continue ou non-croissances des selles.</li><li>- réaction allergique - pouvant inclure des problèmes cutanés tels que des ulcères ou des cloques, ou gonflement du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge pouvant causer des difficultés respiratoires.</li></ul>	<b>Les personnes âgées</b> Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les patients âgés. La prudence devrait être exercée chez les personnes âgées les patients.
<b>5. Comment conserver les comprimés de Cozee</b> <p>Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien si vous n'êtes pas sûr.</p>	<b>Mode d'administration</b> Les comprimés Cozee sont à usage oral. Prenez les comprimés une fois par jour. Les comprimés Cozee peuvent être pris avec ou sans nourriture.
<b>6. Contenu de l'emballage et autres informations</b> <p>Le nom de votre médicament est les comprimés pelliculés de Cozee (appelés comprimés Cozee). Le polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire à long terme des articulations. Ça fait mal, raidir, gonfler et perte croissante de mouvement dans les articulations qu'il affecte. Il peut aussi provoquer une inflammation dans d'autres zones du corps.</p>	<b>Si vous avez pris plus de comprimés de Cozee que vous n'auriez dû</b> Vous ne devriez jamais prendre plus de comprimés que ce que votre médecin vous a recommandé. Si vous en prenez trop Comprimés Cozee, vous devez consulter un médecin immédiatement.
<b>7. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	<b>Si vous avez eu des problèmes de Cozee</b> Il est important de prendre les comprimés de Cozee selon les directives de votre médecin. Si vous manquez une dose, juste reprenez votre horaire habituel le lendemain. Ne prenez pas de double dose pour compenser une comprimé oublié.
<b>8. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	<b>Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez à votre médecin ou pharmacien.</b>
<b>9. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	<b>4. Effets secondaires possibles</b> Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.
<b>10. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	<b>Si vous développez l'un de ces signes, vous devez arrêter les comprimés de Cozee et consulter votre médecin, immédiatement (voir Ce que vous devez savoir avant de prendre Cozee comprimés section 2):</b>
<b>11. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	<b>Si vous avez eu des problèmes de Cozee</b> Il est important de prendre les comprimés de Cozee selon les directives de votre médecin. Si vous manquez une dose, juste reprenez votre horaire habituel le lendemain. Ne prenez pas de double dose pour compenser une comprimé oublié.
<b>12. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	<b>Très fréquent (peut affecter plus de 1 personne sur 10)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- douleur à l'estomac.</li></ul> <b>Fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- sécheresse buccale (inflammation et douleur après une extraction dentaire),</li><li>- gonflement des jambes et/ ou des pieds dû à la rétention d'eau</li><li>- (tendinite),</li><li>- éruptions, maux de tête,</li><li>- palpitations (rythme cardiaque rapide ou irrégulier), rythme cardiaque irrégulier (arythmie),</li><li>- augmentation de la pression artérielle.</li></ul> <b>Peu fréquent (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- gastro-entérite (inflammation du tractus gastro-intestinal qui implique à la fois le stomac et l'intestin grêle / grippe intestinale), infection des voies respiratoires supérieures, virus urinaires infection,</li><li>- modifications des valeurs de laboratoire (diminution du nombre de globules rouges, diminution du nombre globules blancs, diminution du nombre de plaquettes),</li><li>- hypersensibilité (réaction allergique incluant de l'urticaire, pouvant être suffisamment grave pour nécessitant une attention médicale immédiate),</li><li>- augmentation ou diminution de l'appétit, prise de poids,</li><li>- anxiété, dépression, diminution de l'activité mentale; voir, ressentir ou entendre des choses qui ne sont pas là (hallucinations),</li><li>- altération du goût, incapacité de dormir, engourdissement ou fourmillements, somnolence,</li><li>- vision floue, irritation des yeux et des rougeurs,</li><li>- bourdonnements dans les oreilles, vertiges (sensation de rotation ou en restant immobile),</li><li>- rythme cardiaque anormal (fibrillation auriculaire), fréquence cardiaque rapide, insuffisance cardiaque, non spécifique</li><li>- Modifications de l'ECG, sensation d'oppression, de pression ou de lourdeur dans la poitrine (angine de poitrine) pectoris), crise cardiaque,</li><li>- bouffées vasomotrices, accident vasculaire cérébral, mini-accident vasculaire cérébral (AVC ischémique transitoire), augmentation sévère de la concentration sanguine pression,</li><li>- inflammation des vaisseaux sanguins,</li><li>- toux, essoufflement, saignement de nez,</li><li>- hémorragies gastro-intestinales ou intestinales, modification des bulbes intestinaux, sécheresse de la bouche, ulcère d'estomac, inflammation de la muqueuse de l'estomac pouvant devenir grave et entraîner des saignements, syndrome du colon irritable, inflammation du pancréas,</li><li>- gonflement du visage, éruption cutanée ou démangeaisons cutanées, rougeur de la peau,</li><li>- crampes / spasmes musculaires, douleurs / raideurs musculaires,</li><li>- taux élevés de potassium dans le sang, modifications dans les analyses de sang ou d'urine liées à votre rein, problèmes rénaux graves, augmentation des taux d'acide urique et de créatine phosphokinase,</li><li>- douleur à la poitrine.</li></ul>
<b>13. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	<b>Si vous avez eu des problèmes de Cozee</b> Il est important de prendre les comprimés de Cozee selon les directives de votre médecin. Si vous manquez une dose, juste reprenez votre horaire habituel le lendemain. Ne prenez pas de double dose pour compenser une comprimé oublié.
<b>14. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	<b>Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez à votre médecin ou pharmacien.</b>
<b>15. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	<b>4. Contenu de l'emballage et autres informations</b> <p><b>Qu'est-ce que Cozee 90 comprimés</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La substance active est l'Étoricoxib. Chaque comprimé pelliculé contient 90 mg d'Étoricoxib.</li><li>- Les autres composants sont: amidon de maïs, phosphate de calcium dibasique, méthylparabène Sodium, stéarate de magnésium, talc purifié, glycolate d'amidon sodique, propylparabène Sodium, povidone K-30, Aerosil (silice colloïdale anhydre)</li><li>- La pellicule contient AF COAT, Color Jaune Lake, alcool isopropylelique et Le chlorure de méthyle</li></ul> <p><b>Qu'est-ce que Cozee 120 comprimés</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- La substance active est l'Étoricoxib. Chaque comprimé pelliculé contient 120 mg d'Étoricoxib.</li><li>- Les autres composants sont: amidon de maïs, phosphate de calcium dibasique, méthylparabène Sodium, Propylparabène Sodium, Talc purifié, Stéarate de magnésium, Amidon de sodium Glycolate, Povidone K-30, Aerosil (silice colloïdale anhydre) et microcristalline Cellulose</li><li>- La pellicule contient AF COAT, Dioxyde de titane, Color Tartrazine Lake, Iso propyl alcool et chlorure de méthyle</li></ul>
<b>16. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	<b>Qu'est-ce que les comprimés Cozee et contenu de l'emballage?</b> Les comprimés pelliculés de Cozee sont des comprimés pelliculés de couleur jaune, arrondis, de forme biconvexe. Un côté a marqué.
<b>17. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	Les comprimés pelliculés de Cozee mo sont disponibles en plaquettes alu-alu de 10 comprimés, 3 têtes ampoules dans carton imprimé avec insert de pack.
<b>18. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	Fabrique en Inde par: <b>ZEE LABORATORIES LIMITED</b> Behind 47, Industrial Area, Poanta Sahib-173025, India
<b>19. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>20. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>21. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>22. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>23. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>24. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>25. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>26. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>27. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>28. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>29. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>30. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>31. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>32. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>33. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>34. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>35. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>36. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>37. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>38. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>39. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>40. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>41. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>42. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>43. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>44. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>45. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>46. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>47. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>48. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>49. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>50. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>51. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>52. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>53. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>54. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>55. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>56. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>57. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>58. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>59. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>60. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>61. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>62. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>63. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>64. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>65. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>66. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>67. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>68. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b>69. Grossesse, allaitement et fertilité</b> <p>Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, pensez que vous pourriez être enceinte ou planifiez une grossesse. bébé, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre ce médicament.</p>	
<b></b>	