

L-210 x H-180mm

Méthylcobalamine et Prégabaline(SR) Comprimés  
**MAXINEURON P**  
Comprimés

**COMPOSITION** Chaque gélule de PRIMIGAB

contient :

- Méthylcobalamine: 750 mcg
- Prégabaline : 75 mg

**PHARMACOLOGIE**

PRIMIGAB associe la méthylcobalamine, une forme active de vitamine B12, à la prégabaline, un analogue de l'acide gamma-aminobutyrique (GABA). La méthylcobalamine est essentielle au fonctionnement normal du système nerveux et aide à maintenir la santé nerveuse. La prégabaline est un agent anticonvulsivant et neuropathique de la douleur qui agit en se liant à la sous-unité alpha2-delta des canaux calciques voltage-dépendants, réduisant ainsi la libération de neurotransmetteurs excitateurs et diminuant ainsi les signaux de douleur dans le système nerveux.

**INDICATIONS ET UTILISATION**

PRIMIGAB est indiqué pour la prise en charge de :

- Douleur neuropathique associée à la neuropathie périphérique diabétique
- Névralgie post-herpétique
- Fibromyalgie
- Traitement d'appoint pour le traitement des crises partielles chez l'adulte

**POSOLOGIE ET ADMINISTRATION Adultes :**

Prendre une capsule de PRIMIGAB deux fois par jour, de préférence avec les repas. La posologie peut être ajustée par votre professionnel de la santé en fonction de la gravité de votre état et de votre réponse au traitement.

Avalez la capsule entière avec un grand verre d'eau. Ne pas écraser ou mâcher la capsule.

**CONTRE-INDICATIONS** PRIMIGAB est contre-indiqué chez les patients présentant :

- Hypersensibilité connue à la méthylcobalamine, à la prégabaline ou à l'un des ingrédients inactifs de ce produit
- Antécédents d'œdème de Quincke

**MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS**

- A utiliser avec prudence chez les patients avant des antécédents d'insuffisance rénale, d'insuffisance cardiaque congestive ou ceux prenant d'autres dépresseurs du SNC.
- Peut causer des étourdissements, de la somnolence ou une vision floue. Ne conduisez pas de machines et n'utilisez pas de machines tant que vous ne savez pas comment PRIMIGAB vous affecte.
- Un arrêt brutal peut provoquer des symptômes de sevrage. Réduire progressivement la dose avant l'arrêt.

**INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES**

PRIMIGAB peut interagir avec d'autres médicaments. Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez actuellement. Voici quelques exemples de médicaments qui peuvent interagir avec PRIMIGAB :

- Opioides
- Benzodiazépines
- Antihistaminiques
- Alcool
- Autres dépresseurs du SNC

**EFFETS INDÉSIRABLES** Les effets

indésirables possibles de PRIMIGAB peuvent inclure :

- Étourdissements ou somnolence
- Mal de tête
- Xérostomie
- Vision floue
- Prise de poids
- Œdème périphérique

Si les effets indésirables persistent ou s'aggravent, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé. Les effets

secondaires graves, bien que rares, peuvent inclure :

- des réactions allergiques graves (par ex. une difficulté respiratoire, une enflure du visage ou de la gorge) ;

- Pensées ou comportements suicidaires
- Rhabdomolyse (dégradation musculaire)
- Saisies

En cas d'effets secondaires graves ou inhabituels, consultez immédiatement un médecin.

**SURDOSAGE** En cas de surdosage, arrêter

PRIMIGAB et consulter immédiatement un médecin. Les symptômes de surdosage peuvent inclure de la somnolence, des étourdissements et une absence de réponse. Le traitement doit être symptomatique et de soutien, y compris le maintien d'une hydratation adéquate et la surveillance des signes vitaux.

**ENTREPOSAGE** Conserver à température ambiante (15-30°C). Protéger de la lumière et de l'humidité. Tenir hors de portée des enfants.

**Style de pack :**

3\*10 Comprimés

**FABRIQUÉ EN INDE PAR :**

Sai Primus Life Biotech Private Limited

(Une entreprise certifiée OMS-GMP)

N° R.S.: 4/3, Parcelle n°: 33,

Zone industrielle de Kurumbapet,

Commune de Villanur , Pondichéry-605009.

Pour de plus amples renseignements, consultez les renseignements posologiques complets ou communiquez avec votre professionnel de la santé.