



Galpha Laboratories Limited

Generic Name: Levocetirizine Dihydrochloride Tablets

Brand Name: LERZIN

LERZIN

(Comprimés de dichlorhydrate de lévocétirizine)

Dichlorhydrate de lévocétirizine 5 mg, comprimé pelliculé

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Conservez cette notice. Tu auras peut-être besoin de le relire.
- Si vous avez d'autres questions, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit (ou à votre enfant) uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela peut leur faire du mal, même si leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient ce dépliant?

1. Qu'est-ce que les comprimés de dichlorhydrate de lévocétirizine et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Comprimés de dichlorhydrate de levocetirizine
3. Comment prendre les comprimés de dichlorhydrate de levocetirizine
4. Les effets secondaires possibles
5. Comment conserver le comprimé de dichlorhydrate de levocetirizine
6. Contenu du pack et autres informations

1. QU'EST-CE QUE LES COMPRIMÉS DE DIHYDROCHLORURE DE LEVOCETIRIZINE ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ

Le dichlorhydrate de lévocétirizine est le principe actif des comprimés pelliculés de lévocétirizine 5 mg. Lévocétirizine un médicament antiallergique.

Pour le traitement des signes de maladie (symptômes) associés à :

- Une rhinite allergique (y compris la rhinite allergique persistante) ;
- Urticaire

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE LES COMPRIMÉS DE DIHYDROCHLORURE DE LÉVOCETIRIZINE

Ne prenez jamais Lévocétirizine Dichlorhydrate 5 mg comprimés pelliculés :

- Je f vous êtes allergique à dichlorhydrate de lévocétirizine à cétirizine, à l'hydroxyzine ou l'un des autres composants de ce médicament (voir rubrique 6).
- Je f vous avez une déficience grave de la fonction rénale

Avertissements et précautions





Galpha Laboratories Limited

Generic Name: Levocetirizine Dihydrochloride Tablets

Brand Name: LERZIN

- Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant de prendre Dichlorhydrate de lévocétirizine 5 mg, comprimés pelliculés. Si vous êtes susceptible de ne pas être en mesure de vider votre vessie (en raison d' affections telles qu'une lésion de la moelle épinière ou une hypertrophie de la prostate), demandez conseil à votre médecin.
- Si vous souffrez d'épilepsie ou si vous présentez un risque de convulsions, demandez conseil à votre médecin car l'utilisation de Dichlorhydrate de Lévocétirizine 5 mg comprimés pelliculés peut provoquer une aggravation des crises.
- Si vous devez subir un test d'allergie, demandez à votre médecin si vous devez arrêter de prendre Levocetirizine Dichlorhydrate 5 mg comprimés pelliculés pendant plusieurs jours avant le test. Ce médicament peut affecter les résultats de vos tests d'allergie .

Enfants

L'utilisation de Dichlorhydrate de Lévocétirizine 5 mg comprimés pelliculés est déconseillée chez l'enfant de moins de 6 ans car les comprimés pelliculés ne permettent pas d'adaptation posologique.

Autres médicaments et comprimés de Dichlorhydrate de Lévocétirizine

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament

Le vocétirizine Dichlorhydrate comprimés avec des aliments, des boissons et de l'alcool

La prudence est recommandée si le dichlorhydrate de lévocétirizine est pris en même temps que de l'alcool ou d'autres agents agissant sur le cerveau. Chez les patients sensibles, l'administration concomitante de Dichlorhydrate de Lévocétirizine 5 mg comprimés pelliculés et d'alcool ou d'autres agents agissant sur le cerveau peut entraîner des réductions supplémentaires de la vigilance et une altération des performances .

Le chlorhydrate de lévocétirizine peut être pris avec ou sans nourriture.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou prévoyez une grossesse , demandez conseil à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

Conduire et utiliser des machines

Certains patients traités par le dichlorhydrate de lévocétirizine peuvent présenter une somnolence/somnolence, de la fatigue et un épuisement. Soyez prudent lorsque vous conduisez ou utilisez des machines jusqu'à ce que vous sachiez comment ce médicament vous affecte. Cependant, des tests spéciaux n'ont révélé aucune altération de la vigilance mentale, de la capacité de réaction ou de la capacité de conduire chez des personnes testées en bonne santé après avoir pris le dichlorhydrate de lévocétirizine à la dose recommandée.

Les comprimés de dichlorhydrate de Levocet irizine contiennent du lactose

Ces comprimés contiennent du lactose; si votre médecin vous a dit que vous avez une intolérance à certains sucres, vous devez contacter votre médecin avant de les prendre.

3. COMMENT PRENDRE LES COMPRIMÉS DE DIHYDROCHLORURE DE LÉVOCÉTIRIZINE





Galpha Laboratories Limited

Generic Name: Levocetirizine Dihydrochloride Tablets

Brand Name: LERZIN

Prenez toujours ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin ou pharmacien. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée comme indiqué ci-dessous.

Adultes et enfants de plus de 12 ans : 5 mg une fois par jour le soir

Enfants de 6 à 11 ans : 2,5 mg une fois par jour le soir .

Instructions posologiques spéciales pour des populations spécifiques

Insuffisance rénale et hépatique

Les patients présentant une insuffisance rénale peuvent recevoir une dose plus faible en fonction de la gravité de leur maladie rénale, et chez les enfants, la dose sera également choisie en fonction du poids corporel ; la dose sera déterminée par votre médecin.

Les patients qui ont une insuffisance rénale sévère ne doivent pas prendre de comprimés de Dichlorhydrate de Lévocétirizine .

Les patients dont la fonction hépatique est uniquement altérée doivent prendre la dose habituelle prescrite après avoir consulté un médecin ou un pharmacien.

Les patients présentant à la fois une insuffisance hépatique et rénale peuvent recevoir une dose plus faible en fonction de la gravité de la maladie rénale, et chez les enfants, la dose sera également choisie en fonction du poids corporel ; la dose sera déterminée par votre médecin.

Patients âgés de 65 ans et plus

Aucune adaptation de la dose n'est nécessaire chez les patients âgés, à condition que leur fonction rénale soit normale.

Utilisation chez les enfants

Le dichlorhydrate de lévocétirizine n'est pas recommandé chez les enfants de moins de 6 ans .

Comment et quand faut-il prendre Levocet irizine Dichlorhydrate comprimé ?

Pour usage oral uniquement.

Les comprimés de rochlorure de lévocétirizine dihyd doivent être avalés entiers avec de l'eau et peuvent être pris avec ou sans nourriture .

Combien de temps devez-vous prendre les comprimés de Dichlorhydrate de Lévocétirizine ?

La durée d'utilisation dépend du type, de la durée et de l'évolution de vos plaintes et est déterminée par votre médecin.

Si vous avez pris plus de comprimés de Levocet irizine Dichlorhydrate que vous n'auriez dû

Si vous avez pris plus de Dichlorhydrate de Lévocétirizine 5 mg, comprimés pelliculés que vous n'auriez dû, une somnolence peut survenir chez l'adulte. Les enfants peuvent d'abord montrer de l'excitation et de l'agitation suivies d'une somnolence.

Si vous pensez avoir pris un surdosage de Lévocétirizine Dichlorhydrate 5 mg, comprimés pelliculés, veuillez en informer votre médecin qui décidera alors des mesures à prendre .

Si vous oubliez de prendre les comprimés de Levo cetirizine Dichlorhydrate





Galpha Laboratories Limited

Generic Name: Levocetirizine Dihydrochloride Tablets

Brand Name: LERZIN

Si vous oubliez de prendre le dichlorhydrate de lévocétirizine, ou si vous prenez une dose inférieure à celle prescrite par votre médecin, ne prenez pas de dose double pour compenser une dose oubliée. Prenez la dose suivante à votre temps normal.

Si vous arrêtez de prendre Levocetirizine Dichlorhydrate comprimés

L'arrêt du traitement ne devrait avoir aucun effet négatif. Cependant, dans de rares cas, un prurit (démangeaisons intenses) peut survenir si vous arrêtez de prendre le dichlorhydrate de lévocétirizine, même si ces symptômes n'étaient pas présents avant le début du traitement. Les symptômes peuvent disparaître spontanément. Dans certains cas, les symptômes peuvent être intenses et nécessiter la reprise du traitement. Les symptômes devraient disparaître à la reprise du traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

Les effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet .

Effets secondaires graves

Dès les premiers signes d'une réaction allergique, arrêtez de prendre Levocetirizine Dichlorhydrate et prévenez votre médecin. Les symptômes de la réaction allergique peuvent inclure : gonflement de la bouche, de la langue, du visage et/ou de la gorge, difficultés à respirer ou à avaler (oppression thoracique ou respiration sifflante), urticaire, chute soudaine de la pression artérielle entraînant un collapsus ou un choc, qui peut être fatal .

Autres effets secondaires

Fréquent : peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10, Bouche sèche, maux de tête, fatigue et somnolence/somnolence.

Fréquence indéterminée : la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles

Autres effets indésirables tels que palpitations, accélération du rythme cardiaque, convulsions, fourmillements, étourdissements, évanouissements/perte de conscience, tremblements, dysgueusie (distorsion du sens du goût), sensation de rotation ou de mouvement, troubles visuels, vision floue, douleur ou miction difficile, incapacité à vider complètement la vessie, gonflement du corps, prurit (démangeaisons), éruption cutanée, urticaire (gonflement, rougeur et démangeaisons de la peau), éruption cutanée, essoufflement, prise de poids, douleurs musculaires, douleurs articulaires , comportement agressif ou agité , hallucination, dépression, insomnie, fonction hépatique anormale, augmentation de l'appétit, nausées, vomissements et diarrhée ont également été rapportés.

Prurit (démangeaisons intenses) à l'arrêt.

Oculogyration (yeux ayant des mouvements circulaires incontrôlés), cauchemar

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires possibles non mentionnés dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets secondaires directement via le système de signalement local.





Galpha Laboratories Limited

Generic Name: Levocetirizine Dihydrochloride Tablets

Brand Name: LERZIN

5. COMMENT CONSERVER LEVOCETIRIZINE DIHYDROCHLORURE COMPRIMÉ

Gardez ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte après « EXP ». La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Conserver en dessous de 30°C dans un endroit sec. Protéger de la lumière.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment jeter les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

6. CONTENU DU PACK ET AUTRES INFORMATIONS

Ce que contient Levocetirizine Dichlorhydrate comprimés

- La substance active est le dichlorhydrate de lévocétirizine . Chaque comprimé pelliculé contient: 5 mg lévocétirizine dichlorhydrate .
- Les autres composants sont: Noyau du comprimé: Lactose monohydraté , la cellulose microcristalline , sodium, amidon glycolate colloïdale anhydre de la silice et de magnésium Stéarate Film Coating : Hydroxy propyl 1 méthyl cellulose E-5, dioxyde de titane , l' alcool isopropylique , talc , polyéthylèneglycol 6000 (PEG-6000) , Eau purifiée .

Qu'est-ce que Levocetirizine Dichlorhydrate comprimés et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés pelliculés blancs, ronds, biconvexes, lisses des deux côtés. Blister de 10 Comprimés

TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE

LABORATOIRES GALPHA LIMITÉE

610, Shah & Nahar, Worli (W),

Mumbai- 400 018, India.

FABRICANT

LABORATOIRES GALPHA LIMITÉE

Village- Thana, Baddi,

Himachal Pradesh-173 205, India.

