

L-210 x H-180mm

Chlorhydrate De Fexofénadine &
Montelukast Sodique Comprimés
MONFENA - 180

Composition:

- Chaque comprimé de MONFENA - 180 contient :
- Fexofénadine : 180 mg
 - Montelukast : 10 mg

PHARMACOLOGIE

Fexofénadine avec l'antagoniste des récepteurs des leucotriènes Montelukast. La fexofénadine agit en bloquant les effets de l'histamine, une substance libérée par le corps lors d'une réaction allergique, soulageant ainsi les symptômes d'allergie. Le montelukast agit en inhibant l'action des leucotriènes, des substances chimiques libérées par l'organisme en réponse aux allergènes, qui provoquent une inflammation, une bronchoconstriction et la production de mucus, contribuant ainsi à prévenir les symptômes de l'asthme et les réactions allergiques.

INDICATIONS ET USAGE

MONFENA - 180 est indiqué pour le traitement et la prévention de :

- Rhinite allergique saisonnière (rhume des foies)
- Urticaire idiopathique chronique (urticaire)
- Asthme

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION

Adultes: Prenez un comprimé de MONFENA - 180 une fois par jour, ou selon les directives de votre professionnel de la santé. Avalez le comprimé entier avec un grand verre d'eau. Ne pas écraser ou mâcher le comprimé.

Il est préférable de prendre MONFENA - 180 à jeun, au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas.

CONTRE-INDICATIONS

- MONFENA - 180 est contre-indiqué chez les patients présentant :
- Hypersensibilité connue à la fexofénadine, au montelukast ou à l'un des ingrédients inactifs de ce produit
 - Insuffisance hépatique sévère

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

- Utilisez avec prudence chez les patients ayant des antécédents d'insuffisance rénale ou hépatique.
- Peut causer des étourdissements ou de la somnolence. Ne conduisez pas et n'utilisez pas de machines tant que vous ne savez pas comment MONFENA - 180 vous affecte.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

- MONFENA - 180 peut interagir avec d'autres médicaments. Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez actuellement. Voici quelques exemples de médicaments pouvant interagir avec MONFENA - 180™ :
- Antiacides contenant de l'aluminium ou du magnésium
 - Érythromycine ou kétoconazole
 - Phénobarbital ou rifampine

EFFETS INDÉSIRABLES

Les effets indésirables possibles de MONFENA - 180 peuvent inclure:

- Maux de tête ou vertiges
- Nausées ou vomissements
- Bouche sèche
- Fatigue ou somnolence
- Toux

Si des effets indésirables persistent ou s'aggravent, contactez immédiatement votre professionnel de la santé. Les effets secondaires graves, bien que rares, peuvent inclure:

- Réactions allergiques graves (par exemple, difficulté à respirer, gonflement du visage ou de la gorge)
- Saisies
- Pensées ou comportements suicidaires
- Agressivité ou agitation

En cas d'effets secondaires graves ou inhabituels, consultez immédiatement un médecin.

SURDOSAGE

En cas de surdosage, arrêtez MONFENA - 180 et consultez immédiatement un médecin. Les symptômes de surdosage peuvent inclure somnolence, étourdissements et sécheresse de la bouche. Le traitement doit être symptomatique et de soutien, y compris le maintien d'une hydratation adéquate et la surveillance des signes vitaux.

STOCKAGE

Conserver à température ambiante (15-30°C). Protégez de la lumière et de l'humidité. Tenir hors de portée des enfants.

STYLE DE PACK :

3*10 Comprimés

FABRIQUÉ EN INDE PAR:

Sai Primus Life Biotech Private Limited
(Une entreprise certifiée OMS-GMP)
N° R.S.: 4/3, Parcelle n°: 33,
Zone industrielle de Kurumbapet,
Commune de Villianur, Pondichéry-605009.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre professionnel de la santé.