

Dépliant d'information pour les patients

Comprimés de mébendazole USP 100 mg

Nom Dosage Forme pharmaceutique : Comprimés de mébendazole USP à 100 mg et comprimés / Forme posologique solide

Composition:

Chaque comprimé non enrobé contient : Mébendazole USP 100 mg

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de commencer à prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Conservez ce dépliant. Tu auras peut-être besoin de le relire.
- Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été prescrit uniquement. Ne pas le transmettre à d'autres. Cela pourrait leur nuire, même si leurs signes de maladie sont les mêmes que les vôtres.
- Si vous ressentez des effets secondaires, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Cela inclut tous les effets secondaires possibles non répertoriés dans cette notice.

Dans ce dépliant :

1. Qu'est-ce que Mebendazole Comprimés USP 100 mg et dans quel cas est-il utilisé
2. Avant de prendre les comprimés de mébendazole USP 100 mg
3. Comment prendre les comprimés de mébendazole USP 100 mg ?
4. Effets secondaires possibles
5. Comment conserver Mebendazole Comprimé USP 100 mg ?
6. Informations complémentaires

1. Qu'est-ce que Mebendazole Comprimés USP 100 mg et dans quel cas est-il utilisé

Le nom de votre médicament est Mébendazole. Mébendazole Les comprimés contiennent un médicament appelé mébendazole. Il fait partie d'un groupe de médicaments appelés « anthelminthiques ».

Mébendazole les comprimés sont utilisés pour traiter les infections intestinales par des vers telles que :

- vers filiformes (oxyures)
- d'autres infections courantes par des vers (telles que le trichocéphale, l'ascaris, l'ankylostome)

Ce médicament est destiné à être utilisé chez l'adulte et l'enfant âgé de plus de 2 ans.

Il vous a été conseillé, à vous ou à votre enfant, de prendre du mébendazole. comprimés parce que vous avez une infection par des vers. Les vers peuvent infecter n'importe qui. Cela ne signifie pas nécessairement que votre hygiène est mauvaise.

2. Avant de prendre les comprimés de mébendazole USP 100 mg

Ne pas utiliser le mébendazole comprimés si :

- Vous êtes allergique à quoi que ce soit dans le mébendazole comprimés
- Tu es enceinte

N'utilisez pas ce médicament si l'une des situations ci-dessus s'applique à vous. En cas de doute, parlez-en à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser le mébendazole. comprimés.

Avertissements et précautions

- Mébendazole les comprimés ne doivent pas être administrés aux enfants de moins de 2 ans
- Mébendazole ne doit être administré aux jeunes enfants que si votre médecin vous l'a spécifiquement prescrit. Votre médecin décidera si le mébendazole convient à votre enfant. Vous devez suivre attentivement les instructions du médecin.
- Des convulsions (convulsions) ont été rapportées, notamment chez les nourrissons. Mébendazole ne doit être administré aux enfants de moins de 2 ans que si votre médecin vous l'a spécifiquement prescrit.

Prendre d'autres médicaments

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou avez récemment pris d'autres médicaments. Cela inclut les médicaments que vous achetez sans ordonnance, les plantes médicinales, les compléments alimentaires ou les vitamines.

Informez en particulier votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez :

- Métronidazole - pour certaines infections
- Cimétidine – pour l'excès d'acidité gastrique

Adressez-vous à votre médecin avant d'utiliser le mébendazole comprimés si vous prenez l'un de ces médicaments.

La grossesse et l'allaitement

- Ne prenez pas de mébendazole comprimés si vous êtes enceinte, si vous pensez l'être ou si vous pourriez le devenir.
- Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien si vous allaitez

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Ce médicament n'est pas susceptible d'affecter votre capacité à conduire ou à utiliser des outils ou des machines.

Informations importantes concernant certains composants de Mébendazole

Ce médicament contient 0,06 mg de jaune orangé (E110). Cet ingrédient peut provoquer des réactions allergiques.

Ce médicament contient 3,8 mg de sodium (composant principal du sel de cuisine/de table) dans chaque comprimé. Cela équivaut à 0,19 % de l'apport alimentaire quotidien maximal recommandé en sodium pour un adulte.

3. Comment prendre les comprimés de mébendazole USP 100 mg ?

Utilisez toujours le mébendazole comprimés exactement comme votre médecin vous l'a indiqué. Vous devriez vérifier auprès de votre médecin ou de votre pharmacien si vous n'êtes pas sûr.

Prendre ce médicament

- Prenez ce médicament par voie orale
- La dose dépendra du type de ver que vous avez
- Écrasez le comprimé avant de le donner à votre enfant. Surveillez toujours un enfant s'il prend ce médicament
- Mâchez les comprimés ou avalez-les entiers
- Vous n'avez pas besoin d'utiliser de laxatif ni de modifier votre alimentation
- Envisagez d'utiliser le mébendazole suspension buvable pour les patients tels que les jeunes enfants incapables d'avaler le comprimé
- Mébendazole ne doit être administré aux enfants de moins de 2 ans que si votre médecin vous l'a spécifiquement prescrit.

Combien devriez-vous prendre

Adultes et enfants de plus de 2 ans

Pour les vers filiformes (oxyures) :

- **un comprimé**

Un seul comprimé de mébendazole tuera les vers filiformes. Votre médecin pourra vous demander de prendre un deuxième comprimé après deux semaines en cas de réinfection.

Pour les autres infections courantes par les vers :

- un comprimé deux fois par jour (matin et soir) pendant trois jours consécutifs ou selon les directives de votre médecin.

Si vous avez pris plus de comprimés de Mebendazole que vous n'auriez dû Si vous avez pris plus de comprimés de Mebendazole que vous n'auriez dû, parlez-en à un médecin ou rendez-vous immédiatement aux urgences de l'hôpital le plus proche.

Si vous oubliez de prendre les comprimés de Mébendazole

- Ne prenez pas la dose oubliée
- Prenez votre prochaine dose à l'heure habituelle, puis continuez à prendre votre médicament comme votre médecin vous l'a indiqué.
- Ne prenez pas de double dose pour compenser une dose oubliée.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce produit, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, Mebendazole, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Arrêtez d'utiliser les comprimés de Mebendazole et informez immédiatement votre médecin si vous remarquez ou soupçonnez les effets secondaires graves suivants. Vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent.

- Gonflement soudain du visage ou de la gorge. Urticaire (également connue sous le nom d'éruption d'ortie ou d'urticaire), irritation grave, rougeur ou cloques de la peau. Ceux-ci peuvent être les signes d'une réaction allergique grave
- Cloques sur la peau, la bouche, les yeux et les organes génitaux
- Crises (convulsions)

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous remarquez l'un des effets indésirables suivants :

Fréquent (affecte moins de 1 personne sur 10)

- Douleur d'estomac

Peu fréquent (affecte moins de 1 personne sur 100)

- Maux d'estomac
- Diarrhée
- Vent
- Se sentir malade (nausées) ou avoir des nausées (vomissements)

Rare (affecte moins de 1 personne sur 1 000)

- Éruption cutanée
- Inflammation du foie
- Modifications des enzymes hépatiques (indiquées dans les analyses de sang)
- Inflammation des reins
- Réduction des globules blancs (montrée dans les analyses de sang). Vous pourriez contracter davantage d'infections
- Chute de cheveux inhabituelle
- Vertiges

5. Comment conserver Mébendazole Comprimés USP 100 mg :

Conserver à une température ne dépassant pas 30°C dans un endroit sec. Protéger de la lumière.
Tenir hors de portée des enfants.

6. Informations complémentaires

Ce que contient Mebendazole Comprimés USP 100 mg

- La substance active est **le mébendazole** . Chaque comprimé non enrobé contient :
Mébendazole USP 100 mg

Les autres ingrédients sont : Cellulose microcristalline, amidon de maïs, laurylsulfate de sodium, silice colloïdale anhydre, méthylhydroxybenzoate de sodium, propylhydroxybenzoate de sodium, talc purifié, stéarate de magnésium, glycolate d'amidon sodique (type A), croscarmellose sodique et eau purifiée*.

*Perte pendant le traitement

A quoi ressemble Mebendazole Comprimé et contenu de l'emballage extérieur

Les comprimés de mébendazole USP 100 mg sont des comprimés de couleur blanc cassé à légèrement jaunâtre, ronds, plats, non enrobés, sécables d'un côté et unis de l'autre.

Emballage: 6 comprimés emballés dans une feuille d'aluminium sous blister imprimé et un film PVC transparent et 1 blister emballé dans un carton unitaire avec une notice.

Fabricant

MEDICAMEN Biotech Ltd.

SP-1192 A et B,

Phase-IV, Zone Industrielle,

Bhiwadi-301019,

District d'Alwar, Rajasthan

INDE

Date de publication ou de révision : janvier 2021