

# LATMO collyre

(Latanoprost, U.S.P+ Timolol, U.S.P)

Solution ophtalmique stérile

## ChaqNotice : Informations pour l'utilisateur

Collyre LATMO  
Collyre en solution à 50 microgrammes/ml + 5 mg/ml  
Latanoprost + Timolol sous forme de maléate

### Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament, car elle contient des informations importantes pour vous.

- Conservez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Pour toute autre question, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez des effets indésirables, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Voir rubrique 4.

### Contenu de cette notice :

1. Qu'est-ce que le collyre Latmo et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Informations à connaître avant d'utiliser le collyre Latmo ?
3. Comment utiliser le collyre Latmo ?
4. Effets secondaires possibles ?
5. Comment conserver le collyre Latmo ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

### 1. Qu'est-ce que le collyre Latmo et dans quel cas est-il utilisé ?

Le collyre Latmo contient deux médicaments : le latanoprost et le timolol. Le latanoprost appartient à un groupe de médicaments appelés « analogues des prostaglandines ». Le timolol appartient à un groupe de médicaments appelés « bêtabloquants ». Le latanoprost agit en augmentant le flux sanguin naturel du liquide oculaire. Le timolol ralentit la formation de liquide dans l'œil.

Le collyre Latmo est utilisé pour réduire la pression intraoculaire en cas de glaucome à angle ouvert ou d'hypertension oculaire. Ces deux affections sont liées à une augmentation de la pression intraoculaire, affectant à terme la vue. Votre médecin vous prescrira généralement le collyre Latmo lorsque d'autres médicaments ne sont pas efficaces.

### 2. Informations à connaître avant d'utiliser les gouttes oculaires Latmo

Les gouttes oculaires Latmo peuvent être utilisées chez les hommes et les femmes adultes (y compris les personnes âgées), mais leur utilisation est déconseillée aux moins de 18 ans.

### N'utilisez jamais les gouttes oculaires Latmo

- si vous êtes allergique (hypersensible) au latanoprost, au timolol, aux bêta-bloquants ou à l'un des autres composants des gouttes oculaires Latmo (mentionnés à la rubrique 6)
- si vous souffrez ou avez souffert de problèmes respiratoires tels que l'asthme, une bronchite chronique obstructive sévère (maladie pulmonaire grave pouvant entraîner une respiration sifflante, des difficultés respiratoires et/ou une toux persistante)
- si vous souffrez de problèmes cardiaques graves ou de troubles du rythme cardiaque.

### Avertissements et précautions

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant d'utiliser les gouttes oculaires Latmo si vous souffrez ou avez souffert des symptômes suivants :

- maladie coronarienne (les symptômes peuvent inclure une douleur ou une oppression thoracique, un essoufflement ou une suffocation), insuffisance cardiaque, hypotension artérielle
- troubles du rythme cardiaque tels qu'un ralentissement des battements cardiaques (bradycardie)
- problèmes respiratoires, asthme ou bronchopneumopathie chronique obstructive
- maladie circulatoire (comme la maladie ou le syndrome de Raynaud)
- diabète, car le timolol peut masquer les signes et symptômes d'hypoglycémie
- hyperthyroïdie, car le timolol peut masquer les signes et symptômes
- vous allez subir une intervention chirurgicale oculaire (y compris une opération de la cataracte) ou en avez subi une par le passé.
- vous souffrez de problèmes oculaires (tels que douleur, irritation, inflammation ou vision trouble).
- vous savez que vous souffrez de sécheresse oculaire.
- vous portez des lentilles de contact. Vous pouvez toujours utiliser les gouttes oculaires Latmo, mais suivez les instructions pour les porteurs de lentilles de contact à la section 3.
- vous savez que vous souffrez d'angine de poitrine (notamment d'angine de Prinzmetal).
- vous savez que vous souffrez de réactions allergiques sévères nécessitant généralement une hospitalisation.
- vous avez souffert ou souffrez actuellement d'une infection oculaire virale causée par le virus

de l'herpès simplex (VHS). Avant toute intervention, informez votre médecin que vous utilisez les gouttes oculaires Latmo, car le timolol peut modifier les effets de certains médicaments utilisés pendant l'anesthésie.

### Autres médicaments et collyre Latmo

Les collyres Latmo peuvent interagir avec d'autres médicaments que vous utilisez, y compris d'autres collyres pour le traitement du glaucome. Informez votre médecin si vous utilisez ou prévoyez d'utiliser des médicaments pour réduire la tension artérielle, des médicaments pour le cœur ou des médicaments pour traiter le diabète.

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre d'autres médicaments. Consultez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Prostaglandines, analogues ou dérivés des prostaglandines
- Bêtabloquants
- Épinéphrine
- Médicaments utilisés pour traiter l'hypertension artérielle, tels que les inhibiteurs calciques et la guanéthidine
- Antiarythmiques (médicaments qui normalisent le rythme cardiaque)
- Digitaliques (utilisés pour traiter l'insuffisance cardiaque)
- Agents parasymphatomimétiques (par exemple, pour le traitement de l'hypertension artérielle)
- Quinidine (utilisée pour traiter les maladies cardiaques et certains types de paludisme)
- Antidépresseurs connus sous le nom de fluoxétine et de paroxétine.

### Gouttes oculaires Latmo avec des aliments et boissons

Les repas, aliments et boissons habituels n'ont aucun effet sur le moment et la manière d'utiliser les gouttes oculaires Latmo.

### Grossesse, allaitement et fertilité

#### Grossesse

**N'utilisez pas les gouttes oculaires Latmo si vous êtes enceinte, sauf si votre médecin le juge nécessaire.** Prévenez immédiatement votre médecin si vous êtes enceinte, pensez l'être ou prévoyez une grossesse. Allaitement.

#### Fertilité

Des études animales ont montré que le latanoprost et le timolol n'avaient aucun effet sur la fertilité masculine ou féminine.

### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Lorsque vous utilisez les gouttes oculaires Latmo, votre vision peut devenir floue pendant une courte période. Si cela vous arrive, ne conduisez pas et n'utilisez aucun outil ni machine jusqu'à ce que votre vision redevienne claire.

**Les gouttes oculaires Latmo contiennent du chlorure de benzalkonium et des tampons phosphates.** Ce médicament contient 0,2 milligramme de chlorure de benzalkonium par millilitre. Le chlorure de benzalkonium peut être absorbé par les lentilles de contact souples et en modifier la couleur. Il est conseillé de retirer les lentilles de contact avant d'utiliser ce médicament et de les remettre 15 minutes après.

Le chlorure de benzalkonium peut également provoquer une irritation oculaire, notamment en cas de sécheresse oculaire ou d'affections de la cornée (la couche transparente située à l'avant de l'œil). Si vous ressentez une sensation oculaire anormale, des picotements ou une douleur oculaire après l'utilisation de ce médicament, consultez votre médecin.

Ce médicament contient 6,3 mg de phosphates par ml de solution. En cas de lésions graves de la couche transparente située à l'avant de l'œil (la cornée), les phosphates peuvent, dans de très rares cas, provoquer des taches opaques sur la cornée en raison de l'accumulation de calcium pendant le traitement.

### 3. Comment utiliser les gouttes oculaires Latmo

Utilisez toujours ce médicament exactement comme votre médecin vous l'a prescrit. Consultez votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

La dose recommandée pour les adultes (y compris les personnes âgées) est d'une goutte par jour dans l'œil ou les yeux affectés.

N'utilisez pas les gouttes oculaires Latmo plus d'une fois par jour, car l'efficacité du traitement peut être réduite si vous les administrez plus souvent.

Utilisez les gouttes oculaires Latmo selon les instructions de votre médecin jusqu'à ce qu'il vous dise d'arrêter.

Votre médecin pourrait vous prescrire des examens cardiaques et circulatoires supplémentaires si vous utilisez les gouttes oculaires Latmo. Porteurs de lentilles de contact : si vous portez des lentilles de contact, vous devez les retirer avant d'utiliser les gouttes oculaires Latmo. Après utilisation, attendez 15 minutes avant de les remettre.

Mode d'emploi : Lavez-vous toujours les mains avant d'appliquer les gouttes oculaires. Porteurs de lentilles de contact : Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les avant d'utiliser les gouttes oculaires Latmo. Après utilisation, attendez 15 minutes avant de les remettre.

Mode d'emploi : Lavez-vous toujours les mains avant d'appliquer les gouttes oculaires. Appliquez vos gouttes oculaires de la manière suivante :  
1. Retirez le capuchon protecteur.  
2. Penchez la tête en arrière et regardez vers le plafond.



3. Tirez doucement la paupière inférieure vers le bas jusqu'à former une petite poche, comme illustré à la figure 1.

4. Pressez le flacon compte-gouttes retourné pour libérer une goutte dans l'œil. 5. Tout en gardant l'œil fermé, appuyez votre doigt sur le coin de l'œil fermé (le côté où l'œil rejoint le nez), comme illustré à la figure 2, et maintenez cette position pendant 2 minutes. Cela permet d'éviter que les gouttes oculaires Latmo ne se répandent dans le reste du corps.



Évitez tout contact de l'embout compte-gouttes avec vos yeux ou tout autre objet. Remettez le bouchon et revisez-le immédiatement après utilisation.

Si vous utilisez les gouttes oculaires Latmo avec d'autres gouttes oculaires attendez au moins 5 minutes entre l'utilisation des gouttes oculaires Latmo et l'utilisation des autres gouttes oculaires.

Si vous utilisez plus de gouttes oculaires Latmo que vous n'auriez dû  
Si vous mettez trop de gouttes dans vos yeux, vous pourriez ressentir une légère irritation oculaire, ainsi que des larmoiements et une rougeur. Cela devrait passer, mais en cas d'inquiétude, consultez votre médecin.

### Si vous avez des gouttes oculaires Latmo

Si vous avez accidentellement du collyre Latmo, consultez votre médecin. Si vous avez une quantité importante de collyre Latmo, vous pourriez vous sentir mal, avoir des maux d'estomac, vous sentir fatigué, avoir des bouffées de chaleur, des vertiges et transpirer.

Si vous oubliez d'utiliser les gouttes oculaires Latmo, Continuez à prendre la dose habituelle à l'heure habituelle. Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose oubliée. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

### 4. Effets secondaires possibles

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets secondaires, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Vous pouvez généralement continuer à prendre les gouttes, sauf si les effets sont graves. En cas d'inquiétude, consultez un médecin ou un pharmacien. N'arrêtez pas d'utiliser les gouttes oculaires Latmo sans en parler à votre médecin.

Vous trouverez ci-dessous les effets secondaires connus des gouttes oculaires Latmo. Le principal effet secondaire est la possibilité d'une modification progressive et permanente de la couleur de vos yeux. Les gouttes oculaires Latmo peuvent également entraîner de graves modifications du fonctionnement de votre cœur. Si vous remarquez des changements dans votre fréquence cardiaque ou votre fonction cardiaque, consultez un médecin et indiquez que vous utilisez des gouttes oculaires Latmo.

Les effets secondaires suivants sont connus des gouttes oculaires Latmo :

#### Très fréquent (peut toucher plus d'une personne sur 10) :

- Modification progressive de la couleur de vos yeux due à une augmentation de la quantité de pigment brun dans l'iris. Si vous avez les yeux de couleur mixte (bleu-marron, gris-marron, jaune-marron ou vert-marron), vous êtes plus susceptible de constater ce changement que si vous avez les yeux d'une seule couleur (bleus, gris, verts ou marron). Toute modification de la couleur de vos yeux peut prendre des années à se développer. Cette modification peut être permanente et plus visible si vous utilisez les gouttes oculaires Latmo dans un seul œil. Il ne semble pas y avoir de problème associé à cette modification de la couleur des yeux. Elle ne persiste pas après l'arrêt du traitement par les gouttes oculaires Latmo.

#### Fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 10) :

- Irritation oculaire (sensation de brûlure, de grains de sable, de démangeaisons, de picotements ou de corps étranger dans l'œil) et douleur oculaire.

#### Peu fréquents (pouvant affecter jusqu'à 1 personne sur 100) :

- Maux de tête
- Rougeur oculaire, infection oculaire (conjonctivite), vision trouble, larmoiement, inflammation des paupières, irritation ou lésion de la surface oculaire
- Éruptions cutanées ou démangeaisons (prurit)
- Nausées

### Autres effets secondaires

Comme d'autres médicaments appliqués dans les yeux, le latanoprost et le timolol passent dans le sang. Cela peut entraîner des effets secondaires similaires à ceux observés avec les bêta-bloquants systémiques.

L'incidence des effets secondaires après l'utilisation de gouttes ophtalmiques est plus faible que lorsque les médicaments sont, par exemple, administrés par voie orale ou injectés.

Bien qu'ils n'aient pas été observés avec les gouttes ophtalmiques Latmo, les effets secondaires supplémentaires suivants ont été observés avec les médicaments contenus dans les gouttes ophtalmiques Latmo et peuvent donc survenir lors de l'utilisation de ce produit :

- Les effets secondaires mentionnés incluent les réactions observées avec la classe des bêta-bloquants lorsqu'ils sont utilisés pour traiter les affections oculaires :
- Développement d'une infection virale oculaire causée par le virus de l'herpès simplex (HSV).
- Réactions allergiques généralisées, notamment gonflement sous-cutané pouvant survenir au niveau du visage et des membres, pouvant obstruer les voies respiratoires et entraîner des difficultés à avaler ou à respirer (œdème de Quincke), urticaire ou éruption cutanée avec démangeaisons, éruption cutanée localisée et généralisée, démangeaisons, réaction allergique

grave et soudaine mettant en jeu le pronostic vital (réaction anaphylactique).

- Faible taux de glucose sanguin (hypoglycémie).
- Difficultés à dormir (insomnie), dépression, cauchemars, pertes de mémoire, hallucinations.
- Évanouissements, accident vasculaire cérébral, diminution de l'apport sanguin au cerveau, aggravation des signes et symptômes de myasthénie grave (trouble musculaire), vertiges, sensations inhabituelles de fourmillements et maux de tête.
- Gonflement du fond de l'œil (œdème maculaire), kyste rempli de liquide dans la partie colorée de l'œil (kyste de firs), photosensibilité (photophobie), aspect de l'œil enfoncé (approfondissement du sillon oculaire).

• Signes et symptômes d'irritation oculaire (par exemple, brûlures, picotements, démangeaisons, larmoiements, rougeurs), inflammation de la paupière, inflammation de la cornée, vision floue et décollement de la couche sous-rétinienne contenant les vaisseaux sanguins après une chirurgie filtrante pouvant entraîner des troubles visuels, diminution de la sensibilité cornéenne, sécheresse oculaire, érosion cornéenne (lésion de la couche antérieure du globe oculaire), affaissement de la paupière supérieure (obligeant l'œil à rester mi-clos), vision double.

- Focissement de la peau autour des yeux, modifications des cils et des poils fins autour des yeux (augmentation du nombre, de la longueur, de l'épaisseur et du noircissement), modification de la direction de la pousse des cils, gonflement autour de l'œil, gonflement de la partie colorée de l'œil (iris/luvéite), cicatrisation de la surface oculaire.
- Sifflements/bourdonnements d'oreilles (acouphènes).
- Angine de poitrine, aggravation de l'angine de poitrine chez les patients déjà atteints d'une maladie cardiaque.

• Ralentissement du rythme cardiaque, douleurs thoraciques, palpitations (perception du rythme cardiaque), œdème (accumulation de liquide), modifications du rythme ou de la vitesse des battements cardiaques, insuffisance cardiaque congestive (maladie cardiaque avec essoufflement et gonflement des pieds et des jambes dû à l'accumulation de liquide), trouble du rythme cardiaque, crise cardiaque, insuffisance cardiaque.

- Hypotension artérielle, mauvaise circulation sanguine entraînant un engourdissement et une pâleur des doigts et des oreilles, maux et pieds froids (phénomène de Raynaud).
- Constriction des voies respiratoires (principalement chez les patients présentant une maladie préexistante), difficultés respiratoires, toux, essoufflement, asthme, aggravation de l'asthme.
- Troubles du goût, nausées, indigestion, diarrhée, sécheresse buccale, douleurs abdominales, vomissements.

• Perte de cheveux, éruption cutanée d'aspect blanc argenté (éruption psoriasiforme) ou aggravation du psoriasis, éruption cutanée.

• Douleurs articulaires, douleurs musculaires non liées à l'exercice, faiblesse musculaire, fatigue.

• Dysfonction sexuelle, baisse de la libido.

• Dans de très rares cas, certains patients présentant une lésion grave de la couche transparente située à l'avant de l'œil (la cornée) ont développé des zones troubles sur la cornée en raison de l'accumulation de calcium pendant le traitement.

### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet secondaire, parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière.

### 5. Comment conserver les gouttes oculaires Latmo?

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants. N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée après EXP sur la boîte et le flacon. La date de péremption fait référence au dernier jour du mois.

Conservez le flacon non ouvert au réfrigérateur (entre 2 °C et 8 °C). Après ouverture, ne l'utilisez pas pendant plus de 4 semaines. Lorsque vous n'utilisez pas les gouttes ophtalmiques Latmo, conservez le flacon dans l'emballage extérieur à l'abri de la lumière.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien comment éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à la protection de l'environnement.

### 6. Contenu de l'emballage et autres informations

Contenu du collyre Latmo

Les substances actives sont le latanoprost et le maléate de timolol. Chaque ml de solution contient 50 microgrammes de latanoprost et 6,3 mg de maléate de timolol, soit 5 mg de timolol. Les autres composants sont : chlorure de benzalkonium (conservateur), phosphate disodique anhydre, phosphate monosodique monohydraté, méthocel E4M, chlorure de sodium, acide chlorhydrique, hydroxyde de sodium et eau pour préparations injectables.

Voilà la rubrique 2 « Le collyre Latmo contient des tampons de chlorure de benzalkonium et de phosphate » pour plus d'informations.

### Aspect du collyre Latmo et contenu de l'emballage extérieur :

Le collyre Latmo est une solution limpide et incolore contenue dans un flacon en PEBD. Contenance : 1 flacon de 2,5 ml.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Informations de prescription complètes disponibles sur demande



**SHAIGAN PHARMACEUTIQUES (PVT) LTD.**  
14 Km, route Adyala, bureau de poste Dahgal Rawalpindi-Pakistan  
www.shaigan.com

(Rev. No.02)  
30/07/2022

## SINGLE COLOR PRINTING LEAFLET .

ALL BRAND NAME, HEADING & COMPANY NAME Latmo Eye drop SIZE OF AUTO LEAFLET  
0%C+0%M+0%Y+100%K = BLACK FRONT: 133.35mm. x 161.925mm.

NOTE: 1: Before starting the printing job ensures that you have approved 1st.Computer print proof, 2nd. Machine print proof, 3rd.Colors tolerance shade cards 4th. Complete print job profile, 2: Follow pantone book for colors matching, don't follow colors computer display & computer prints. 3: Process and print last received REVISE DESIGN CD only. 4: Do not allow the REMAKE of received design.

## DOC.#: 4-GD-01,02 GRAPHIC DESIGN OUTPUT APPROVAL TAG <sup>3</sup>

<input type="checkbox"/> New Design <input checked="" type="checkbox"/> Change Design	Manager Design (Design Creator) Q.A. Manager (Text Validate) Production Manager (Size Validate)	Rev. No.02	Rev. Date:30.09.2025	File No.C-03
---	--	------------	----------------------	--------------

SIZE: H:6.375 x W:5.25 in	MATERIAL: Paper: High K 70g.	PRINTING:Base: 0 + Product: 1 = 1 Pantone Colors	BASE/COATING: Nil
---------------------------	------------------------------	--	-------------------