

L-210 x H-180mm

Ciprofloxacin and Ornidazole Tablets

ORNI-CP

Tablets

COMPOSITION: Each tablet contains:

- Ciprofloxacin 500 mg
- Ornidazole 500 mg Tablets

PHARMACOLOGY: ORNI-CP is a combination of Ciprofloxacin and Ornidazole. Ciprofloxacin is a fluoroquinolone antibiotic with broad-spectrum bactericidal activity. Ornidazole is an antimicrobial agent that is used to treat protozoal and anaerobic bacterial infections. The combination of Ciprofloxacin and Ornidazole offers broad-spectrum coverage against a range of bacterial and protozoal infections.

INDICATIONS AND USAGE ORNI-CP™ is indicated for the treatment of the following infections caused by susceptible bacteria and protozoa:

- Mixed bacterial and protozoal infections
- Intra-abdominal infections
- Gynecological infections (e.g., pelvic inflammatory disease)
- Surgical prophylaxis for colorectal surgery
- Diarrhea and dysentery

DOSAGE AND ADMINISTRATION Adults: Take one tablet of ORNI-CP™ twice daily, or as directed by your healthcare professional. The dosage and duration of treatment may be adjusted based on the severity of the infection and response to therapy.

Swallow the tablet whole with a full glass of water. Do not crush or chew the tablet. It is preferable to take ORNI-CP™ on an empty stomach, at least 1 hour before or 2 hours after a meal.

CONTRAINDICATIONS ORNI-CP is contraindicated in patients with:

- Known hypersensitivity to Ciprofloxacin, Ornidazole, or any of the inactive ingredients in this product

- History of tendon disorders related to fluoroquinolone use
- Seizure disorders or a history of seizures
- First trimester of pregnancy
- Breastfeeding

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Use with caution in patients with a history of renal or hepatic impairment, myasthenia gravis, or glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) deficiency.
- May cause dizziness or drowsiness. Do not drive or operate machinery until you know how ORNI-CP affects you.
- Discontinue treatment and contact your healthcare professional if you experience tendon pain, swelling, or inflammation.

DRUG INTERACTIONS ORNI-CP may interact with other medications. Inform your healthcare professional of all prescription and non-prescription medications you are currently taking. Some examples of medications that may interact with ORNI-CP™ include:

- Antacids, iron, or zinc supplements
- Theophylline
- Warfarin
- Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
- Oral contraceptives

ADVERSE REACTIONS Possible adverse reactions of ORNI-CP™ may include:

- Nausea or vomiting
- Diarrhea or constipation
- Abdominal pain
- Headache or dizziness
- Rash or itching

If any adverse reactions persist or worsen, contact your healthcare professional immediately. Serious side effects, although rare, may include:

- Severe allergic reactions (e.g., difficulty breathing, swelling of the face or throat)
- Tendon rupture or tendonitis
- Seizures or convulsions

- Severe diarrhea (Clostridium difficile-associated diarrhea)
In case of any severe or unusual side effects, seek immediate medical attention.

OVERDOSAGE In case of overdose, discontinue ORNI-CP™ and seek immediate medical attention. Symptoms of overdose may include dizziness, nausea, vomiting, and seizures. Treatment should be symptomatic and supportive, including maintaining adequate hydration and monitoring vital signs.

STORAGE Store at room temperature (15-30°C). Protect from light and moisture. Keep out of reach of children.

Pack style:
3*10 Tablets

MANUFACTURED IN INDIA BY:

Sai Primus Life Biotech Private Limited
(A WHO-GMP Certified Company)
R.S. No.: 4/3, Plot No.: 33, Kurumbapet
Industrial Estate,
Villianur Commune, Puducherry-605009.

For additional information, consult the full prescribing information or contact your healthcare professional.

L-210 x H-180mm

Ciprofloxacine et Ornidazole Comprimés

ORNI-CP

Comprimés

COMPOSITION : Chaque comprimé contient :
Ciprofloxacine 500 mg
Ornidazole 500 mg Comprimés

PHARMACOLOGIE : ORNI-CP est une combinaison de ciprofloxacine et d'ornidazole. La ciprofloxacine est un antibiotique fluoroquinolone à activité bactéricide à large spectre. L'ornidazole est un agent antimicrobien utilisé pour traiter les infections bactériennes protozoaires et anaérobies. La combinaison de ciprofloxacine et d'ornidazole offre une couverture à large spectre contre une gamme d'infections bactériennes et protozoaires.

INDICATIONS ET UTILISATION ORNI-CP™ est indiqué pour le traitement des infections suivantes causées par des bactéries sensibles et des protozoaires:

- Infections bactériennes et protozoaires mixtes
- Infections intra-abdominales
- Infections gynécologiques (p. ex. maladie inflammatoire pelvienne)
- Prophylaxie chirurgicale pour la chirurgie colorectale
- Diarrhée et dysenterie

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION Adultes : Prendre un comprimé d'ORNI-CP™ deux fois par jour ou selon les directives de votre professionnel de la santé. La posologie et la durée du traitement peuvent être ajustées en fonction de la gravité de l'infection et de la réponse au traitement. Avalez le comprimé entier avec un grand verre d'eau. Ne pas écraser ou mâcher le comprimé. Il est préférable de prendre ORNI-CP™ à jeun, au moins 1 heure avant ou 2 heures après un repas.

CONTRE-INDICATIONS ORNI-CP est contre-indiqué chez les patients présentant :

- Hypersensibilité connue à la ciprofloxacine, à l'ornidazole ou à l'un des ingrédients inactifs de ce produit
- Antécédents de troubles tendineux liés à l'utilisation de fluoroquinolones
- Troubles convulsifs ou antécédents de convulsions
- Premier trimestre de la grossesse
- Allaitement

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

- Utiliser avec prudence chez les patients ayant des antécédents d'insuffisance rénale ou hépatique, de myasthénie grave ou de déficit en glucose-6-phosphate déshydrogénase (G6PD).
- Peut causer des étourdissements ou de la somnolence. Ne conduisez pas ou n'utilisez pas de machines avant de savoir comment ORNI-CP vous affecte.
- Interrompez le traitement et communiquez avec votre professionnel de la santé si vous ressentez une douleur, une enflure ou une inflammation des tendons.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ORNI-CP peut interagir avec d'autres médicaments. Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments sur ordonnance et en vente libre que vous prenez actuellement. Voici quelques exemples de médicaments qui peuvent interagir avec l'ORNI-CP™ :

- Antiacides, suppléments de fer ou de zinc
- Théophylline
- Warfarine
- Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
- Contraceptifs oraux

EFFETS INDÉSIRABLES Les effets indésirables possibles de l'ORNI-CP™ peuvent inclure:

- Nausées ou vomissements
- Diarrhée ou constipation
- Douleur abdominale
- Maux de tête ou étourdissements

- Éruption cutanée ou démangeaisons

Si les effets indésirables persistent ou s'aggravent, communiquez immédiatement avec votre professionnel de la santé. Les effets secondaires graves, bien que rares, peuvent inclure:

- des réactions allergiques graves (par ex. une difficulté respiratoire, une enflure du visage ou de la gorge) ;
- Rupture du tendon ou tendinite
- Convulsions ou convulsions
- Diarrhée sévère (diarrhée associée à Clostridium difficile)

En cas d'effets secondaires graves ou inhabituels, consulter immédiatement un médecin.

SURDOSAGE En cas de surdosage, arrêter ORNI-CP™ et consulter immédiatement un médecin. Les symptômes de surdosage peuvent inclure des étourdissements, des nausées, des vomissements et des convulsions. Le traitement doit être symptomatique et de soutien, y compris le maintien d'une hydratation adéquate et la surveillance des signes vitaux.

ENTREPOSAGE Conserver à température ambiante (15-30°C). Protéger de la lumière et de l'humidité. Tenir hors de portée des enfants.

Style de pack:
3*10 Comprimés

FABRIQUÉ EN INDE PAR:

Sai Primus Life Biotech Private Limited
(Une entreprise certifiée OMS-GMP)
N° R.S.: 4/3, Parcelle n°: 33, Zone industrielle de Kurumbapet,
Commune de Villianur, Pondichéry-605009.

Pour de plus amples renseignements, consultez les renseignements posologiques complets ou communiquez avec votre professionnel de la santé.