


180 mm
372

46.50 mm
372

90 mm
372

370 mm
372



**Loperamide Hydrochloride Oral Lyophilisate 2 mg**

**Read all of this leaflet carefully before you start taking this medicine because it contains important information for you.**

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor, pharmacist or nurse has told you.

- Keep this leaflet. You may need to read it again.
- Ask your pharmacist if you need more information or advice.
- If you get any side effects, talk to your doctor, pharmacist or nurse. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. See section 4.

You must talk to a doctor if you do not feel better or if you feel worse after 2 days.

**What is in this leaflet**

- What Gaslopid Rapid is and what it is used for?
- What you need to know before you take Gaslopid Rapid?
- How to take Gaslopid Rapid?
- Possible side effects
- How to store Gaslopid Rapid?
- Contents of the pack and other information

**1. What Gaslopid Rapid is and what it is used for?**

This medicine contains Loperamide Hydrochloride which helps to stop diarrhea by making the stools more solid and less frequent. This medicine is used for the treatment of sudden short-lived (acute) attacks of diarrhea in adults and adolescents over 12 years of age. **This medicine must not be used for more than 2 days without medical advice and surveillance.**

**2. What you need to know before you take Gaslopid Rapid?**

**Do not take Gaslopid Rapid, if:**

- Patients with a known hypersensitivity to Loperamide Hydrochloride or to any of the excipients (listed in section 6);
- Children aged less than 12 years of age.
- Patients with acute dysentery, which is characterized by blood in stools and elevated body temperature.
- Patients with acute ulcerative colitis.
- Patients with bacterial enterocolitis caused by invasive organisms including Salmonella, Shigella and Campylobacter.
- Patients with pseudomembranous colitis associated with the use of broad spectrum antibiotics.
- In all cases where normal bowel movements should not be suppressed. Administration should be stopped immediately in case of constipation or abdominal swelling.

If any of these applies to you, talk to a doctor or pharmacist before taking Loperamide Hydrochloride.

**Warnings and precautions**

Talk to your doctor, pharmacist or nurse before taking this medicine, if:

- You have AIDS and your stomach becomes swollen, stop taking the oral lyophilisate immediately and see your doctor immediately;
- You suffer from liver disease;
- You have diarrhea that lasts for more than 48 hours stop taking the medicine and consult your doctor.
- You have severe diarrhea, you will lose a lot of fluid (dehydration). With this fluid, other important substances are also lost. Symptoms of dehydration may include dry mouth and/or dizziness. The vomiting may lead to dehydration. Danger of dehydration exists especially in young children and the elderly. They should therefore be the first measure for diarrhea: supplement and maintain the fluid in the body. That means: drink a lot, and supplement sugar and salt. At the pharmacy or drug store you can get a special salt-sugar mixture (ORS), which has to be dissolved in water. Ask your doctor or pharmacist for advice.

**Other medicines and Gaslopid Rapid**

Tell your doctor or pharmacist if you are taking, have recently taken or might take any other medicines. In particular if you are taking any of the following medicines:

- Ritonavir (used to treat HIV).
- Quinidine (used to treat abnormal heart rhythms or malaria).
- Oral desmopressin (used to treat excessive urination).
- Itraconazole or ketoconazole (used to treat fungal infections).
- Gemfibrozil (used to treat high cholesterol).

If you are not sure about any of the medicines you are taking, show the bottle or pack to your pharmacist. If any of these applies to you (now or in the past), talk to a doctor or pharmacist.

**Pregnancy, breast-feeding and fertility**

If you are pregnant or breast-feeding, think you may be pregnant or are planning to have a baby, ask your doctor or pharmacist for advice before taking this medicine.

**Pregnancy:** The use of Gaslopid Rapid should be avoided during pregnancy, especially during the first trimester of pregnancy.

**Breast-feeding:** Small amounts may get into your milk. Talk to your doctor about a suitable treatment.

**Driving and using machines**

During diarrhea you can feel dizzy, tired or sleepy. If affected you should not drive or operate machinery or take part in activities where these may put you or others at risk.

**3. How to take Gaslopid Rapid?**

Always take this medicine exactly as described in this leaflet or as your doctor or pharmacist have told you. Check with your doctor or pharmacist if you are not sure.

**Check the table below to see how much medicine to take.**

- Peel back the lid and tip the oral lyophilisate out. Do not push the oral lyophilisate through the lid.
- Place the correct number of oral lyophilisates on the tongue. The oral lyophilisate dissolve quickly in your mouth, so you don't need water to swallow them. Do not chew. For oral use only.
- Do not use more than the dose shown in the tables.
- The oral lyophilisates are not for long-term treatment.

**Short-term diarrhea**

Age	Initial dose	Repeat dose	Max. daily dose
Adolescents aged 12 years and over	1 oral lyophilisate	1 oral lyophilisate after each loose stool, not earlier than 1 hour after the initial dose.	4 oral lyophilisates
Adults	2 oral lyophilisates	1 oral lyophilisate after each loose stool, not earlier than 1 hour after the initial dose	6 oral lyophilisates

**IBS diarrhea**

Age	Initial dose	Repeat dose	Max. daily dose
Adults aged 18 and over	2 oral lyophilisates	1 oral lyophilisate after each loose stool, not earlier than 1 hour after the initial dose.	6 oral lyophilisates

Do not exceed the max. daily dose.  
Do not take for attacks lasting longer than 2 days.

Replace lost fluid by drinking more liquid than usual.

**Elderly**  
No dose adjustment is required for the elderly.

**Kidney problems**  
No dose adjustment is required for patients with impaired kidney function.

**Liver problems**  
If you suffer from liver impairment you should ask your doctor or pharmacist before you take this medicine.

**How long to take Gaslopid Rapid for short-term diarrhea**  
You can use this medicine for up to 48 hours in acute diarrhea.  
If the attack of diarrhea lasts longer than 48 hours, or if you suffer from repeated diarrheal attacks or if your symptoms change, stop taking Gaslopid Rapid and talk to your doctor.

**If you take more Gaslopid Rapid than you should**  
If you have taken too many Gaslopid Rapid immediately contact a doctor or hospital for advice. Symptoms may include: increased heart rate, irregular heartbeat, changes to your heartbeat (these symptoms can have potentially serious, life-threatening consequences), muscle stiffness, uncoordinated movements, drowsiness, difficulty in urinating, or weak breathing.  
Children react more strongly to large amounts of Gaslopid Rapid than adults. If a child takes too much or shows any of the above symptoms, call a doctor immediately.

**If you forget to take Gaslopid Rapid ?**  
You should only take this medicine as you need it, following the dosage instructions above carefully.  
If you forget to take a dose, take a dose after the next loose stool (bowel movement). Do not take a double dose to make up for a forgotten dose.

**4. Possible side effects**  
Like all medicines, this medicine can cause side effects, although not everybody gets them, most are usually mild.

**Get medical help at once**

**Common:** (may affect up to 1 in 10 people)

- Feeling sick, constipation or wind.
- Headache.

**Uncommon:** (may affect up to 1 in 100 people)

- Itchiness or hives.
- Stomach pain or swollen stomach.
- Dizziness or drowsiness.
- Vomiting, indigestion.
- Dry mouth.

**Rare:** (may affect up to 1 in 1,000 people)

- Allergic reactions including unexplained wheezing, shortness of breath, passing out or swelling of face and throat.
- Skin rashes, which may be severe and include blistering or peeling skin.
- Loss of consciousness or reduced level of consciousness (passing out, feeling faint or less alert), uncoordinated movements.
- Difficulties in passing water.
- Severe constipation.
- Burning or pricking sensation of the tongue.
- Miosis (narrowing of the pupils of the eye).
- Tiredness.

**Not known:** (frequency cannot be estimated from the available data)

- Upper abdominal pain.
- Abdominal pain that radiates to back.
- Tenderness when touching the abdomen.
- Fever.
- Rapid pulse.
- Nausea.
- Vomiting.
- Which may be symptoms of inflammation of the pancreas (acute pancreatitis).

If you get any of these, stop using the medicine and get medical help at once. **Talk to a doctor as soon as possible.**

**Reporting of side effects**  
If you experience any side effects, talk to your doctor or pharmacist. This includes any possible side effects not listed in this leaflet. You can also report side effects by visiting the [www.strides.com/contact\\_DS.aspx](http://www.strides.com/contact_DS.aspx) website or emailing us at [drugsafety@strides.com](mailto:drugsafety@strides.com). By reporting side effects, you help provide more information about the safety of the medicine.

**5. How to store Gaslopid Rapid?**  
**Storage:** Store below 30°C. Keep out of sight and reach of children.  
Do not use this medicine after the expiry date. The expiry date refers to the last day of that month.  
This medicinal product does not require any special storage conditions.  
Do not throw away medicines via wastewater or household waste.  
Ask your pharmacist how to throw away medicines you no longer use. These measures will help protect the environment.  
**Shelf Life:** 24 Months

**6. Contents of the pack and other information**

**What Gaslopid Rapid contains?**  
Each Oral Lyophilisate Contains:  
Loperamide Hydrochloride 2 mg  
Excipients q.s.

**List of excipients:** Pullulan (E1204); Mannitol (E421); Sodium Hydrogen carbonate (E 500); Aspartame (E951); Polysorbate 80 (E433); Peppermint flavour.

**Excipients with known effect:** Aspartame (E 951) & Mannitol (E421)  
This medicine each dosage unit contains 1 mg of Aspartame equivalent to 17.65 mg of tablet weight.  
Aspartame is a source of phenylalanine. It may be harmful if you have phenylketonuria (PKU), a rare genetic disorder in which phenylalanine builds up because the body cannot remove it properly.  
Mannitol (E421)- It may cause mild laxative effect.

**What Gaslopid Rapid looks like and contents of the pack?**  
White to off-white, round, lyophilized tablet, debossed with 'T' on one side.  
Packing configuration: 1x6's.

**PRESCRIBING AND DISPENSING CONDITIONS**  
List - II

TM: Trademark

<p>Manufactured by :</p> <p><b>Tenshi Kaizen Pvt. Ltd.</b> Plot No.46, 1st phase, KIADB Industrial area Harohalli, Kanakapura Taluk, Ramanagara district-562112, Karnataka, India.</p>	<p>Marketed by :</p> <p><b>Strides</b> <b>Strides Pharma Science Limited</b> Strides House, Bilekahalli, Bannerghatta Road, Bangalore – 560076, Karnataka, India.</p>
--	---

Date of revision August, 2023

Front

180 x 370 mm

**CMO - ARTWORK DETAIL LABEL**

		MFG. LOCATION	Tenshi		
PRODUCT	GASLOPID RAPID				
BUYER/COUNTRY	French Africa	COMPONENT	Pack Insert		
DIMENSION	W 180 x H 370 mm		PACK	-----	
NEW ITEM CODE	1048309(1200007256)	OLD ITEM CODE	NA		
COLOUR SHADES	Black	No. of Colours	1		
Change Control No.	NA	Artwork Version	1.0		
Design/Style	Front & Back Printing. To be supplied with folded size 90x46.5 mm. Brand name appearing Top.				
Substrate	40 GSM bible paper				
Special Instructions	Printing clarity to be clear and sharp. Please use fine screens.				
Autocartanator Requirements	NA				
<p><b>Caution to the printer:</b> Before processing, please ensure that the ARTWORK received for printing is exactly in line with APPROVED ARTWORK provided to you. In case of any FONTS/DESIGN are Mis-matching with the APPROVED ARTWORK, please inform SCM / PD for further action. <b>DO NOT MAKE ANY CHANGE TO THE ARTWORK WITHOUT WRITTEN INSTRUCTIONS FROM SCM / PD.</b></p>					

RD/PD/008/F-01/R0

180 mm

370 mm

**GASLOPID™**  
**RAPID**
Chlorhydrate de loperamide **2 mg** lyophilisat oral

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmier/ère.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable parlez-en à votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable éventuel qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez parler à un médecin si vous ne vous sentez pas mieux ou si vous sentez plus mal après 2 jours.

#### Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Gaslopid Rapid et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Gaslopid Rapid ?
3. Comment prendre Gaslopid Rapid ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Gaslopid Rapid ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations

#### 1. Qu'est-ce que Gaslopid Rapid et dans quel cas est-il utilisé ?

Ce médicament contient du Chlorhydrate de Loperamide qui aide à arrêter la diarrhée en rendant les selles plus solides et moins fréquentes. Ce médicament est utilisé pour le traitement des épisodes soudains et de courte durée (aigus) de diarrhée chez les adultes et les adolescents de plus de 12 ans. **Ce médicament ne doit pas être utilisé pendant plus de 2 jours sans avis et surveillance médicale.**

#### 2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Gaslopid Rapid ?

Ne pas prendre Gaslopid Rapid dans les cas suivants :

- patients présentant une hypersensibilité connue au Chlorhydrate de Loperamide ou à l'un des excipients (indiqués dans la rubrique 6) ;
- enfants âgés de moins de 12 ans.
- patients atteints de dysenterie aiguë, qui se caractérise par la présence de sang dans les selles et une température corporelle élevée.
- patients présentant une colite ulcéreuse aiguë
- patients présentant une entérocolite bactérienne causée par des organismes invasifs, notamment Salmonella, Shigella et Campylobacter
- patients présentant une colite pseudomembraneuse associée à l'utilisation d'antibiotiques à large spectre
- dans tous les cas où les excréments normaux ne doivent pas être supprimés. L'administration doit être arrêtée immédiatement en cas de constipation ou de gonflement abdominal.

Si l'une de ces conditions s'applique à vous, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre le Chlorhydrate de Loperamide.

#### Mises en garde et précautions

Parlez avec votre médecin, votre pharmacien ou votre infirmière avant de prendre ce médicament si :

- vous avez le SIDA et votre estomac devient gonflé, arrêtez immédiatement de prendre les lyophilisats oraux et consultez immédiatement votre médecin ;
- vous souffrez d'une maladie du foie ;
- vous avez une diarrhée qui dure plus de 48 heures, arrêtez de prendre le médicament et consultez votre médecin.
- vous avez une diarrhée sévère, vous perdrez beaucoup de liquide (déshydratation). Avec ce liquide, d'autres substances importantes sont également perdues. Les symptômes de déshydratation peuvent inclure : sécheresse buccale et/ou étourdissements. Les vomissements peuvent entraîner une déshydratation. Le danger de déshydratation existe surtout chez les jeunes enfants et les personnes âgées. En cas de diarrhée la première action à prendre doit être compenser ou corriger les pertes et maintenir l'hydratation du corps. Cela signifie boire beaucoup et obtenir un complément de sucre et de sel. En pharmacie, vous pouvez obtenir un mélange spécial de sel et de sucre (SRO), qui doit être dissous dans l'eau. Demandez conseil à votre médecin ou pharmacien.

#### Autres médicaments et Gaslopid Rapid

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. En particulier si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- ritonavir (utilisé pour traiter le VIH)
- quinine (utilisé pour traiter les rythmes cardiaques anormaux ou le paludisme)
- desmopressine orale (utilisée pour traiter la miction excessive)
- itraconazole ou kétoconazole (utilisés pour traiter les infections fongiques)
- gemfibrozil (utilisé pour traiter les taux de cholestérol élevés).

Si vous n'êtes pas sûr de l'un des médicaments que vous prenez, montrez la bouteille ou l'emballage à votre pharmacien. Si vous prenez ou avez pris l'un de ces médicaments (maintenant ou dans le passé), parlez-en à un médecin ou à un pharmacien.

#### Grossesse, allaitement et fertilité

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

**Grossesse :** L'utilisation de Gaslopid Rapid doit être évitée pendant la grossesse, en particulier au cours du premier trimestre de la grossesse.

**Allaitement :** De petites quantités peuvent passer dans votre lait. Parlez à votre médecin d'un traitement approprié.

#### Conduite de véhicules et utilisation de machines

Lorsque vous avez la diarrhée, vous pouvez vous sentir étourdi, fatigué ou endormi. Si vous êtes affecté(e), vous ne devez pas conduire, utiliser des machines ou prendre part à des activités qui pourraient vous mettre en danger, vous ou d'autres personnes.

#### 3. Comment prendre Gaslopid Rapid ?

Vous devez toujours prendre ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou votre pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Vérifiez le tableau ci-dessous pour savoir quelle quantité de médicament prendre.

- Retirez le couvercle et faites sortir le lyophilisat oral. Ne pas pousser les lyophilisats oraux à travers le couvercle.
- Placez le bon nombre de lyophilisats oraux sur la langue. Les lyophilisats oraux se dissolvent rapidement dans la bouche, vous n'avez donc pas besoin d'eau pour les avaler. Ne pas mâcher. Pour une utilisation orale uniquement.
- Ne pas utiliser plus que la dose indiquée dans les tableaux.
- Les lyophilisats oraux ne sont pas pour un traitement à long terme.

#### Diarrhée de courte durée

Âge	Dose initiale	Dose répétée	Dose quotidienne maximale
Adolescents de 12 ans et plus	1 lyophilisat oral	1 lyophilisat oral après chaque selle molle, pas au plus tôt 1 heure après la dose initiale	4 lyophilisats oraux
Adultes	2 lyophilisats oral	1 lyophilisat oral après chaque selle molle, pas au plus tôt 1 heure après la dose initiale.	6 lyophilisats oraux

#### Diarrhée associée au Syndrome du Colon Irritable (SCI)

Âge	Dose initiale	Dose répétée	Dose quotidienne maximale
Adultes âgés de 18 ans et plus	2 lyophilisats oral	1 lyophilisat oral après chaque selle molle, pas au plus tôt 1 heure après la dose initiale.	6 lyophilisats oraux

Diarrhée à court term Ne pas dépasser la dose quotidienne maximale.

Ne pas en prendre pour les épisodes qui durent plus de 2 jours.

Remplacer le liquide perdu en buvant plus de liquide que d'habitude.

#### Personnes âgées

Aucun ajustement de la dose n'est nécessaire chez les personnes âgées.

#### Problèmes rénaux

Aucun ajustement de la dose n'est nécessaire pour les patients présentant une fonction rénale altérée.

#### Problèmes hépatiques

Si vous souffrez d'une insuffisance hépatique, vous devez demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien avant de prendre ce médicament.

#### Pendant combien de temps faut-il prendre Gaslopid Rapid en cas de diarrhée de courte durée ?

Vous pouvez utiliser ce médicament pendant une durée maximale de 48 heures en cas de diarrhée aiguë.

Si l'épisode de diarrhée dure plus de 48 heures, si vous souffrez d'épisodes diarrhéiques répétés ou si vos symptômes changent, arrêtez de prendre le Gaslopid Rapid et parlez-en à votre médecin.

Vous pouvez utiliser ce médicament pendant une durée maximale de 2 semaines en cas d'épisodes répétés de diarrhée associée au Syndrome du Colon Irritable (SCI). Mais si un quelconque épisode dure plus de 48 heures, arrêtez de prendre le Chlorhydrate de Loperamide et parlez-en à votre médecin.

#### Si vous prenez plus de Gaslopid Rapid que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop de Gaslopid Rapid, contactez immédiatement votre médecin ou un hôpital pour obtenir des conseils. Les symptômes peuvent comprendre : augmentation de la fréquence cardiaque, fréquence cardiaque irrégulière, changements dans la fréquence cardiaque (ces symptômes peuvent avoir des conséquences potentiellement graves, voire mortelles), raideurs musculaires, mouvements non coordonnés, somnolence, difficultés à uriner ou difficulté respiratoire.

Les enfants réagissent plus fortement que les adultes à de grandes quantités de Chlorhydrate de Loperamide. Si un enfant en prend trop ou présente l'un des symptômes ci-dessus, appelez immédiatement un médecin.

#### Si vous oubliez de prendre Gaslopid Rapid

Vous ne devez prendre ce médicament qu'en fonction de vos besoins, en suivant scrupuleusement les instructions posologiques ci-dessus.

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la après les prochaines selles molles. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### 4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, bien qu'ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. La plupart sont d'intensité légère.

Obtenez une aide médicale immédiatement

#### Fréquent : (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 10)

- Sentiment d'être malade, constipation ou flatulence.
- Mal de tête.

#### Peu fréquent : (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 100)

- Démangeaisons ou urticaire.
- Douleurs d'estomac ou estomac gonflé.
- Étourdissement ou somnolence.
- Vomissements, indigestion.
- Sécheresse buccale.

#### Rare : (peut affecter jusqu'à 1 personne sur 1,000)

- Réactions allergiques, incluant respiration sifflante inexplicable, essoufflement, évanouissements ou gonflement du visage et de la gorge.
- Eruptions cutanées, qui peuvent être sévères et inclure des cloques ou une desquamation de la peau.
- Perte de conscience ou niveau de conscience réduit (perte de connaissance, sensation de faiblesse ou manque de vigilance), mouvements non coordonnés.
- Difficultés à uriner.
- Constipation sévère.
- Sensation de brûlure ou de picotement de la langue.
- Myosis (rétrécissement des pupilles de l'œil).
- Fatigue.

**Fréquence indéterminée :** (la fréquence ne peut être estimée à partir des données disponibles)

- Douleur à la partie supérieure de l'abdomen.
- Douleur abdominale qui irradie dans le dos.
- Sensibilité quand on touche l'abdomen.
- Fièvre.
- Pouls rapide.
- Nausée.
- Vomissement.
- Ceux-ci peuvent être des symptômes d'une inflammation du pancréas (pancréatite aiguë).

Si vous présentez l'un de ces symptômes, arrêtez d'utiliser le médicament et obtenez une aide médicale immédiatement. **Parlez à un médecin dès que possible.**

#### Déclaration des effets indésirables

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable éventuel qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également signaler les effets indésirables en visitant le site [www.strides.com/contact\\_DS.aspx](http://www.strides.com/contact_DS.aspx) ou en nous envoyant un courriel à [drugsafety@strides.com](mailto:drugsafety@strides.com). En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. Comment conserver Chlorhydrate de Loperamide 2 mg Lyophilisat Oral ?

**Conservation :** Conserver à une température inférieure à 30°C. Garder hors de la vue et de la portée des enfants.

Ne pas utiliser ce médicament après la date d'expiration qui est indiquée sur la boîte en carton et le blister après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour de ce mois.

Ce médicament ne nécessite aucune condition de conservation particulière.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

**Durée de conservation :** 24 mois

#### 6. Contenu de l'emballage et autres informations

Ce que contient Gaslopid Rapid :

Chaque lyophilisat oral contient :

Chlorhydrate de Loperamide 2 mg

Excipients q.s.

**Liste des excipients :** Pullulan (E1204) ; Mannitol (E421) ; Hydrogénophosphate sodique ; Aspartame (E951) ; Polysorbate 80 (E433) ; Arôme de menthe poivrée.

#### Composants de l'arôme de menthe poivrée :

Mallodextrine de maïs ; Préparation d'arôme ; Amidon de maïs cireux modifié, 1450

**Excipients à effet notoire :** Aspartame (E 951) et Mannitol (E421)

Ce médicament contient 1 mg d'aspartame par unité de prise, ce qui équivaut à 17,65 mg de poids de comprimé.

L'aspartame est une source de phénylalanine. Il peut être dangereux si vous souffrez de phénylcétonurie (PCU), une maladie génétique rare dans laquelle la phénylalanine s'accumule parce que le corps ne peut pas l'éliminer correctement.

Mannitol (E421) - Il peut provoquer un léger effet laxatif.

#### Qu'est-ce que Gaslopid Rapid et contenu de l'emballage ?

Comprimé lyophilisé blanc à blanc cassé, rond, portant l'inscription « T » d'un côté.

Configuration d'emballage : 1 x 6

#### CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE

Liste -II

TM: Trademark

Fabriqué par :	Commercialisé par :
Tenshi Kaizen Pvt. Ltd. Plot No.46, 1st phase, KJADB Industrial area Harohalli, Kanakapura Taluk, Ramanagara district-562112, Karnataka, Inde.	Strides Strides Pharma Science Limited Strides House, Blekahalli, Bannerghatta Road, Bangalore - 560076, Karnataka, Inde.
Date de révision Août 2023	1048309 1200007256

Back

180 x 370 mm

### ARTWORK DETAIL LABEL INFORMATION

Product	GASLOPID RAPID		
Buyer/Country	French Africa	Component	Pack Insert
Dimension	W180 x H370 mm	Pack	-----
New Item Code	1048309 (1200007256)	Old Item Code	NA
Colour Shades	Black	No. Of Colours	1

Change Control No.	NA	Artwork Version	1.0
Design/Style	Front & Back Printing. To be supplied with folded size 90x46.5 mm. Brand name appearing Top.		
Substrate	40 GSM bible paper		
Special Instructions	Printing Clarity to be clear and sharp. Please use fine screens		
Autocartanator Requirements	NA		

#### CAUTION TO THE PRINTER:

Before processing, please ensure that the ARTWORK received for printing is exactly in line with APPROVED ARTWORK provided to you. In case of any FONTS/DESIGN are Mis-matching with the APPROVED ARTWORK, please inform PD for further action. DO NOT MAKE ANY CHANGE TO THE ARTWORK WITHOUT WRITTEN INSTRUCTIONS FROM PD.

THR/PD/002/F-02/R1

### CMO - ARTWORK DETAIL LABEL

	MFG. LOCATION	Tenshi		
PRODUCT	GASLOPID RAPID			
BUYER/COUNTRY	French Africa	COMPONENT	Pack Insert	
DIMENSION	W 180 x H 370 mm	PACK	-----	
NEW ITEM CODE	1048309(1200007256)	OLD ITEM CODE	NA	
COLOUR SHADES	Black	No. of Colours	1	

Change Control No.	NA	Artwork Version	1.0
Design/Style	Front & Back Printing. To be supplied with folded size 90x46.5 mm. Brand name appearing Top.		
Substrate	40 GSM bible paper		
Special Instructions	Printing clarity to be clear and sharp. Please use fine screens.		
Autocartanator Requirements	NA		

**Caution to the printer:** Before processing, please ensure that the ARTWORK received for printing is exactly in line with APPROVED ARTWORK provided to you. In case of any FONTS/DESIGN are Mis-matching with the APPROVED ARTWORK, please inform SCM / PD for further action. DO NOT MAKE ANY CHANGE TO THE ARTWORK WITHOUT WRITTEN INSTRUCTIONS FROM SCM / PD.

RD/PD/008/F-01/R0