

NOTICE D'INFORMATION PATIENT
Informations pour le patient
Lardox DT
(6)

Comprimés dispersibles de sulfadoxine et pyriméthamine (250 mg/12,5 mg)

- Lisez attentivement toute cette notice avant de commencer le traitement.**
- Conservez cette notice. Il est peut-être que vous avez besoin de la relire.
 - Si vous avez des questions sur le médicament, demandez à votre médecin.
 - Ce médicament est un médicament à usage préventif. Il ne traite pas la maladie, mais aide à éviter qu'elle ne se développe.
 - Si vous ne sentez pas mieux, consultez votre médecin.
 - Si vous avez des effets secondaires, informez votre médecin.

- Qu'est-ce que ce médicament ?**
1. Ce médicament est un médicament à usage préventif.
 2. Ce médicament est un médicament à usage préventif.
 3. Ce médicament est un médicament à usage préventif.
 4. Ce médicament est un médicament à usage préventif.
 5. Ce médicament est un médicament à usage préventif.
 6. Ce médicament est un médicament à usage préventif.

Comment prendre le médicament ?

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Quelles sont les contre-indications ?

Ne prenez pas le médicament si vous êtes allergique à l'un des composants du médicament.

Quelles sont les précautions d'emploi ?

Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir.

Contre-indications et utilisation des machines

Ne prenez pas le médicament si vous êtes allergique à l'un des composants du médicament.

3. Comment prendre Lardox DT

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Effets secondaires

Consultez votre médecin si vous avez des effets secondaires.

Grossesse

Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir.

Mode d'administration

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Mode d'emploi

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Grossesse et allaitement

Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir.

Contre-indications et utilisation des machines

Ne prenez pas le médicament si vous êtes allergique à l'un des composants du médicament.

3. Comment prendre Lardox DT

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Effets secondaires

Consultez votre médecin si vous avez des effets secondaires.

Grossesse

Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir.

Mode d'administration

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Mode d'emploi

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Grossesse et allaitement

Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir.

Contre-indications et utilisation des machines

Ne prenez pas le médicament si vous êtes allergique à l'un des composants du médicament.

3. Comment prendre Lardox DT

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Effets secondaires

Consultez votre médecin si vous avez des effets secondaires.

Grossesse

Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir.

Mode d'administration

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Mode d'emploi

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Grossesse et allaitement

Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir.

Contre-indications et utilisation des machines

Ne prenez pas le médicament si vous êtes allergique à l'un des composants du médicament.

3. Comment prendre Lardox DT

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Effets secondaires

Consultez votre médecin si vous avez des effets secondaires.

Grossesse

Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir.

Mode d'administration

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Mode d'emploi

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Grossesse et allaitement

Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir.

Contre-indications et utilisation des machines

Ne prenez pas le médicament si vous êtes allergique à l'un des composants du médicament.

3. Comment prendre Lardox DT

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Effets secondaires

Consultez votre médecin si vous avez des effets secondaires.

Grossesse

Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir.

Mode d'administration

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Mode d'emploi

Prenez le médicament à jeun, avec un verre d'eau, à l'heure indiquée sur l'emballage.

Grossesse et allaitement

Consultez votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous envisagez de le devenir.

Size: 448 x 140 mm