

NOTICE D'INFORMATION PATIENT

Informations pour le patient

Laridox DT Forte

Comprimés dispersibles de sulfadoxine et pyriméthamine (500 mg/25 mg)

- Lisez attentivement toute cette notice avant de commencer à prendre votre médicament.**
- Si vous avez des questions sur le médicament, demandez à votre pharmacien.
 - Si vous ne pouvez pas lire ce document, demandez à votre pharmacien de vous l'expliquer.
 - Si vous ne pouvez pas lire ce document, demandez à votre pharmacien de vous l'expliquer.

- Qu'est-ce que Laridox DT Forte et à quel est-il utilisé ?**
1. C'est un médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes.
 2. C'est un médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes.
 3. C'est un médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes.
 4. C'est un médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes.

- Comment prendre Laridox DT Forte ?**
1. Prenez votre médicament à jeun, avec un verre d'eau.
 2. Prenez votre médicament à jeun, avec un verre d'eau.
 3. Prenez votre médicament à jeun, avec un verre d'eau.
 4. Prenez votre médicament à jeun, avec un verre d'eau.

- Qu'est-ce que Laridox DT Forte et à quel est-il utilisé ?**
1. C'est un médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes.
 2. C'est un médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes.
 3. C'est un médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes.
 4. C'est un médicament utilisé pour traiter les infections bactériennes.

- Si votre enfant est prémaaturé ou au cours de ses deux premiers mois de vie, demandez à votre pharmacien de vous l'expliquer.
- Si vous ne pouvez pas lire ce document, demandez à votre pharmacien de vous l'expliquer.

3. Comment prendre Laridox DT Forte

Prenez votre médicament à jeun, avec un verre d'eau.

Conservation

Conservez votre médicament à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Effets secondaires

Les effets secondaires les plus fréquents sont les maux de tête et les nausées.

Mode d'administration

Prenez votre médicament à jeun, avec un verre d'eau.

Mode d'emploi

Prenez votre médicament à jeun, avec un verre d'eau.

Grossesse et allaitement

Consultez votre médecin avant de prendre Laridox DT Forte si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

- Si votre enfant est prémaaturé ou au cours de ses deux premiers mois de vie, demandez à votre pharmacien de vous l'expliquer.
- Si vous ne pouvez pas lire ce document, demandez à votre pharmacien de vous l'expliquer.

3. Comment prendre Laridox DT Forte

Prenez votre médicament à jeun, avec un verre d'eau.

Conservation

Conservez votre médicament à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Effets secondaires

Les effets secondaires les plus fréquents sont les maux de tête et les nausées.

Mode d'administration

Prenez votre médicament à jeun, avec un verre d'eau.

Mode d'emploi

Prenez votre médicament à jeun, avec un verre d'eau.

Grossesse et allaitement

Consultez votre médecin avant de prendre Laridox DT Forte si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

- Si votre enfant est prémaaturé ou au cours de ses deux premiers mois de vie, demandez à votre pharmacien de vous l'expliquer.
- Si vous ne pouvez pas lire ce document, demandez à votre pharmacien de vous l'expliquer.

6. Contenu de l'emballage et autres informations

Chaque comprimé dispersible contient 500 mg de sulfadoxine et 25 mg de pyriméthamine.

Précautions d'emploi

Consultez votre médecin avant de prendre Laridox DT Forte si vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques.

Contre-indications

N'utilisez pas Laridox DT Forte si vous êtes allergique à l'un des composants.

Précautions d'emploi

Consultez votre médecin avant de prendre Laridox DT Forte si vous avez des problèmes rénaux ou hépatiques.

Mode d'administration

Prenez votre médicament à jeun, avec un verre d'eau.

Mode d'emploi

Prenez votre médicament à jeun, avec un verre d'eau.

XXXXXX

Size: 448 x 140 mm