

■ (70%) 527 C

SOLEXIM
SUSPENSION

Cefixime for oral suspension USP
Each 5 mL of reconstituted suspension contains
Cefixime Trihydrate USP
Eq. to Anhydrous Cefixime 100 mg
Excipients q.s.

Direction for reconstitution
Shake the bottle to loose the powder.
Slowly add boiled and cooled water upto the ring
mark on the bottle and shake well.
Add water if necessary to adjust the
volume upto the mark.
SHAKE WELL BEFORE USE.
Use the reconstituted suspension within 7 days.
The reconstituted suspension should be
stored in a refrigerator between 2° to 8°C.
Store below 30°C in a dry place,
protected from light.

SOLEXIM
SUSPENSION

CÉFIXIME POUR SUSPENSION
BUVABLE USP 60 ml

60 ml



Mfg. Lic No. / Lic. N°. Fab.: G/1195

Manufactured by/Fabriqué par

Sekar Healthcare Ltd.

Block No. 10-13, Sarkhej-Bavia Highway,
Changodar, Dist.- Ahmedabad - 382 213.
Gujarat. India.

Marketed by/Exploitant/Titulaire

Zrenie
Healthcare

Zrenie Healthcare Pvt. Ltd.
B 1208, Westgate, S G Highway,
Ahmedabad 380051, India

SOLEXIM

SUSPENSION

CEFIXIME FOR ORAL
SUSPENSION USP 60 ml

60 ml



Céfixime pour suspension buvable USP
Chaque 5 ml de suspension reconstituée contient :
Céfixime Trihydrate USP
Eq. à céfixime anhydre 100 mg
Excipients q.s.p.

Directive pour la reconstitution
Agitez le flacon contenant la poudre.
Ajouter de l'eau bouillie et refroidie jusqu'à la
marque circulaire sur le flacon et bien agiter.
Ajouter de l'eau si nécessaire pour ajuster le
volume jusqu'à la marque.

BIEN AGITER AVANT UTILISATION.

Utilisez la suspension reconstituée dans les 7 jours.
La suspension reconstituée doit être conservée
dans le réfrigérateur entre 2° à 8°C.

Conserver en dessous de 30°C dans un endroit sec,
Protéger de la lumière.

Posologie - Indications - Contre
Indications : voir notice LISTE I

**RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
FOLLOW THE PRESCRIBED DOSES**

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE
PRESCRIPTION ONLY MEDICINE
NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN



2D5U23CMGT

60 x 45 x 120 mm

**Unvarnished Area
for 2D barcode & Batch Details**

Lock Bottom (Pasting)

PANTONE SHADES		Blue 072 C		527 C		(70%) 527 C
		485 C		Black		



SOLEXIM
SUSPENSION

CEFIXIME FOR ORAL
SUSPENSION USP 60 ml

CÉFIXIME POUR SUSPENSION
BUVABLE USP 60 ml

60 ml



Cefixime for oral suspension USP
Each 5 ml of reconstituted suspension contains
Cefixime Trihydrate USP
Eq. to Anhydrous Cefixime 100 mg
Excipients q.s.
Direction for reconstitution
Shake the bottle to loose the powder.
Slowly add boiled and cooled water upto the ring
mark on the bottle and shake well.
Add water if necessary to adjust the
volume upto the mark.
SHAKE WELL BEFORE USE.
Use the reconstituted suspension within 7 days.
The reconstituted suspension should be
stored in a refrigerator between 2° to 8°C.
Store below 30°C in a dry place,
protected from light.
Manufactured by/Fabriqué par
Sakar Healthcare Ltd.
Block No. 10-13, Sarkhej-Bavla Highway,
Changodar, Dist.- Ahmedabad - 382 213.
Gujarat, India
Marketed by/Exploitant/Titulaire
Zrenie Healthcare
Zrenie Healthcare Pvt. Ltd.
B 1208, Westgate, S G Highway,
Ahmedabad 380051, India

Céfixime pour suspension buvable USP
Chaque 5 ml de suspension reconstituée contient :
Céfixime Trihydrate USP
Eq. à céfixime anhydre 100 mg
Excipients q.s.p.
Directive pour la reconstitution
Agitez le flacon contenant la poudre.
Ajouter de l'eau bouillie et refroidie jusqu'à la
marque circulaire sur le flacon et bien agiter.
Ajouter de l'eau si nécessaire pour ajuster le
volume jusqu'à la marque.
BIEN AGITER AVANT UTILISATION.
Utilisez la suspension reconstituée dans les 7 jours.
La suspension reconstituée doit être conservée
dans le réfrigérateur entre 2° à 8° C.
Conserver en dessous de 30° C dans un endroit sec,
Protéger de la lumière.

Mfg. Lic No. / Lic. N°. Fab.: G/1195
Batch No. /
N° de Lot
Mfg. Date /
Date de Fab
Exp. Date /
Date d'exp.



2DS023LMG01

110 x 45 mm

Unvarnished Area

ENLARGE COPY



SOLEXIM
SUSPENSION

CEFIXIME FOR ORAL
SUSPENSION USP 60 ml

CÉFIXIME POUR SUSPENSION
BUVABLE USP 60 ml


60 ml



Cefixime for oral suspension USP
Each 5 ml of reconstituted suspension contains
Cefixime Trihydrate USP
Eq. to Anhydrous Cefixime 100 mg
Excipients q.s.
Direction for reconstitution
Shake the bottle to loose the powder.
Slowly add boiled and cooled water upto the ring
mark on the bottle and shake well.
Add water if necessary to adjust the
volume upto the mark.
SHAKE WELL BEFORE USE.
Use the reconstituted suspension within 7 days.
The reconstituted suspension should be
stored in a refrigerator between 2° to 8°C.
Store below 30°C in a dry place,
protected from light.
Manufactured by/Fabriqué par
Sakar Healthcare Ltd.
Block No. 10-13, Sarkhej-Bavla Highway,
Changodar, Dist.- Ahmedabad - 382 213.
Gujarat, India
Marketed by/Exploitant/Titulaire
Zrenie Healthcare
Zrenie Healthcare Pvt. Ltd.
B 1208, Westgate, S G Highway,
Ahmedabad 380051, India

Céfixime pour suspension buvable USP
Chaque 5 ml de suspension reconstituée contient :
Céfixime Trihydrate USP
Eq. à céfixime anhydre 100 mg
Excipients q.s.p.
Directive pour la reconstitution
Agitez le flacon contenant la poudre.
Ajouter de l'eau bouillie et refroidie jusqu'à la
marque circulaire sur le flacon et bien agiter.
Ajouter de l'eau si nécessaire pour ajuster le
volume jusqu'à la marque.
BIEN AGITER AVANT UTILISATION.
Utilisez la suspension reconstituée dans les 7 jours.
La suspension reconstituée doit être conservée
dans le réfrigérateur entre 2° à 8° C.
Conserver en dessous de 30° C dans un endroit sec,
Protéger de la lumière.

Mfg. Lic No. / Lic. N°. Fab.: G/1195
Batch No. /
N° de Lot
Mfg. Date /
Date de Fab
Exp. Date /
Date d'exp.



2DS023LMG01

110 x 45 mm

Unvarnished Area