

11/01/2019

Product EAN-13 No. 8 906009 230955

New Logo To be printed inside in grey

Pantone 576 C
Pantone 7705 C
Pantone 185 C
Pantone Black C
Pantone Black C

7470302

Dolimex®
Xigraine

Panclorol 500 mg + Caffeine 50 mg
Panclorol 500 mg + Caffeine 50 mg
Panclorol 500 mg + Caffeine 50 mg

Carton Size : 95 x 22 x 95 mm

Dolimex®
Xigraine

Panclorol 500 mg + Caffeine 50 mg
Panclorol 500 mg + Caffeine 50 mg
Panclorol 500 mg + Caffeine 50 mg

16 Comprimidos efervescentes
Effervescent tablets
Voie orale / Via oral / Oral use

Dolimex®
Xigraine

Panclorol 500 mg + Caffeine 50 mg
Panclorol 500 mg + Caffeine 50 mg
Panclorol 500 mg + Caffeine 50 mg

Code No. GUJORG054425-A

Traduire & expliquer AAM
IA traduire & expliquer AAM
Roue à billes 10 mm
Marron
P. 223.21.26.33

Composition:
Chaque comprimé effervescent contient :
Panclorol 500 mg
Caféine 50 mg
Excipients q.s.

Précautions d'emploi :
Ne pas chasser ni avaler ces tablettes.
Ne pas boire d'alcool pendant le traitement.
Ne pas fumer pendant le traitement.
Ne pas conduire pendant le traitement.
Ne pas utiliser pendant le traitement.
Ne pas utiliser pendant le traitement.
Ne pas utiliser pendant le traitement.

Indications, contre-indications, précautions d'emploi, posologie, voir la notice.
Indications :
Migraine et céphalée.
Migraine et céphalée.
Migraine et céphalée.
Migraine et céphalée.
Migraine et céphalée.
Migraine et céphalée.

Mode d'emploi :
Dissoudre le comprimé dans un verre d'eau (environ 200 ml). Boire aussitôt le comprimé dissout.

Composition:
Chaque comprimé effervescent contient :
Panclorol 500 mg
Caféine 50 mg
Excipients q.s.

Précautions d'emploi :
Ne pas chasser ni avaler ces tablettes.
Ne pas boire d'alcool pendant le traitement.
Ne pas fumer pendant le traitement.
Ne pas conduire pendant le traitement.
Ne pas utiliser pendant le traitement.
Ne pas utiliser pendant le traitement.

Indications, contre-indications, précautions d'emploi, posologie, voir la notice.
Indications :
Migraine et céphalée.
Migraine et céphalée.
Migraine et céphalée.
Migraine et céphalée.
Migraine et céphalée.
Migraine et céphalée.

Mode d'emploi :
Dissoudre le comprimé dans un verre d'eau (environ 200 ml). Boire aussitôt le comprimé dissout.

Pharmacovigilance / Farmacovigilância:
+ 25 21 25 52 38
pharmacovigilance@imex-pharma.com

Unvarnished Area for 2 D Barcode

001084H

E. S. S.



GTIN No. : 12345678901234
Exp. Dt. : 121212
Batch No. : Test 123
Sr No : 12345678901234
MFG. DT. : MM/YYYY EXP. DT.