



sanofi

**Douleurs
et fièvre
Pain and
fever**

Doliprane
Paracétamol
Paracetamol

2,4 %



Suspension buvable
Oral suspension
100 ml

Enfants à partir de 3 mois et 5 kg
Children from 3 months and 5 kg

> COMPOSITION :

Paracétamol 120 mg dans 5ml de suspension
Excipients à effet notable : sorbitol, sodium

> MÉTHODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :

Voie orale.

La suspension doit être prise avec suffisamment de liquide. Le flacon est muni d'un capuchon de sécurité qui empêche les enfants de l'ouvrir. Les instructions d'utilisation et d'ouverture du flacon sont incluses dans la notice.

> INDICATION :

Le paracétamol, le principe actif de DOLIPRANE, agit contre la douleur et réduit l'élevation de la température corporelle. DOLIPRANE est administré aux enfants pour réduire la fièvre dans la grippe et d'autres maladies fébriles, pour des douleurs d'origines diverses, par ex. céphalées, douleurs dentaires (y compris douleur de pousse des dents) et douleurs musculo-squelettiques accompagnant les maladies grippales. DOLIPRANE peut être pris en cas de névralgie (douleur ressentie le long du nerf) et de douleurs dans les articulations et les muscles, s'il ne s'agit pas de symptômes de grippe, après consultation avec un médecin uniquement.

> DOSAGE :

Chez les enfants âgés de 3 mois, une dose unique de 10 à 15 mg de paracétamol/kg de poids corporel est utilisée dans le traitement de la fièvre et de la douleur. Il est administré au besoin par intervalles de 6 heures. En cas de besoin, cet intervalle peut être raccourci à 4 heures, mais le dose quotidienne totale ne doit pas être dépassée. Pas plus de 4 doses en 24 heures.

Lire la notice section "Comment prendre DOLIPRANE".

> MISES EN GARDE SPÉCIALES :

L'utilisation de doses supérieures aux doses recommandées peut entraîner un risque de lésion hépatique grave. Ne donnez pas ce médicament sans l'avis d'un médecin aux enfants s'ils prennent d'autres médicaments contenant du paracétamol.

Si DOLIPRANE doit être pris par un adulte, celui-ci ne doit pas consommer de boissons alcoolisées pendant le traitement.

TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTEE DES ENFANTS.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

> PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C dans un flacon hermétiquement fermé à l'abri de la lumière et de l'humidité. À utiliser dans les 6 mois suivant la première ouverture.

Opella Healthcare Slovakia s.r.o.

Einstejnova 24
851 01 Bratislava
République Slovaque / Slovak Republic

Fabricant / Manufacturer:

A. Nattermann & Cie. GmbH
Nattermannallee 1
50829 Cologne
Allemagne / Germany



Doliprane
Paracétamol
Paracetamol

2,4 %

61/61/141
Cd 241
06.24-XD
913520

sanofi

**Douleurs
et fièvre
Pain and
fever**

Doliprane
Paracétamol
Paracetamol

2,4 %



Suspension buvable
Oral suspension
100 ml

Enfants à partir de 3 mois et 5 kg
Children from 3 months and 5 kg

> COMPOSITION :

Paracétamol 120 mg in 5 ml of suspension
Excipients with known effect : sorbitol, sodium

> METHOD AND ROUTE OF ADMINISTRATION :

Oral use.

The suspension should be taken with sufficient liquid. The bottle is fitted with a safety cap that prevents children from opening it. The instructions for use and for opening the bottle are included in the package leaflet.

> INDICATION :

Paracetamol, the active ingredient of DOLIPRANE, acts against pain and reduces elevated body temperature. DOLIPRANE is given to children to reduce fever in flu and other febrile illnesses, for pain of various origins, e.g. headaches, toothache (including teething pain) and musculoskeletal pain accompanying flu illnesses. DOLIPRANE can be taken in neuralgia (pain felt along the nerve) and joint and muscle pain that are not flu symptoms only after consultation with a doctor.

> POSOLOGY :

In children from 3 months of age, a single dose of 10-15 mg paracetamol/kg body weight is used in the treatment of fever and pain. It is given as needed in 6-hour intervals, the interval can be shortened to 4 hours if necessary, while the total daily dose must not be exceeded. No more than 4 doses in 24 hours.

Read the package leaflet section "How to take DOLIPRANE".

> SPECIAL WARNINGS :

Use of higher than recommended doses may lead to the risk of serious liver injury. Do not give this medicine without the advice of a doctor to children if they are taking any other medicines containing paracetamol.

If DOLIPRANE should be administered to an adult, the consumption of alcoholic beverages is prohibited during treatment. KEEP OUT OF THE SIGHT AND REACH OF CHILDREN. Read carefully the package leaflet before use.

> SPECIFIC STORAGE CONDITIONS :

Do not store above 25°C in a tightly closed bottle in order to protect from light and moisture.

Use within 6 months after first opening.
Médicament autorisé / Authorized medicine
N° 07/568/00-C
Médicament non soumis à prescription /
Over the counter medicine

GTIN : 03664798037678

