

RCP du produit

RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES D'ALVITYL TONUS

1. DENOMINATION

ALVITYL Tonus

2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

VITAMINE B1	1,10 mg
Sous forme de mononitrate de Thiamine	
VITAMINE B2	1,40 mg
Sous forme de phosphate sodique de riboflavine	
NICOTINAMIDE (VITAMINE B3/PP)	16,00 mg
ACIDE PANTOTHENIQUE (B5)	6,00 mg
Sous forme de pantothénate de calcium	
VITAMINE B6	1,40 mg
Sous forme de chlorhydrate de pyridoxine	
BIOTINE (VITAMINE B8)	0,05 mg
ACIDE FOLIQUE (VITAMINE B9)	0,20 mg
VITAMINE B12	2,50 µg
Sous forme de cyanocobalamine	
ACIDE ASCORBIQUE (VITAMINE C)	100,00 mg
VITAMINE D3	200 U.I
VITAMINE E	12,00 mg
Sous forme d'alpha-tocophérol acétate	
MAGNESIUM	112,50 mg
Sous forme d'oxyde de magnésium	
ZINC	5,00 mg
Sous forme de sulfate de zinc	
CAFEINE	50,00 mg
Panax ginseng	60,00 mg
Sous forme d'extrait aqueux de racine de <i>Panax ginseng</i> 1.5/1	

Pour un comprimé effervescent.

Additifs : Sodium (0,260 g/comprimé), aspartam (source de phénylalanine) (E951), sorbitol,
Pour la liste complète des additifs, voir rubrique 6.1.

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Comprimé effervescent.

4. DONNEES CLINIQUES

4.1. Indications

Indiqué chez l'adulte (à partir de 15 ans), pour aider l'organisme des adultes, étudiants et adolescents lors de période de surmenage, de baisse de tonus ou d'examen.

4.2. Conseil d'utilisation et mode d'administration

Conseil d'utilisation

RESERVE A L'ADULTE (à partir de 15 ans).

1 comprimé maximum par jour, de préférence le matin.

Le comprimé effervescent est à prendre dissous dans un verre d'eau.

Durée de la prise

La durée de prise est conseillée pendant 20 jours.

Présentation

Tubes de 10 comprimés.

4.3. Contre-indications

Alvityl Tonus est contre-indiqué en cas :

- d'hypersensibilité connue à l'un des constituants,
- d'insuffisance rénale sévère,
- de phénylcétonurie, en raison de la présence d'aspartame.

4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

Mises en garde spéciales

En raison de la présence de sorbitol, ce produit est contre-indiqué en cas d'intolérance au fructose.

Précautions d'emploi:

Du fait de la présence de vitamine B12, prendre garde à ne pas masquer une anémie par déficit en vitamine B12 et d'en retarder le diagnostic.

Contient 0,260 g de sodium par comprimé: en tenir compte chez les personnes suivant un régime hyposodé strict.

4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

Sans objet.

4.6. Grossesse et allaitement

Grossesse

En l'absence d'études sur cette population, nous déconseillons la prise du produit par les femmes enceintes.

Allaitement

En raison de l'absence de données du passage dans le lait maternel, l'utilisation de ce complément alimentaire est à éviter en cas d'allaitement.

4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Sans objet.

4.8. Effets indésirables

Sans objet.

4.9. Surdosage

Sans objet.

5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

Sans objet.

6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

6.1. Liste des additifs

Acide citrique, bicarbonate de sodium, carbonate de calcium, bicarbonate de potassium, sorbitol, arôme orange, polyvinylpyrrolidone, acésulfame de potassium, aspartame, saccharinate de sodium, carmoisine.

6.2. Incompatibilités

Sans objet.

6.3. Durée de conservation

30 mois.



6.4. Précautions particulières de conservation

A conserver à une température ne dépassant pas + 25° C.

Conserver le conditionnement primaire soigneusement fermé, à l'abri de l'humidité.

6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur

Tube en polypropylène de 10 comprimés fermé par un bouchon contenant un déshydratant, boîtes de 1 ou 2 tubes.

6.6. Précautions particulières d'élimination et de manipulation

Pas d'exigences particulières.

7. RESPONSABLE DE COMMERCIALISATION

Laboratoires URGO Healthcare
42 rue de Longvic
21300 CHENOVE, France